

AVES DE EXTREMADURA

Volumen 5 · 2009 - 2014



AVES DE EXTREMADURA

Volumen 5
2009 -2014

Sergio Mayordomo
Javier Prieta
Marcelino Cardalliaguet



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

Editado por

Sergio Mayordomo Ruiz
Javier Prieta Díaz
Marcelino Cardalliaguet Guerra

SEO/BirdLife – Junta de Extremadura

2015

Citación recomendada para este volumen:

Mayordomo, S., Prieta, J. y Cardalliaguet, M. 2015. Aves de Extremadura, vol. 5. 2009-2014. SEO/BirdLife y Junta de Extremadura.

Citación recomendada para registros concretos:

Autor/es. 2015. Especie citada. En, Mayordomo, S., Prieta, J. y Cardalliaguet, M. Aves de Extremadura, vol. 5. 2009-2014. SEO/BirdLife y Junta de Extremadura.

Fotografía de la portada: Garceta grande (*Egretta alba*). Javier Prieta.

Fotografías interiores: Atanasio Fernández, Carlos Fernández, Javier Prieta, Jose Gordillo, Juan Pablo Prieto y Marcelino Cardalliaguet

Ilustraciones: Sergio Mayordomo, Alfredo Ortega y Marcelino Cardalliaguet

CONTENIDOS

Prólogo

Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Presentación

Registros ornitológicos

Introducción

Especies

Anátidas

Ardeidas

Rapaces

Limícolas

Gaviotas

Aláudidos y bisbitas

Hirundínidos

Fringílidos

Córvidos

Goriones y estorninos


Escribanos

Especies exóticas sin poblaciones establecidas

Bibliografía

Listado de colaboradores

PRÓLOGO



Un trabajo impagable

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) viene llevando a cabo desde hace casi dos décadas un impagable trabajo de observación de las aves en Extremadura.

Este Anuario que ahora ve la luz recoge los trabajos que centenares de personas han llevado a cabo desde el año 2009 tratando de recopilar innumerables datos sobre todas y cada una de las 340 especies que podemos contemplar en los cielos extremeños. Entre esas especies, se encuentran algunas de las más amenazadas de Europa.

En estas páginas están los datos más actualizados de las aves presentes en Extremadura, incorporando las referencias más relevantes de su fenología (fecha de llegada de la migración, última fecha antes de la migración), los datos poblacionales, lugares de observación y otra información de interés. Con esa información y con la acumulada ya en anuarios anteriores, se puede establecer el estatus de cada especie a nivel regional y una estima de sus poblaciones.

Por todo ello, esta herramienta que nos brinda periódicamente SEO/BirdLife no solo constituye un regalo para los amantes de las aves sino también una guía que facilita el trabajo de protección y conservación al que estamos obligados desde las administraciones públicas. La labor continuada en la recogida de información desde 1998 ha permitido mejorar el conocimiento sobre muchas especies, interpretar sus tendencias poblacionales y conocer con mayor exactitud su fenología e incluso su distribución.

En este trabajo no solo participan socios de SEO/BirdLife, sino también otros ornitólogos profesionales, aficionados a las aves y personal de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. SEO/BirdLife realiza el grandioso esfuerzo de recopilar, ordenar y procesar toda la información que se genera cada año sobre las aves en Extremadura para incluirla en el Anuario. Sin duda, se trata del más complejo e importante de los trabajos colectivos realizados a nivel regional sobre avifauna.

Como consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio agradezco el trabajo, el tiempo y la entrega de todas las personas que aman a las aves y que trabajan para contribuir a su conocimiento y por la conservación de la biodiversidad.

Begoña García Bernal

PRESENTACIÓN



Nos complacemos de nuevo en presentar otro volumen, el quinto, de la serie Aves de Extremadura (también conocida como Anuario Ornitológico de Extremadura). En esta ocasión, afortunadamente sin retraso. Nada menos que seis años son cubiertos en esta ocasión, entre 2009 y 2014. En la mayoría de los casos no se trata de información inédita, sino que se trata de datos que de un modo u otro ha ido apareciendo en medios digitales, en especial en los resúmenes mensuales del Blog que tiene el mismo título que la serie de libros iniciada en 1998 (“Aves de Extremadura”). Dichos resúmenes comenzaron a publicarse en mayo de 2010, de modo que la información anterior a esa fecha es más escasa y dado el tiempo pasado más difícil de recopilar. Si en los primeros volúmenes los datos eran solicitados por los editores y cedidos por los colaboradores, hoy día ello no ha sido necesario, dado el incesante flujo de información en una increíble variedad de medios digitales. El condicionante actual es sobre todo ser capaces de recopilar tan ingente cantidad de datos, lo que exige un trabajo continuo de lectura y participación en redes sociales. Lógicamente no todo lo conocido y publicado está recopilado en esta obra, pero sí una muestra realmente extensa y muy representativa. Como en todos los volúmenes anteriores, es de rigor insistir que el trabajo aquí ofrecido es el fruto del esfuerzo desinteresado de los editores y de decenas de colaboradores que comparten su información con todos los aficionados a las aves. Desde aquí, un agradecimiento especial a todos los participantes en el “Foro GOCE”, base de este y muchos trabajos y estudios, sin los cuales el presente libro jamás hubiera sido posible. Y por supuesto, dar las gracias a la Junta de Extremadura por el apoyo económico que ha permitido la edición como libro de la presente obra y en especial, a los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente, por su valiosa colaboración.

A pesar de la evolución del mundo editorial, es una gran satisfacción poder seguir ofreciendo en una sola obra en papel la actualidad de la avifauna de Extremadura. En el anterior volumen ya decíamos que el futuro de este tipo de colecciones queda en el aire por el avance en el empleo de medios digitales de difusión. Pero aquí queda demostrado que ambos medios son complementarios y no excluyentes. Por supuesto, para estar al día en el conocimiento de la avifauna extremeña seguiremos en la medida de lo posible publicando el blog “Aves de Extremadura” (<http://aves-extremadura.blogspot.com>), con los habituales artículos sobre aves extremeñas y donde mensualmente se ofrece, a modo de noticiario, un resumen de las observaciones más interesantes.

En este quinto volumen, al igual que en la versión en papel del volumen cuarto, no se publican artículos como era habitual hasta la fecha. La gran cantidad de datos y la limitación física que supone un libro en papel, que no

tiene un medio digital, no lo permiten. Por tanto, el presente libro es un extenso informe recopilatorio donde se repasa la situación de todas las especies de aves citadas en Extremadura hasta 2014, incluso con alguna pincelada de 2015 cuando se considera necesario.

Agradecemos de nuevo a todos los colaboradores la cesión de sus datos y seguimos animando a la creciente comunidad extremeña de aficionados a las aves para que siga compartiendo esa información, siempre valiosa, que aunque no nos lo parezca al principio puede ser útil en el conocimiento y conservación de las aves.

REGISTROS ORNITOLÓGICOS



REGISTROS ORNITOLÓGICOS 2009-2014 **por Sergio Mayordomo y Javier Prieta**

El presente informe es el quinto de la colección “Aves de Extremadura”, referido en esta ocasión a los seis años comprendidos entre 2009 y 2014. El total de especies de aves consideradas es de 372, 33 más que en el informe de 2004-2008 y 69 más que en el primer volumen del año 1998. Este enorme incremento muestra claramente el mejor conocimiento adquirido de la avifauna extremeña y la importante contribución que para ello ha supuesto la serie “Aves de Extremadura”. Las especies se distribuyen en dos listas: la primera con todas las especies de presentación natural en Extremadura (338 especies, 19 más que las tratadas en 2004-2008), donde se incluyen especies exóticas con poblaciones naturalizadas; y un segundo listado de aves exóticas que reúne 34 especies procedentes de escapes de cautividad y sin poblaciones establecidas, 13 más que en 2004-2008. En la primera se citan otras 3 especies pendientes de confirmar no sumadas al cómputo total.

A diferencia de los anteriores volúmenes, donde la parte principal de los registros eran aportados directamente por los colaboradores, esta vez la base es la recopilación de citas publicadas en otros medios, que por orden de importancia son el “Foro Goce”, publicaciones digitales (revistas, páginas web, blogs, etc.) y medios escritos (revistas, libros, actas de congresos, informes inéditos, etc.). La información, y desinformación todo sea dicho, publicada en Internet es tan ingente que se ha preferido dar mayor valor a los medios más cercanos y fiables, pues muchos medios, sobre todo los de carácter personal y redes sociales ofrecen datos muy desordenados y a veces de dudosa credibilidad.

En los anteriores volúmenes de *Aves de Extremadura* se recopilaba la información de trabajos generales sobre avifauna que actualizaban la situación de parte de la avifauna extremeña. La llegada de la crisis económica en 2008 redujo enormemente los fondos destinados al estudio de las aves en España. El resultado es que con la notable excepción del *Atlas de las aves en invierno en España* (SEO/BirdLife, 2012) y algún censo nacional (rapaces forestales, ardeidas), poco más se ha publicado. Así, en el periodo 2003-2008 SEO/BirdLife editó nada menos que 33 monografías sobre aves españolas, en alguna de ellas con información sobre decenas de especies, caso de las monografías de aves comunes y aves acuáticas. En contraste, en el periodo 2009-2014 han sido tan sólo cuatro las monografías publicadas, de las cuales sólo dos hacen referencia a especies presentes en Extremadura (rapaces forestales y ardeidas). Además hay otras dos monografías escritas pero sin publicar relativas a cormorán grande y milano real. También se

incluyen en el presente libro los datos que la administración extremeña (Gobierno / Junta de Extremadura) pone a disposición de los ciudadanos de modo irregular y por cauces muy diversos. Se trata de los programas de seguimiento de cinco grandes rapaces (tres grandes águilas y dos buitres) y de cigüeña negra y algunos datos aislados de otras especies. Se trata de información aparecida en redes sociales, informes, noticias de prensa, material promocional, etc... por lo general con pocos detalles. Ello hace que en demasiadas ocasiones los datos publicados sean contradictorios entre sí, pues en ciertos casos varían en gran medida para un mismo año o periodo según la fuente consultada.

En el presente libro se recogen también las tendencias poblacionales de unas 100 especies reproductoras en Extremadura de acuerdo con los resultados obtenidos por el programa SACRE, Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en España, en el periodo de 16 años 1998-2013 (SEO/BirdLife, 2013a). Como no hay programas específicos en Extremadura, se han utilizado las tendencias relativas a la denominada “Región mediterránea sur”, delimitada según criterios ecológicos y no por provincias como anteriormente. Casi la totalidad de Extremadura se incluye en dicha región, con excepción de la alta montaña de Gredos cacereño, proporcionalmente muy pequeña. A grandes rasgos, la “Región mediterránea sur” ocupa las cuencas del Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Ebro y Levante, con excepción de las zonas de alta montaña, que se analizan por separado. Hay que tener en cuenta que dentro de tan extensa área el grado de muestreo que reciben otras zonas (sobre todo Madrid, pero también el entorno de los grandes núcleos urbanos que acogen más aficionados a las aves) es más elevado que el realizado en Extremadura, aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados. En la presente obra se utiliza con preferencia la tendencia en la Región mediterránea sur, en caso de no estar disponible se indica la tendencia del conjunto de España. Para unas pocas especies de alta montaña se emplea la tendencia de esta región. Las categorías empleadas son seis: incierta, estable, incremento, incremento fuerte, declive y declive fuerte. En el caso de aves invernantes, en 2008 se puso en marcha un programa equivalente al Sacre para el seguimiento de las aves invernantes (SACIN). Aunque los datos son aún provisionales, dado la corta serie de años de estudio, los datos aplicables a Extremadura para unas 80 especies también son incluidos siguiendo los criterios arriba indicados para el Sacre. Por último, para algunas especies invernantes y migradoras en Extremadura cuyo origen son áreas de cría en Europa fuera de España se indican las tendencias obtenidas en el programa PECBMS (“sacre” europeo) para el periodo 1980-2013.

Otra serie de datos añadida son los correspondientes a los censos de aves acuáticas invernantes realizados en enero. Se trata del programa de

seguimiento de aves más veterano de España, que se remonta a la década de 1960. Desde entonces, la cobertura del censo ha variado mucho en nuestra región, con etapas cuando ni siquiera se realizó en Extremadura (por ejemplo, 1996-2002). La metodología y cobertura también ha sido variable, con censos efectuados a veces sólo por voluntarios, en ocasiones por empresas contratadas y en otros casos por personal de la administración. En esta ocasión hay datos para los seis años tratados por este libro, aunque la información se diferencia en dos periodos. Por un lado, tres censos entregados por la Junta de Extremadura al Ministerio de Medio Ambiente (enero de 2009, 2010 y 2011), con una cobertura parcial de las principales localidades y donde se desconocen fechas y métodos. Y por otro lado, tres censos promovidos por SEO/BirdLife y efectuados en el mes de enero de los años 2012, 2013 y 2014, con especial énfasis en las principales localidades de Vegas Altas del Guadiana donde se diseñó una metodología propia (recuentos fotográficos en Sierra Brava, censos coordinados de limícolas en arrozales y de anátidas en grandes embalses, etc.). Estos seis censos son inéditos siendo los correspondientes a 2012, 2013 y 2014 los más completos hasta la fecha en la región.

Por último, durante 2014 SEO/BirdLife-Extremadura desarrollo para el Gobierno de Extremadura un estudio sobre la avifauna de la Red Natura 2000. Un amplio proyecto con varias metodologías que tenía por objetivo cuantificar las aves de más de 100 espacios, incluyendo censos específicos, como cernícalo primilla, prestando especial atención a las aves esteparias y revisando información de otras muchas especies. La gran cantidad de datos obtenidos es imposible de incorporar por las limitaciones de espacio del presente libro, pero sí se presentan resúmenes para 16 especies o grupos de especies (Cardalliaguet *et al.*, 2014)

Para cada especie, el formato seguido es el siguiente.

NOMBRE. Según la lista recomendada por SEO/BirdLife.

ESTATUS REGIONAL. Breve descripción de la situación de cada especie en el ámbito extremeño.

CRITERIO. Criterios de selección de las citas para su publicación. Se trata de criterios flexibles sujetos a los avances en el conocimiento de las aves. Se consideran “rareza” las especies incluidas en las listas vigentes publicadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

REGISTROS. Listas de observaciones ordenadas y comentadas por los editores. Los datos básicos son localidad, fecha, número (sexo y edad) y nombre de los observador/es. Este quinto informe incluye observaciones hasta el 31 de diciembre de 2014.

Ánsar campestre (*Anser fabalis*)

Estatus regional. Accidental en invierno. Siete registros de 13 ejemplares entre noviembre y febrero: 1998-99 en Los Canchales; 2002, 2005, 2007, 2011 y 2013 en Vegas Altas (Sierra Brava, Madrigalejo y Navalvillar de Pela) y 2012-2013 en Borbollón. Subespecies *A.f.fabalis* y *A.f.rossicus*.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos: Dos *A.f.fabalis* en Los Canchales de nov/1998 al 01/01/99 (F. Prieto; J. A. García Jiménez). En Sierra Brava: un *A.f.rossicus* el 12/01/02 (J. Muddeman), 5 el 13/01/02, 3 el 21/01/02 y uno el 6/02/02 (J. M. Traverso). Uno en Madrigalejo el 18/11/05 (D. González). Dos en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, el 01/02/07 (J. Muddeman).
- Registros 2009-2014. Uno en Casas de Hitos, Madrigalejo (CC), el 09/01/11 (M. Kelsey). Uno en El Borbollón (CC) entre el 10/12/12 (G. Naharro, F. Salas y A. Torrijo) y el 23/01/13 (C. Clemente, M. Gálvez, J. Guerra, R. Lozano, J. Mahillo, S. Mayordomo, R. Montero, E. Palacios, J. Prieta y H. Sánchez). Un 1º invierno en Moheda Alta (BA) el 04/01/13 (C. Clemente, P. Goñi, J. L. Guisado y S. Mayordomo) y el 02/02/13 (M. Gálvez, J. Guerra, G. Mayor, J. Merayo, J. Tolosa y M. J. Valencia).

Ánsar piquicorto (*Anser brachyrhynchos*)

Estatus regional. Accidental en invierno. Tres registros en Sierra Brava en enero de 2002, Madrigalejo en noviembre de 2010 y Valdecañas de noviembre de 2012 a enero de 2013. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos: Uno en Sierra Brava el 12/01/02 (J. Muddeman).
- Segundo y tercer registro en Extremadura. Uno en Casas de Hitos, Madrigalejo (CC), el 27/11/10 (J. Arias, F. Molinos, J. M. Salazar y J. Vilches). Uno en Valdecañas (CC) entre el 02/11/12 (J. Briz y V. Risco) y el 20/01/13 (J. Briz, M. Kelsey, S. Mayordomo, R. Montero, E. Palacios, J. Prieta y V. Risco).

Ánsar careto (*Anser albifrons*)

Estatus regional. Invernante muy escaso (5-25 ejemplares) con tendencia al aumento. Regular desde 2009. Subespecie *A.a.albifrons*.

Criterio. Todas las observaciones. *A.a.flavirostris* se considera rareza sujeta a homologación por el Comité de Rarezas.

- Invierno 2009-2010. Dos en el embalse de Portaje (CC) el 18/10/09, 02/11/09 (S. Mayordomo) y el 06/11/09 (S. Mayordomo y J. Prieta). Tres en Moheda Alta (BA) el 06/01/10 (J. L. Anguita) y quizás los mismos en Casas de Hitos (BA-CC) el 28/01/10 (M. Kelsey).
- Invierno 2010-2011. Un adulto en Sierra Brava (CC) el 03/01/11 (X. Piñeiro). Un 1º invierno en el embalse de Portaje (CC) el 26/01/11 (J. Prieta), el 01/02/11 y el 12/02/11 (S. Mayordomo). 5 en Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), el 29/01/11 (S. Mayordomo). Uno en Moheda Alta (BA) el 07/02/11 (M. Kelsey) y 4 el 11/02/11 (G. Schreur, M. Kelsey y T. Appleton).
- Invierno 2011-2012. Un 1º invierno en Moheda Alta (BA) el 13/11/11 (M. Gálvez, J. Guerra, S. Mayordomo, E. Palacios, X. Piñeiro y M. J. Valencia) y 2 adultos el 20/11/11 (D. Langlois y S. Langlois). 2 en Valdecañas (CC) el 08/12/11 (J. Briz y V. Risco). Uno en Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), el 08/12/11 (J. Briz y V. Risco), y 3 adultos el 03/01/12 (S. Mayordomo) y el 03/02/12 (C. Andrés, J. Briz y V. Risco).
- Invierno 2012-2013. Uno en Moheda Alta (BA) el 01/12/12 (A. Colorado, D. Cuenca, M. García del Rey y J. R. Suárez). Uno en arrozales de Vegas Altas (BA) el 08/01/13 (M. Gálvez y J. Guerra). Uno en Los Canchales (BA) el 08/01/13 (J. A. Delgado, F. Montaña, J. Vázquez). Valdecañas (CC): 3 adultos el 11/11/12 (D. Langlois, S. Langlois y J. Prieta), un 1º invierno el 19/11/12 (C. Clemente), un adulto y un 1º invierno el 23/11/12 (S. Mayordomo), 7 el 02/12/12 (J. D. Acevedo), 8 el 16/12/12 (F. Salas y A. Torrijos) y el 23/12/12 (S. Mayordomo), uno el 29/12/12 (J. Briz y V. Risco) y 9 el 15/01/13 (J. Prieta). Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC): 3 el 26/01/13 (S. Mayordomo), uno el 27/01/13 (J. Portillo) y 2 el 03/02/13 (J. Briz, M. García del Rey, D. Langlois, S. Langlois y V. Risco). El Borbollón (CC): 2 los días 10/11/12 (G. Naharro, F. Salas y A. Torrijos), 11/12/12 (S. Mayordomo, R. Montero y H. Sánchez), 15/12/12 (C. Clemente, J. Mahillo y J. Prieta), 22/12/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 11/02/13 (C. Clemente, J. Mahillo y G. Naharro).
- Invierno 2013-2014. Los Canchales (BA): Uno los días 24/11/13 (F. Lopo, F. Montaña y G. Montaña), 07/12/13 y 08/12/13 (A. Cangas), 30/12/13 (R. Cano) y 13/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Valdecañas (CC): 2 adultos el 05/01/14 (J. Prieta) y un 1º invierno el 10/01/14 (C. Clemente y S. Mayordomo).
- Invierno 2014-2015. Un adulto en Valdecañas (CC) el 24/11/14 (S. Mayordomo). Uno en Los Canchales (BA) el 29/11/14 (J. L. Bautista). 2 en los arrozales de La Trebolosa, Madrigalejo (CC), el 19/12/14 (M. Kelsey).

Ánsar común (*Anser anser*)

Estatus regional. Invernante común (promedio 9.500 individuos en 2009-2014, máximo 23.200 en 2013) con tendencia creciente a largo plazo (1990-2014) y estable a corto plazo (2005-2014). Observaciones estivales y un caso de reproducción. Subespecie *A.a.anser*.

Criterio. Época de cría, fechas extremas y cifras importantes (>1.000 en Vegas Altas, >100 en otras localidades).

- **Censos de enero 2009-2014.** Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 1.074 individuos en 2009, 7.711 en 2010 (15.000 fuera de censo), 858 en 2011, 8.020 en 2012, 23.026 en 2013 y 8.807 en 2014 (media 9.464 aves), siendo la cifra de 2013 el mayor registro regional. Las oscilaciones se deben en parte a la diferente cobertura, pues dado que Vegas Altas ocupa medios agrícolas y no forma dormideros requeriría un censo específico. Destacan los regadíos de la Zona Centro (máximo 18.825 en 2013) y grupos menores en embalses, en la mayoría de los casos con 50-300 aves, excepto en Valdecañas donde en 2013 se alcanzó el máximo de 2.950 aves. La tendencia es muy positiva a largo plazo y estable a corto plazo. La media de 2009-2014 (9.500) es casi igual a la del periodo 2005-2008 (9.400), siendo ambas más del triple que las 2.670 de media de 1990-1995.
- **Reproducción.** Primera cita en Extremadura, aunque no se asegura que sean aves silvestres: Grupo de 7 adultos y 2 pollos en el embalse de Alqueva (BA) el 11/05/11 (Á. Sánchez).
- **Invernada.** 180 en Portaje (CC) el 09/01/09 y 218 en El Borbollón (CC) el 17/01/09 (S. Mayordomo). 4.000 en Moheda Alta (BA) el 06/12/09 (SEO Cáceres). Valdecañas (CC): 758 en el el 08/12/11 (J. Briz y V. Risco), 1.200 el 11/11/12 y 2.946 el 15/01/13 (J. Prieta).
- **Llegadas.** 32 en paso sobre Galisteo (CC) el 15/10/09 (S. Mayordomo). 30 en Los Ibores (CC) el 12/10/10 (J. Briz y V. Risco). 5 en Valdecañas (CC) el 15/10/10 (Á. Sánchez). 7 en Torrealba, Torremocha (CC), el 30/09/11 (S. Mayordomo). El 23/10/12, uno en Portaje (CC) (S. Mayordomo), 7 en Moheda Alta (BA) y 50 en Sierra Brava (CC) (M. Kelsey). El 24/10/12, paso intenso en Trujillo (CC) (J. Porrás) y 12 sobrevolando Badajoz capital (F. Lopo). 13 en Sierra Brava (CC) el 07/09/13 y 8 en Valdecañas (CC) el 11/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez). El 01/10/13, un grupo sobre Plasencia (CC) (M. Á. Muñoz) y 4 sobre Cáceres (GIA-Extremadura). 3 en el embalse del Moral, Santos de Maimona (BA), el 08/10/13 (F. Montaña). 49 en Valdecañas (CC) el 10/10/13 (Á. Sánchez, J. Guerrero y M. Flores). 6 sobrevolando Arrocampo (CC) el 26/09/14 (M. Kelsey).

- Últimos registros. 5 en el embalse del Salor (CC) el 09/04/09 (C. Fernández). 3 en Madrigalejo (CC) el 29/03/10 (T. Naturalist). 8 en el embalse de Alange (BA) el 05/03/11 (J. Solana), 2 en Portaje (CC) el 11/03/11 (S. Mayordomo). Uno sobre Monfragüe (CC) el 22/03/11 (J. Muddeman). Uno en El Borbollón (CC) el 02/04/12 (A. Pacheco) y 2 en Valdecañas (CC) el 08/04/12 (S. Mayordomo). Presente en Quintana de La Serena (BA) el 11/03/13 (A. Sanabria). 26 en Arrocampo (CC) el 15/03/13 (J. Muddeman). 2 en Los Canchales (BA) el 30/03/13 (P. Herrador). Uno en Valdecañas (CC) el 22/04/13 (N. Moran y R. Montero). 2 en Palazuelo (BA) el 05/04/14 (M. Kelsey). 5 en Valdecañas (CC) el 18/04/14 (S. Mayordomo). Uno en el embalse de Alcollarín (CC) el 24/04/14 (M. Kelsey y E. Owen) y el 27/04/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). Presente en Los Canchales (BA) el 27/04/14 (F. Lopo).
- Registros estivales. No se descarta que sean ejemplares domésticos. 2010. Uno aparentemente silvestre en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela (BA), el 24/08/10 (J. García). 2012. 2 en Valdecañas el 20/05/12 y 2 en el embalse del Cubilar (CC) el 24/06/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). 2013. Uno en Granja de Torrehermosa (BA) el 01/06/13 (G. Gahete). Uno en el río Jerte en Plasencia (CC) el 08/07/13 (M. Domínguez) y volando el 11/07/13 (J. Prieta). En Los Canchales (BA), uno los días 21/07/13 (C. Clemente, M. García del Rey y S. Mayordomo), 28/07/13 (F. Bernáldez y F. Macías), 10/08/13 (C. González) y 29/09/13 (E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez y S. Mayordomo). 5 en El Borbollón (CC) el 21/08/13 (G. Naharro) y el 15/09/13 (J. Prieta). 2014. 4 en la charca de La Generala, Cáceres, el 11/05/14 (C. Fernández). 2 en el embalse de Alcollarín (CC) el 11/05/14 (M. Kelsey), 3 el 19/05/14 (J. Muddeman) y el 25/05/14 (C. Clemente), 2 el 02/06/14 (M. Kelsey) y 3 el 14/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). 2 en el embalse del Salor, Cáceres, el 31/05/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). 10 en El Borbollón (CC) el 16/06/14 (C. Clemente y S. Mayordomo).

Barnacla canadiense grande (*Branta canadensis*)

Estatus regional. Accidental. Posiblemente procedente de poblaciones naturalizadas en Europa. Seis registros, nueve aves, en Valdecañas (1977, febrero 1999), Sierra Brava (diciembre 2009), Navalvillar de Pela (diciembre 2010), Logrosán (noviembre 2012), Torremejía (noviembre 2012-enero 2013). Dos casos de hibridación con otros gansos.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos: Embalse de Valdecañas: uno en 1977 (J. Araújo y García Rúa), uno el 11/02/99 (J. Briz y Climent) y 3 a principios de 1999 (M. Querol). Un híbrido con *B. leucopsis* en Sierra Brava el 12/01/02 (J. Muddeman).

- Registros 2009-2014: Una en Sierra Brava (CC) el 06/12/09 (A. Cama, J. Guerra, J. Merayo, M. Gálvez, M. J. Valencia y X. Piñeiro). 2 en Moheda Alta (BA) el 19/12/10 (Á. Díaz y otros). Una en Vega Zarzalejos, Logrosán (CC), el 04/11/12 (L. Salguero y J. Á. Sánchez). Una en las lagunas de Torremejía (BA) entre el 24/11/12 y el 27/01/13 (F. Cristal, A. Cangas, V. de Alba, F. Montaña, A. Núñez, M. Á. Muñoz, J. Solana, E. Palacios, J. Muddeman, S. Mayordomo, A. Matador, J. G. Aparicio, J. Guerra, F. Yuste, L. Salguero y M. Gálvez).
- Otros registros. Un posible híbrido *B. canadensis* x *A. anser* en arrozales de Madrigalejo (CC) el 01/01/10 (M. Kelsey).

Barnacla canadiense chica (*Branta hutchinsii*)

Estatus regional. Accidental. Posiblemente procedente de poblaciones naturalizadas en Europa. Un registro en Navalvillar de Pela y Madrigalejo en enero y febrero de 2010.

Criterio. Todas las observaciones.

- Primer registro para Extremadura (y península Ibérica): Uno en arrozales de Navalvillar de Pela (BA) el 02/01/10 (A. Ceballos) y en la balsa de Casas de Hitos y entorno, Navalvillar de Pela (BA)-Madrigalejo (CC), los días 24/01/10, 28/01/10 y 01/02/10 (SEO-Cáceres).

Barnacla cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus regional. Invernante muy escaso (5-25 ejemplares) con tendencia al aumento. Regular desde 2010. Una cita estival. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro estival. Una en Casas de Hitos (BA-CC) el 24/04/11 (G. Schreur y M. Kelsey) y el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo).
- Invierno 2009-2010. 3 en Madrigalejo (CC) el 09/01/10 (J. M. Tapia y M. Jiménez) y 01/02/10 (J. Corral y Ó. Llama). 2 en el embalse de Llerena (BA) el 07/02/10 (F. Montaña).
- Invierno 2010-2011. Una en Valdecañas (CC) el 08/12/10 (J. Briz y V. Risco) y 11/12/10 (Á. Sánchez). 5 en Moheda Alta (BA) en diciembre de 2010 (M. Gómez Calzado) incluyendo dos el 19/12/10 (Á. Díaz y otros).
- Invierno 2011-2012. En Moheda Alta (BA): una el 10/11/11 (M. Kelsey), 3 el 13/11/11 (M. Gálvez, E. Palacios, J. Guerra, M. J. Valencia, S. Mayordomo y X. Piñeiro), 2 el 20/11/11 (D. Langlois y S. Langlois) y una el 26/11/11 (F. Molinos, J. M. Salazar y otros). Una en el embalse de

Portaje (CC) el 18/11/11 (S. Mayordomo) y el 22/11/11 (J. Prieta y S. Mayordomo) y 3 el 03/12/11 (S. Mayordomo). 6 en el embalse de Talaván (CC) el 03/12/11 (J. L. Barriga). Una en Moheda Alta (BA) el 07/12/11 (M. Kelsey). En Madrigalejo (CC), una el 14/01/12 (J. Mahillo y C. Clemente) y el 18/01/12 (D. Rivera, B. Cienfuegos y Á. L. Sánchez). 2 en Moheda Alta durante enero 2012 (L. Lozano y M. Gómez Calzado).

- Invierno 2012-2013. Una en Vega del Haza, Malpartida de Plasencia (CC), los días 19/11/12 (J. Prieta), 22/11/12 (A. Redondo), 25/11/12 (S. Mayordomo), 03/12/12 (J. M. Diu) y 11/01/13 (S. Mayordomo). En Valdecañas (CC), una los días 02/12/12 (V. Risco y J. Briz), 23/12/12 (S. Mayordomo), 25/12/12 (R. Montero), 29/12/12 (V. Risco y J. Briz) y 15/01/13 (J. Prieta). Una en el embalse del Salor (CC) el 30/12/12 (C. Fernández), el 01/01/13 (M. Cardalliaguet) y el 09/02/13 (C. Clemente y S. Mayordomo) y en la charca de La Generala (CC) el 15/01/13 (F. J. Caballero). 2 en el embalse de Portaje (CC) el 17/01/13 (S. Mayordomo).
- Invierno 2013-2014. 2 en Santa Amalia (BA) el 25/02/14 (F. Yuste), el 05/03/14 (M. Gálvez, J. Guerra y J. Merayo), el 07/03/14 (V. de Alba, A. Núñez y F. Yuste) y el 16/03/14 (L. Alcántara).

Barnacla carinegra (*Branta bernicla*)

Estatus regional. Accidental. Cuatro registros en noviembre de 1993 (Arroyo de la Luz), noviembre de 1996 (Los Canchales) y abril de 2004 (embalse de Guadiloba y Casatejada). Subespecies *B.b.bernicla* (Palaeártico) y *B. b. hrota* (América).

Criterio. Todas las observaciones. *B.b.hrota* se considera rareza en España.

- Registros previos. Una en Charca de Lancho del 19 al 26/11/93 (S. Lozano). Dos el 24/11/96 en Los Canchales (J.A. García Jiménez). Una *B. b. hrota* el 10/04/08 en el embalse de Guadiloba (M. McGill). Una el 12/04/08 en Charco Salado, Casatejada (G. Núñez-Lagos).

Barnacla cuellirroja (*Branta ruficollis*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Sierra Brava en enero de 2002.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros anteriores. Un juvenil los días 12 y 13/01/02 en Sierra Brava y Madrigalejo (J. Muddeman).

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiaca*)

Estatus regional. Exótica procedente de aves cautivas y de poblaciones naturalizadas en el centro de Europa. Primera cita en 1993 y primera reproducción en 2007. Cría de modo regular desde 2010, con 7 localidades conocidas y tendencia creciente (bandos de >100 aves). Residente con movimientos desconocidos (81 aves en enero de 2014). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Revisión.** 15 registros en el periodo 1998-2008, que ascienden de modo progresivo a 190 en 2009-2014: 9 en 2010, 29 en 2011, 29 en 2012, 33 en 2012 y 90 en 2014. Grupos mayores en las colas del embalse de La Serena con bandos de >100 adultos y jóvenes.
- **Reproducción.** Sólo un caso previo de reproducción antes de 2009, en el embalse de Ibahernando, una pareja en 2007. A partir de 2010 cría de modo regular. Una pareja con 9 pollos en el embalse de Ibahernando (CC) el 05/10/10 (G. Sánchez Peña). Embalse de Valdecañas (CC): una pareja con 3 pollos el 14/06/11, 4 adultos y 12 jóvenes el 28/07/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado, M. Flores y Á. L. Sánchez). Embalse de La Serena (BA): 8 adultos y 9 pollos el 18/05/12, 7 parejas, una con 8 pollos, en el el 12/06/12; 6 parejas, una con 4 pollos el 17/06/13 (S. Pérez, M. Sánchez, F. Sierra, D. Rivera, D. Vázquez, Á. Sánchez, J. López, J. M. Abad, T. Álvarez). Charca de Morantes (BA): una pareja con 6 pollos el 14/07/13 (F. Lopo). Embalse de Alcollarín (CC): 6 adultos y 6 pollos el 18/04/14 (F. Yuste), pareja con 6 pollos el 22/08/14 (S. Mayordomo), 5 adultos el 31/08/14 (M. Kelsey), 11 adultos y 6 pollos el 06/09/14 (F. Yuste) y 3 adultos y 6 pollos el 13/09/14 (C. Clemente, J. C. López, S. Mayordomo, V. Palacios y F. Yuste). Embalse de Villalba de los Barros (BA): macho territorial el 04/07/14, pareja con 6 pollos el 30/07/14 y 01/08/14; pareja con 4 pollos el 19/08/14; 2 adultos y 2 pollos el 07/09/14, el 18/09/14 y el 02/01/14 (J. M. Álvarez, F. Montaña y J. Vázquez). Embalse de Alqueva (BA): 15, incluyendo juveniles, el 13/09/14 (J. E. Rodríguez).
- **Censos de enero 2009-2014.** Los resultados de los censos de la Junta de Extremadura arrojan valores para Extremadura de cero individuos en 2009, 2010 y 2011, y los de SEO/BirdLife de 27 en 5 localidades en 2012, 31 en 6 localidades en 2013 y 81 en 9 localidades en 2014 (media 23 aves). La tendencia es muy positiva en la región, pasando de no ser observado antes de 2012 a volverse regular.
- **Año 2009.** 2 en Madrigalejo (CC) el 21/02/09 (SEO Cáceres). Uno en el embalse del Salor, Cáceres, el 22/04/09 (C. Fernández).
- **Año 2010.** Uno en Madrigalejo (CC) el 01/01/10 (M. Kelsey), el 09/01/10 (J. M. Tapia y M. Jiménez) y el 28/01/10 (M. Kelsey), y 4 el 07/02/10 (S.

Villa). 2 en el embalse de Alange (BA) el 06/02/10 (L. Alcántara). Una pareja en Orellana (BA) el 19/03/10 (Á. Díaz, B. Vigalondo, J. Fernández y M. Llorente). Uno en Portaje (CC) el 07/04/10 (J. Prieta). Uno el 16/06/10 en Cornalvo (BA) (J. Ledo). 4 en el embalse de Talaván (CC) el 22/10/10 (S. Mayordomo).

- **Año 2011**. Cornalvo (BA), máximo 5 del 11/01/11 al 30/01/11 (J. Ledo). Casas de Hitos (BA-CC), entre uno y 9 del 20/01/11 al 03/03/11 (G. Núñez-Lagos, SEO-Cáceres, S. Fletcher, C. Jewitt, M. Jewitt, A. Ortega, A. Maestre, J. Solana, R. Urquiaga, M. Kelsey). Embalse de Ahigal (CC), uno el 21/01/11 (J. Prieta). Navalmoral de la Mata (CC): 2 en la Dehesa Boyal el 8/02/11 (P. Gómez) y uno en laguna de Palancoso el 20/02/11 (J. P. Resino). Huélagá (CC), uno el 19/02/11 (C. Clemente). Valverde de Mérida (BA), uno el 22/03/11 (J. Solana). Oliva de Plasencia (CC), uno en Valverdejo el 11/04/11 y uno en Fresnedilla el 14/04/11 (R. Montero). Embalse de La Serena (BA), 2 el 04/06/11 (M. J. Valencia y X. Piñeiro). Embalse de Alange (BA), uno el 11/06/11 (D. Jorge, E. Mateos y J. Solana). Portaje (CC): uno del 11/08/11 al 05/11/11 (E. Palacios, S. Mayordomo). Sierra Brava (CC), 6 el 26/08/11 (Á. L. Sánchez y B. Cienfuegos). Los Canchales (BA): 3 del 19/09/11 al 25/11/11 (F. Lopo, F. Molinos, J. M. Salazar y otros). Embalse del Cubilar (CC), 2 el 13/11/11 (X. Piñeiro, E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M. J. Valencia y S. Mayordomo). El Borbollón (CC), uno el 18/12/11 (SEO-Cáceres). Riobobos (CC), 3 el 28/12/11 (J. Prieta).
- **Año 2012**. El Borbollón (CC), uno el 13/01/12 (C. Clemente, G. Naharro y P. Solano). Corral Alto, Zorita (CC): 12 el 14/01/12 (J. Porras), 6 el 29/01/12 (S. Mayordomo, P. Goñi, J. L. Guisado y C. Clemente), 2 el 28/07/12 (S. Mayordomo) y uno el 06/12/12 (M. Á. Muñoz y E. Palacios). Embalse del Rucas (CC) uno el 14/01/12 (J. Mahillo y C. Clemente). Embalse de La Serena (BA), 3 el 18/01/12 (X. Piñeiro). Navalmoral de la Mata (CC), 9 el 24/01/12 (P. Gómez). Embalse de Brozas (CC), 2 el 29/02/12 (C. Villaverde). El 06/05/12, 2 en Alqueva (BA) (E. Costillo) y 2 en Morantes (BA) (P. Herrador y J. L. Bautista). En Lancho, Arroyo de la Luz (CC), 2 el 11/05/12 y uno el 17/05/12 (S. Mayordomo). Embalse del Salor (CC), 2 el 31/05/12 (S. Molano). Los Canchales (BA): 4 el 19/08/12 (E. Costillo) y uno el del 20/09/12 al 23/09/12 (F. Montaña, F. Lopo, F. Castro, E. del Viejo, D. García, E. Costillo, A. Núñez, S. Mayordomo, E. Palacios, C. Clemente). Embalse del Cubilar (CC): entre 2 y 12 del 26/08/12 al 11/11/12 (S. Mayordomo, C. Clemente, E. Peña, W. Haworth, M. García del Rey, J. Mahillo, E. Peña, E. Palacios, Y. Muñoz, T. Laguna, P. Alonso, L. A. Rodríguez, J. M. Ruiz, J. Mora y A. Vivas). La Nava de Santiago (BA), 2 el 23/12/12 (J. L. Bautista).

- **Año 2013.** Embalse del Salor (CC), 2 del 01/01/13 al 23/02/13 (M. Cardalliaguet, F. J. Caballero y C. Fernández). Lancho (CC), 2 el 05/01/13 (C. Fernández). El 12/01/13 se observan 2 en los embalses de Ruecas y de Cubilar (CC) (C. Clemente, J. Guerra y M. Gálvez). 22 en el embalse de La Serena (BA) el 22/01/13 (D. Rivera y R. A. Rubio). Embalse de Orellana (BA), 2 el 24/01/13 y 17/02/13 (C. Clemente, E. Palacios, L. Alcántara, M. García del Rey y S. Mayordomo). La Solana, Herrera de Alcántara (CC), uno el 06/02/13 (J. Tarrío y R. Méndez). El Trasquilón, Cáceres, uno el 03/03/13 (C. Fernández). Corral Alto, Zorita (CC), 2 el 13/03/13 (Á. L. Sánchez). Las Canteras, Trujillo (CC), 2 el 01/04/13 (T. Earl). Palazuelo (BA), 2 el 15/05/13 (M. Kelsey). Valverde de Mérida (BA), 2 el 01/06/13 (F. Crystal) y 03/06/13 (J. Solana). Embalse del Cubilar (CC): entre 2 y 33 del 31/08/13 al 27/10/13 (C. Clemente, S. Mayordomo, J. A. Román, J. Cerezo, J. Á. Herrera y N. Baeza) con máximo el día 14/09/13 (J. P. Prieto). Embalse de Sierra Brava (CC), 11 el 08/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Embalse de Brovales (BA), 3 del 10/09/13 al 01/11/13 (F. Montaña, C. González, A. Núñez). En Morantes (BA), uno el 06/10/13 (F. Lopo), 2 el 18/10/13 (P. Herrador) y uno el 19/12/13 (P. Herrador). Los Canchales (BA), 6 el 01/11/13 (T. Álvarez). 2 en una charca en La Serena (BA) el 09/11/13 (F. Montaña y G. Montaña). Charca de La Isla, Logrosán (CC), 2 el 19/11/13 (J. A. Barquero). Valdecañas (CC), 2 el 23/11/13 (D. Langlois y S. Langlois).
- **Año 2014.** Marinejo, Trujillo (CC), 2 el 05/01/14 (S. Mayordomo). Sierra Brava (CC), 30 el 11/01/14 (E. Palacios y J. Prieta). Los Canchales (BA), 3 el 13/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra), 2 el 13/09/14 (J. L. Bautista), 2 el 09/10/14 (F. Lopo), 5 el 18/10 (V. de Alba y A. Núñez) y 2 el 13/09/14 (J. L. Bautista). Embalse de Alcollarín (CC): entre 1 y 34 del 25/01/14 al 15/12/14 (A. Calvo, F. Yuste, C. Clemente, S. Mayordomo, J. Solana, J. Muddeman, E. Palacios, M. Kelsey, S. Daly, M. Gálvez, J. Guerra, M. Á. Muñoz y B. Small), con máximo el 18/10/14 (F. Yuste). Arce de Abajo, Brozas (CC), 5 el 27/01/14 (C. Clemente y S. Mayordomo) y 29/01/14 (M. Iglesias). Embalse de La Serena (BA): 24 el 29/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra), 2 el 06/09/14 (F. Lopo) y más de 100 el 15/09/14 y todo el verano, en la cola de Belalcázar, límite con Córdoba (C. García Jiménez). Embalse del Cubilar (CC): 38 el 30/01/14 (J. Muddeman, A. Plumb, C. Cook y T. Plumb) y 2 el 26/12/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera). Gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), 3 el 12/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Los Arenales, Cáceres, 6 el 16/02/14 (A. Sánchez). Morantes (BA), 4 el 17/02/14 (J. L. Bautista). Orellana (BA), 2 el 23/02/14 (F. Montaña y G. Montaña) y 10/09/14 (L. Battle y J. Hill). Embalse del Tozo (CC): entre 2 y 4 del 08/03/14 al 20/04/14 (G. Sánchez, M. Kelsey) y 3 el 12/12/14 (N. Renwick). Valdecañas (CC), 8 el 15/03/14, uno el 18/04/14 (S. Mayordomo) y 2 el 26/05/14 (C. Clemente y S. Mayordomo), 05/06/14 (J.

M. Abad, M. Flores y Á. Sánchez, 15/12/14 y 24/12/14 (S. Mayordomo). Laguna del Campazo, La Aldea del Obispo (CC), 2 el 27/03/14, 4 el 29/04/14 y 2 el 17/11/14 (N. Renwick). Embalse de Villalba de los Barros (BA), 2 del 05/04/14 al 17/04/14 (J. M. Álvarez, J. Guerra y F. Montaña). Cornalvo (BA), 2 el 20/07/14 (P. Elías) y el 05/10/14 (A. Giraldo, D. Giraldo y A. M. Sánchez). Rivera de Albarragena, San Vicente de Alcántara (BA), 2 el 25/07/14 y 20/09/14 (J. Tarrío). Embalse del Salor (CC), 4 el 07/08/14 (C-J. Palacios y J. A. Román). Embalse de la Solana, Herrera de Alcántara (CC), 8 el 09/10/14 (A. Galán). Moheda Alta (BA), entre 8 y 57 del 20/10/14 al 27/12/14 (J. Porras, J. A. Barquero, M. Kelsey, M. Gálvez, J. Guerra, J. Solana, F. Montaña, G. Montaña, C. Clemente, S. Mayordomo, J. C. López, M. Pujol, N. Renwick) con máximo de 57 el 27/12/14 (J. Guerra, F. Bernáldez, F. Macías). Embalse de Alange (BA), 3 el 20/10/14 (J. A. Román) y 23/10/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Santa Amalia (BA), 2 el 28/11/14 (F. Yuste). Gévora (BA), uno el 20/12/14 (F. Mendoza y J. C. Paniagua).

Tarro canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus regional. Accidental. Se sospecha que casi todas las observaciones podrían ser de aves procedentes de cautividad. Observado anualmente entre 1996 y 2014, excepto en 1997 y 2003. Citas durante todo el año, pero sobre todo en invierno. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. En los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) nunca fue observado y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 4 individuos en 2012, 5 en 2013 y uno en 2014, en una localidad cada año, siempre diferente.
- Año 2009. En el río Jerte, Plasencia (CC), uno escapado del parque de los Pinos el 13/03/09 (J. Prieta) y 08/04/09 (S. Mayordomo). 3 en Palazuelo (BA) el 24/12/09 (J. M. Tapia y M. Jiménez).
- Año 2010. En Casas de Hitos (BA-CC), 3 el 01/01/10 (M. Kelsey), 01/02/10 (J. Corral y Ó. Llama) y 4/12/10 (C. Clemente, J. Mahillo, M. Kelsey y S. Mayordomo). Y quizás los mismos 3 en Moheda Alta (BA) el 19/12/10 (Á. Díaz y otros).
- Año 2011. En Plasencia (CC) se ven a lo largo del año 2011 hasta 3 aves en vuelo que escapan del parque de los Pinos (J. Prieta). Los Canchales (BA), 10 el 05/09/11 (E. del Viejo). Portaje (CC), 4 el 30/12/11 (J. C. Paniagua y S. Mayordomo).
- Año 2012. En Plasencia (CC) se ven a lo largo del año 2012 hasta 4 aves en vuelo que escapan del parque de los Pinos (J. Prieta). Siguen 4 en

Portaje (CC) los días 7/01/12 (S. Mayordomo), 16/01/12 (S. Mayordomo y M. Gómez) y 28/01/12 (S. Mayordomo). En Charco Salado, Casatejada (CC), uno los días 14/03/12 (S. Mayordomo, M. Gómez y J. Prieta) y 17/03/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Embalse de Valuengo (BA), 3 el 17/08/12 (S. Pérez). Los Canchales (BA), uno el 05/09/12 (P. Herrador y J. L. Bautista) y 06/09/12 (A. Calvo y F. Lopo). Morantes (BA), uno el 23/09/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente), 24/09/12, 19/10/12 (P. Herrador), 01/11/12 (P. Herrador y J. L. Bautista) y 04/11/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Valdecañas (CC), uno el 03/11/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). El Borbollón (CC), 2 el 15/12/12 (S. Mayordomo, M. Gómez, J. Prieta, J. Mahillo y C. Clemente).

- **Año 2013.** En Plasencia (CC) se ven a lo largo del año 2013 hasta 3 aves en vuelo que escapan del parque de los Pinos (J. Prieta). Moheda Alta (BA), 5 el 15/01/13 (D. Gosney). Una pareja en la Zarzuela, Calzadilla (CC), el 15/02/13 (Á. Rodríguez). Arrocampo (CC), uno con ánsares comunes el 15/03/13 (J. Muddeman). El Batán (CC), un macho el 30/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo) y 02/04/13 (J. Prieta) y uno en Galisteo y después en El Batán el 15/12/13 (J. Prieta y L. M. Parejo). Embalse de Montijo (BA), uno el 10/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Guareña (BA), un macho el 10/04/13 (M. Gálvez) y 11/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Torrealba, Torremocha (CC), uno el 26/04/13 (I. Jerez y J. L. Bautista). Valdecañas (CC), 2 el 08/11/13 (S. Mayordomo), 23/11/13 (D. Langlois y S. Langlois) y 01/12/13 (J. Briz y V. Risco). El Borbollón (CC), 2 el 16/11/13 (G. Naharro). Santa Amalia (BA) uno el 29/11/13 (F. Yuste). Sierra Brava (CC), 2 el 15/12/13 (C. Clemente, M. Kelsey y S. Mayordomo).
- **Año 2014.** En Plasencia (CC) se ven en la primera mitad de 2014 hasta 3 aves en vuelo que escapan del parque de los Pinos; después las aves son mantenidas en recntos techados y cesan los escapes (J. Prieta). Sigue un ejemplar en Holguera (CC) el 10/01/14 y en El Batán (CC) el 13/01/14, 19/01/14 y 03/02/14 (J. Prieta, C. Clemente y S. Mayordomo). Uno en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 12/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra). 2 en el embalse del Salor (CC) el 31/05/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). En Valdecañas (CC), 2 el 12/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios) y uno el 23/11/14 (J. Briz y V. Risco) y 15/12/14 (S. Mayordomo). Uno en el embalse de Alange (BA) el 06/07/14 (L. Alcántara, V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). En el embalse de Villalba de los Barros (BA), 2 el 02/08/14, el 19/08/14, el 07/09/14, 3 el 15/09/14 y uno el 18/09/14 (J. M. Álvarez, F. Montaña, J. Vázquez, V. de Alba y A. Núñez). 5 en Charco Salado, Casatejada (CC), el 15/08/14 (J. Briz, J. Gutiérrez del Sol y V. Risco). Moheda Alta (BA): uno el 29/11/14 (C. Clemente y S. Mayordomo) y 30/11/14 (J. C. López, M. Pujol y N. Renwick).

Tarro blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus regional. Reproducción regular en Valdecañas al menos desde 2011 (5-20 parejas). Invernante muy escaso (media 20, máximo 46; 2009-2014) con tendencia creciente. Citado todos los meses del año. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 2 individuos en 2009, 12 en 2010, cero en 2011, 46 en 2012, 20 en 2013 y 38 en 2014 (media 20 aves), siendo la cifra de 2012 el mayor registro regional. Las oscilaciones pueden deberse a la diferente cobertura entre censos. La principal localidad es el embalse de Sierra Brava con 32 ejemplares en enero de 2012. También es regular en el embalse de Valdecañas y su presencia es ocasional en el resto de localidades. La tendencia es aparentemente positiva, pasando de 7 aves de media en 1990-1995, a 9 de media y máximo de 19 en el periodo 2005-2008 y a 20 aves de media y máximo de 46 en 2009-2013. Al ser cifras muy bajas deben interpretarse con la debida cautela.
- Reproducción. Valdecañas (CC), 2011: 18 parejas el 05/05/11, una pareja con 2 pollos el 11/05/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Guerrero y M. Flores), al menos 5 parejas y 21 pollos los días 14/06/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado y M. Flores), 16/06/11 (S. Mayordomo) y 20/06/11 (J. Prieta), 2 adultos y 12 jóvenes el 28/07/11 (Á. Sánchez, A. L. Sánchez) y 5 adultos y 11 jóvenes el 08/09/11 (E. Palacios, S. Mayordomo). 2012: 16 adultos el 08/04/12, 22 el 19/04/12 (S. Mayordomo), 12 adultos y 20 pollos el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y C. Clemente); 18 adultos y 39 pollos en 5 polladas el 21/06/12 (M. Flores, J. A. Guerrero y Á. Sánchez); 24, la mayoría jóvenes o pollos, los días 07/07/12 y 21/07/12 (S. Mayordomo); 6 jóvenes el 01/09/12 (S. Mayordomo). 2013: 18 adultos el 07/04/13 (E. Palacios y S. Mayordomo); 5 parejas y 3 machos el 28/05/13 (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Rodríguez y M. Flores); 3 parejas el 31/05/13 (S. Mayordomo); 2 parejas el 15/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Prieta, J. L. Guisado y S. Mayordomo), 5 adultos y 16 pollos el 23/06/13 (C. Clemente y S. Mayordomo); 8 adultos y 10 pollos el 30/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo); 4 jóvenes y 10 pollos pequeños el 26/07/13 (S. Mayordomo); un adulto y 2 jóvenes el 01/08/13 (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo). 2014. Máximos mensuales de 15 el 25/05/14 (D. Langlois y S. Langlois); 25 el 12/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 25 el 08/08/14 (S. Mayordomo).
- Reproducción. Embalse del Búrdalo, Villamesías (CC): una hembra con 3 pollos el 10/05/14 (C. Clemente).
- Año 2009. 4 localidades. Embalse de Ahigal (CC), una pareja el 10/01/09 y una hembra en la laguna de Galisteo (CC) el 25/01/09 (S. Mayordomo).

3 en el embalse de El Borbollón (CC) el 31/10/09 (S. Mayordomo). Uno en el embalse del Salor (CC) el 20/12/09 (C. Fernández).

- **Año 2010.** 13 localidades. Casas de Hitos (BA-CC), entre 1 y 4 del 01/01/10 al 28/01/10 (M. Kelsey, A. Maestre, C. Luengo, SEO-Cáceres, M. Kelsey). Embalse de Nogales (CC), uno el 05/01/10 (A. Maestre y C. Luengo). laguna de Galisteo (CC), entre 1 y 4 del 08/01/10 al 11/03/10 (A. Julián, J. Prieta, R. Guzmán, S. Mayordomo). Charca del Embarcadero, Guijo de Coria (CC), uno el 18/01/10 (F. Buenaga). Palazuelo (BA), 8 el 24/01/10 (M. Kelsey). Laguna del Palancoso (CC), 5 el 29/01/10 (J. Briz y V. Risco). Santa Amalia (BA), uno el 31/01/10 (F. Yuste). Portaje (CC), una hembra el 14/02/10 (S. Mayordomo). Lagunas de Torremejía (BA), 5 el 20/02/10 y uno el 10/03/10 (F. Yuste). Sierra Brava (CC), dos el 13/03/10 (M. Kelsey) y 7 el 21/03/10 (D. Langlois y S. Langlois). Valdecañas (CC), 3 el 25/11/10 (J. Prieta). Moheda Alta (BA), 12 el 27/11/10 (Á. Sánchez). Los Canchales (BA), 3 el 6/12/10 (Á. Sánchez).
- **Año 2011.** 5 localidades. Moheda Alta (BA), 22-28 aves del 27/01/11 al 12/02/11 con máximo el 29/01/11 (M. Kelsey, G. Schreur, L. Lozano, J. Solana). Sierra Brava (CC), 6-12 aves del 12/02/11 al 03/03/11 (J. Solana, R. Romero y M. Kelsey). Portaje (CC), 2 el 25/06/11 (C. Clemente y J. Mahillo) y una hembra del 22/11/11 al 17/12/11 (J. Prieta, S. Mayordomo y E. Palacios). Los Canchales (BA), 3 del 25/10/11 al 19/11/11 (A. Cangas, E. del Viejo, J. P. Prieto). Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), 2 el 30/10/11 (S. Mayordomo) y el 01/11/11 (J. Briz).
- **Año 2012.** 10 localidades. Los Canchales (BA), 2-3 del 05/01/12 al 21/01/12 (E. del Viejo, A. Cangas, E. Costillo), uno el 22/04/12 (F. Lopo) y 1-2 del 02/12/12 al 13/12/12 (J. Solana, F. Lopo y otros). Embalse de Brovaes (BA), 3 el 10/01/12 y 14/01/12 (F. Montaña). Valdecañas (CC): 5 el 13/01/12 (J. Prieta), 4 el 24/01/12 (Á. Sánchez), uno el 23/11/12 (S. Mayordomo), 5 el 02/12/12 (V. Risco, S. Mayordomo, M. García del Rey, J. Prieta y J. Briz), 3 el 16/12/12 (F. Salas y A. Torrijo) y 4 el 23/12/12 (S. Mayordomo). Sierra Brava (CC): 32 el 14/01/12 y 29/01/12 (S. Mayordomo, M. Cardalliaguet, J. Prieta, J. Mahillo, E. Palacios y C. Clemente) y 35 el 16/02/12 (M. Kelsey). Santa Amalia (BA), uno el 18/01/12 (S. Mayordomo y J. Prieta). Embalse del Cubilar (CC), 2 el 29/01/12 (S. Mayordomo, P. Goñi, J. L. Guisado y C. Clemente). laguna de Galisteo (CC) una pareja del 04/02/12 al 10/02/12 (S. Mayordomo, R. Montero y J. Julián). Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), uno el 04/05/12 (M. Kelsey) y una pareja el 16/12/12 (J. A. Román). Esparragalejo (BA), 2 el 27/05/12 (Y. Simón, V. de Alba, J. Solana, G. Pizarro y A. Núñez) y el 07/06/12 (E. Palacios y C. Clemente). Embalse del Sotillo, Monroy (CC), una hembra el 12/12/12 (S. Mayordomo).

- **Año 2013.** 18 localidades. Sierra Brava (CC): 7-9 del 04/01/13 al 20/01/13 (C. Clemente, S. Mayordomo, A. Calvo, E. Palacios, J. Prieta), **30** el 24/02/13 (M. Kelsey), una pareja el 21/04/13 y 1-7 del 13/11/13 al 15/12/13 (M. Kelsey, J. Guerra, M. Gálvez, C. Clemente y S. Mayordomo). Los Canchales (BA): uno del 06/01/13 al 18/01/13 (F. Lopo, F. Montaña, J. Vázquez), del 21/03/13 al 30/03/13 (J. L. Bautista, P. Herrador), el 02/06/13 (F. Lopo) y el 14/12/13 (A. Núñez, J. Solana y V. de Alba). Torremejía (BA), 2 el 14/01/12 (J. Guerra y M. Gálvez). Santa Amalia (BA), uno el 14/01/12, 2 el 17/03/13, 2 el 11/04/13, 2-6 del 22/11/13 al 29/11/13 (F. Yuste). Valdecañas (CC): 2-3 del 15/01/13 al 26/01/13 (J. Prieta, S. Mayordomo), 15 el 24/02/13 (J. L. Guisado y P. Goñi) y 1-2 del 08/11/13 al 08/12/13 (S. Mayordomo, J. Briz y V. Risco). Portaje (CC): una hembra el 17/01/13 (S. Mayordomo). Riolobos (CC), 3 del 20/01/13 al 26/01/13 (J. Prieta, C. Clemente, J. Mahillo). Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), 22 el 10/02/13 (A. Calvo). Vivares (BA), 3 el 23/03/13 (B. Arenaz y M. Rodríguez). La Albuera (BA), uno el 30/03/13 (A. Nuñez, E. del Viejo, F. Yuste y V. de Alba). Embalse de Villalba de los Barros (BA): 6 el 04/04/13 (M. Gálvez), 2 del 09/04/13 al 17/04/13 (J. Guerra, M. Gálvez y S. Pérez) y 2 el 13/12/13 (J. M. Álvarez). Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), 2 el 07/04/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Embalse de Montijo (BA), uno el 10/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Guareña (BA), una pareja el 10/04/13 (M. Gálvez) y 11/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Moheda Alta (BA), una pareja el 13/04/13 (M. Kelsey). Embalse de Alange (BA), una pareja el 16/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Embalse de Talaván (CC), 2 jóvenes el 26/09/13 (J. Esteban) y 29/09/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Embalse de Ahigal (CC), uno el 03/12/13 (A. Pacheco). Embalse del Tozo (CC), 2 el 17/12/13 (M. Kelsey).
- **Año 2014.** 15 localidades. Arrozales de Palazuelo y entorno (BA-CC), 4 el 08/01/14 (A. Gil), 3 el 23/01/14, 3 el 26/02/14 (J. P. Prieto), uno el 26/04/14 (C. Clemente), 4 el 02/06/14 y uno el 12/12/14 (M. Kelsey). Valdecañas (CC), uno el 10/01/14, 7 el 15/03/14, 13 el 26/04/14, 3 el 24/11/14, 5 el 01/12/14 y 3 el 24/12/14 (S. Mayordomo, C. Clemente y E. Palacios). Embalse de Gargáligas (BA), 3 el 11/01/14 (C. Clemente, M. Gálvez y J. Guerra). Sierra Brava (CC), 16 ind. el 11/01/14 (E. Palacios y J. Prieta), 9 el 28/03/14 y 5 el 29/12/14 (M. Kelsey). Los Canchales (BA), 2 el 13/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y 6 del 24/01/14 (E. del Viejo) al 16/02/14, 5 el 29/11/14 (J. L. Bautista), 4-6 del 12/12/14 al 22/12/14 (M. Gálvez, J. Guerra, Y. Simón, J. Solana, J. L. Bautista). Laguna de Palancoso (CC), 6 el 23/01/14 y una pareja el 22/04/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Embalse de La Serena (BA), uno el 29/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Guareña (BA), 3 el 12/02/14 (J. A. Román). Santa Amalia (BA), 18 el 22/02/14, **22** el 25/02/14, 11 el 28/11/14 y uno el 06/12/14

(F. Yuste). La Albuera (BA), 7 del 08/03/14 al 11/03/14 (A. Núñez, J. A. Román), uno el 06 y 07/04/14 (L. Alcántara, J. C. Paniagua, Á. T. Mejías), uno el 02/12/14 (J. A. Delgado, F. Montaña, A. Núñez y J. A. Román) y el 11/12/14 (F. Montaña). Embalse de Alcollarín (CC), 2-7 del 18/04/14 al 14/06/14 (M. Kelsey, C. Clemente, F. Yuste, S. Mayordomo y E. Palacios). Esparragalejo (BA), 1-2 del 18/04/14 al 31/05/14 (F. Macías, J. G. Aparicio, J. Solana). Casas de Hitos (BA-CC), uno del 21/04/14 al 12/05/14 (M. Kelsey). Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), 4 el 02/08/14 (S. Mayordomo) y uno el 21/09/14 (J. Briz y V. Risco). Embalse de Talaván (CC), uno el 18/09/14 (M. Kelsey). El Paredón, Campanario (BA), uno el 24/11/14 (J. P. Prieto).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus regional. Invernante común (media 1.700, máximo 3.800 ejemplares; 2009-2014) con tendencia decreciente a largo (-57% en 1990-2014) y corto plazo (-71% en 2005-2014). Estival esporádico. Monotípica.

Criterio. Fechas estivales y extremas y cifras destacables fuera de Vegas Altas (>100).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 2.415 individuos en 2009, 1.204 en 2010, 314 en 2011, 1.534 en 2012, 822 en 2013 y 3.804 en 2014 (media 1.682 aves). La principal localidad es el embalse de Sierra Brava, con 2.290 ejemplares en enero de 2014 (lejos de los 8.200 de 2006). En segundo término destacan los embalses de La Serena, Alange y Gabriel y Galán. Los embalses de Valdecañas y Orellana han perdido mucha importancia. La tendencia es negativa en la región, pasando de 6.000 aves de media y máximo de 11.000 en el periodo 2005-2008 a 1.700 aves de media en 2009-2013 (-71%). Ello supone un cambio de tendencia en relación a años previos (3.921 de media en 1990-1995, a 6.025 aves en 2005-2008, +54%).
- Registros estivales. Valdecañas (CC), 2 machos el 15/05/12 (Á. Sánchez) y una pareja el 20/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios); un macho el 23/06/13 (C. Clemente y S. Mayordomo); una pareja el 25/05/14 (D. Langlois y S. Langlois) y un macho el 05/06/14 (J. M. Abad, M. Flores y Á. Sánchez). Un macho en Campo Lugar (CC) el 12/05/14 (M. Kelsey). Río Zújar, Campanario (BA), 2 parejas el 04/05/13 (J. A. Barquero y V. M. Quintana). Un macho en Campo Lugar (CC) el 12/05/14 (M. Kelsey). Embalse de Alcollarín (CC), un macho el 19/05/14 (J. Muddeman).
- Llegadas. Galisteo (CC), una hembra, y Portaje (CC), una hembra y 2 machos el 12/09/09 (S. Mayordomo). Casas de Hitos (BA-CC), pareja el

05/09/10 (E. Palacios, S. Fletcher y S. Mayordomo). Galisteo (CC), 3 machos y 2 hembras el 26/09/11 (J. Prieta) y 2 parejas en Ahigal (CC) el 27/09/11 (A. Pacheco). Un macho en Serrejón (CC) el 16/09/12 (S. Mayordomo, J. L. Guisado y M. García del Rey). Uno en Aldea del Cano (CC) el 29/09/12 (J. Prieta). 3 en Esparragalejo (BA) el 25/09/13 (J. Guerra). En Palazuelo (BA), uno el 27/09/13 (M. Kelsey) y 8 el 28/09/13 (A. Calvo). El 29/09/13, 2 en Los Canchales (BA) (E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez y S. Mayordomo), 2 en Aldea del Cano (CC) y 7 en Talaván (CC) (E. Palacios y S. Mayordomo). Un macho en Valdecañas (CC) el 08/08/14 (S. Mayordomo).

- **Últimos registros.** Pareja en La Albuera (BA) el 04/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). Pareja en Sierra Brava (CC) el 8/04/11 (J. Muddeman). 4 machos y 2 hembras en Valdecañas (CC) el 08/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Pareja en Peraleda de la Mata (CC) el 06/04/13 (R. Montero). Una pareja en Sierra Brava (CC) el 08/04/13 (M. Kelsey).

Ánade friso (*Anas strepera*)

Estatus regional. Reproductor escaso (1.000 individuos, 100-250 parejas; año 2007) con tendencia creciente. Invernante común (media 4.300, máximo 4.600; 2012-2014) con tendencia creciente a largo plazo (1990-2014) y aparentemente decreciente, pero posiblemente estable a corto plazo (-22% en 2005-2014). Monotípica.

Criterio. Reproducción, fechas extremas y cifras destacadas fuera de Vegas Altas (>100).

- **Censos de enero 2009-2014.** Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 4.603 individuos en 2009, 2.251 en 2010, 1.713 en 2011, 4.973 en 2012, 3.932 en 2013 y 4.016 en 2014 (media 3.581 aves). La principal localidad es el embalse de Sierra Brava, con 2.620 ejemplares en enero de 2012 (lejos de los 5.500 de 2006). En segundo término destacan los embalses de Los Canchales, Cubilar y La Serena, perdiendo importancia Orellana. Aparentemente la tendencia es negativa, pasando de 5.700 aves de media y máximo de 8.000 en el periodo 2005-2008 a 3.600 de media en 2009-2013 (-36%); aunque es posible que las diferencias se deban a la metodología. Por una parte, en 2005-2008 se obtuvieron cifras muy altas, puestas en duda por algunos autores; por otra, los valores de 2009-2011 son bajos y también puestos en duda; los valores de 2012-2014 se consideran fiables al ser obtenidos en Sierra Brava mediante recuentos fotográficos (media regional 2012-2014: 4.300 individuos). En periodos previos la media fue de 2.000 en el periodo 1990-1995 y 5.700 en 2005-2008.

- Registros de cría. Adulto con 3 pollos en Arrocampo (CC) el 07/05/09 (M. García del Rey). En Valdecañas 37 con comportamiento reproductor (CC) el 20/06/11 (ECV11) y algunas decenas el 28/05/13 (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Rodríguez y M. Flores). Lo mismo en el embalse de La Serena (BA) el 12/06/12 (S. Pérez, D. Rivera, Á. Sánchez, M. Sánchez, F. Sierra y D. Vázquez). Hembra con 10 pollos en Torrealba, Torremocha (CC), el 12/05/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Hembra con 5 pollos en Brovales (BA) el 16/05/13 (F. Montaña).
- Cifras de interés. En La Anguila, Serrejón (CC), 292 el 24/07/09 y 247 el 08/08/12 (S. Mayordomo). Más de 150 en el embalse de Valdecañas (CC) el 19/04/12 (Á. Sánchez).

Cerceta común (*Anas crecca*)

Estatus regional. Invernante común (media 21.050, máximo 22.950; 2012-2014) con tendencia creciente a largo plazo (+234%, 1990-2014) y aparentemente decreciente, pero posiblemente estable, a corto plazo (-26% en 2005-2014). Esporádico en época estival. Monotípica.

Criterio. Fechas estivales, fenología y concentraciones (>500).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 8.552 individuos en 2009, 13.066 en 2010, 15.299 en 2011, 22.943 en 2012, 19.835 en 2013 y 20.356 en 2014 (media 16.670 aves). La cerceta común se concentra en la Zona Centro, comarca de Vegas Altas, donde utiliza embalses para el reposo diurno. Entre ellos destaca Sierra Brava, con 15.750 ejemplares en enero de 2012 y 2014 (lejos de los 28.700 de 2006), seguido por los embalses de Cubilar (máximo 5.000) y Ruecas (máximo 5.000, de modo más ocasional) y las charcas de Majadas Altas (máximo 3.000). Esta distribución es la misma que en el periodo 2005-2008. Aparentemente la tendencia es negativa, pasando de 26.700 aves de media y máximo de 44.000 en 2005-2008 a 16.700 aves de media en 2009-2013 (-37%); aunque es posible que las diferencias se deban a la metodología. Por una parte, en 2005-2008 se obtuvieron cifras muy altas, puestas en duda por algunos autores; por otra, los valores de 2009-2011 son bajos y también puestos en duda; los valores de 2012-2014 se consideran fiables al ser obtenidos en Sierra Brava mediante recuentos fotográficos (media regional 2012-2014: 21.050 individuos). En periodos previos la media fue de 6.300 en el periodo 1990-1995 y 26.700 en 2005-2008.
- Registros en junio. 2 machos y una hembra en el embalse de Talaván (CC) el 17/06/11 (S. Mayordomo). En Valdecañas (CC), 5 el 20/06/11

(EV2011) y 2 machos el 23/06/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). Una pareja en Arrocampo (CC) el 17/06/14 (C. Clemente y S. Mayordomo).

- Llegadas. 7 en Casatejada (CC) el 21/07/09 y 3 en Saucedilla (CC) el 24/07/09 (S. Mayordomo). 6 en Casatejada (CC) el 26/07/10 (S. Mayordomo). Una hembra en Galisteo (CC) el 16 y 17/07/11 (S. Mayordomo, J. Prieta). 4 en Portaje (CC) el 22/07/11 (S. Mayordomo). Una hembra en Galisteo (CC) el 05/07/12 y 4 en Casatejada (CC) el 23/07/12 (S. Mayordomo). 4 en Galisteo (CC) (S. Mayordomo y E. Palacios) y 27 en Casatejada (CC) el 28/07/14 (S. Mayordomo).
- Últimos registros. Pareja en Galisteo (CC) el 11/04/10 (E. Palacios y S. Mayordomo) y un macho y 3 hembras el 16/04/10 (S. Mayordomo). Pareja en Galisteo (CC) el 12/04/11 (J. Prieta). Casas de Hitos (BA-CC), un macho el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo) y pareja el 13/05/11 (G. Schreur). Pareja en Monroy (CC) el 13/04/12 (S. Mayordomo). Pareja en la laguna de Palancoso (CC) el 22/04/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Un macho en Alcollarín (CC) el 26/04/14 (C. Clemente). Un macho en Valdecañas (CC) el 23/05/14 (S. Mayordomo). Macho en Alcollarín (CC) el 25/05/14 (C. Clemente).
- Cifras de interés. Se censan 1.000 ejemplares en La Torrecilla, Plasencia (CC), el 11/12/10 (J. Prieta). 480 en el embalse del Cubilar (CC) el 13/11/11 (X. Piñeiro, E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M. J. Valencia y S. Mayordomo). En Charco Salado, Casatejada (CC), 442 el 15/11/11 (J. Prieta) y 500 el 06/11/12 (Ó. Díaz y M. García del Rey). 900 en Majadas Altas, Campo Lugar (CC), el 11/11/13, 2.700 el 09/12/13 (M. Klesey) y más de 3.000 el 23/02/14 (A. Calvo).

Cerceta americana (*Anas carolinensis*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en enero de 2000 en Los Canchales. Subespecie *A.c.carolinensis*.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Un macho del 08 al 18/01/00 en Los Canchales (J.A.García Jiménez).

Ánade azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus regional. Residente común (8.500-26.000 individuos, 3.000-8.000 parejas; año 2007) con tendencia creciente. Invernante común (media 17.000, máximo 26.100; 2009-2014) con tendencia decreciente, tanto a largo plazo (-32% en 1990-2014) como a corto plazo (-44% en 2005-2014).

Subespecie *A.p.platyrrhynchos*.

Criterio. Cifras destacadas fuera de Vegas Altas (>500).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 26.106 individuos en 2009, 15.438 en 2010, 7.787 en 2011, 19.770 en 2012, 15.424 en 2013 y 16.142 en 2014 (media 16.777 aves). Aunque las mayores poblaciones se localizan en la Zona Centro, comarca de Vegas Altas, el ánade azulón es la anátida más ubicua y extendida en Extremadura; quedando sin censar una proporción desconocida, pero seguramente importante, de las aves. Destaca el embalse de Sierra Brava, con 7.500 ejemplares en enero de 2012 y 2014 (lejos de los 15.000 de 2005 y 2007), pero hay otras muchas localidades, todas en la cuenca del Guadiana, que pueden albergar más de mil aves: embalses de Gargáligas, Cubilar, Rucas, La Serena, Alange, Alqueva y Los Canchales, varios tramos del río Guadiana y balsas del Zújar y Casas de Hitos. Aparentemente la tendencia es negativa, pasando de 30.000 aves de media y máximo de 34.500 en 2005-2008 a 16.800 aves de media en 2009-2013 (-44%); aunque es posible que parte de las diferencias se deban a la metodología y al número de localidades censadas. En el caso de Sierra Brava los valores de 2012-2014 son los más precisos al ser obtenidos mediante recuentos fotográficos. Las medias regionales son: 24.930 individuos en 1990-1995, 30.000 en 2005-2008 y 17.100 en 2012-2014.
- Tendencia. A nivel español y europeo todos los índices apuntan al aumento. Según el programa SACRE la tendencia de la población reproductora en la Región Mediterránea Sur de España se considera ligeramente creciente (+1,3% anual) entre 1998 y 2013 (SEO/BirdLife). En Europa, origen de parte de las aves invernantes, la tendencia es “incremento moderado” (+70%, periodo 1980-2013; pero estable desde 1990) (PECBMS 2015). Ambos índices contrastan con la disminución apreciada en los censos de enero en Extremadura (1990-2014).
- Registros. Ejemplares leucísticos: uno en Valdecañas (CC) el 11/12/10 (J. Briz, D. Langlois, S. Langlois y Á. Sánchez), uno en Portaje (CC) al menos desde el 11/12/10 al 16/01/12 (E. Palacios, J. Gayo, S. Mayordomo, J. Prieta y otros) y otro en Sierra Brava (CC) el 29/01/12 (S. Mayordomo, P. Goñi, J. L. Guisado y C. Clemente).
- Registros. Ejemplares leucísticos: uno en Valdecañas (CC) el 11/12/10 (J. Briz, D. Langlois, S. Langlois y Á. Sánchez), uno en Portaje (CC) al menos desde el 11/12/10 al 16/01/12 (E. Palacios, J. Gayo, S. Mayordomo, J. Prieta y otros) y uno en Sierra Brava (CC) el 29/01/12 (S. Mayordomo, P. Goñi, J. L. Guisado y C. Clemente).

Ánade rabudo (*Anas acuta*)

Estatus regional. Invernante común (media 15.300, máximo 16.310; 2012-2014) con tendencia muy positiva a largo plazo (+1.750%, 1990-2014) y estable a corto plazo (2005-2014). Registros estivales esporádicos. Subespecie *A.a.acuta*.

Criterio. Fechas extremas y estivales y cifras destacadas fuera de Vegas Altas (>100).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 9.720 individuos en 2009, 2.920 en 2010, 11.222 en 2011, 16.310 en 2012, 16.053 en 2013 y 13.582 en 2014 (media 9.601 aves). Se concentra en la Zona Centro, comarca de Vegas Altas, donde utiliza embalses para el reposo diurno. Entre ellos destaca Sierra Brava, con 13.250 ejemplares en enero de 2012 (superando el máximo de 10.900 en 2005), y Gargáligas, con 8.500 en 2009 (lejos de los 22.000 de 2006). En algunos censos se anotan varios miles de ejemplares durante el día en ciertos arrozales (p.ej. Moheda Alta, Navalvillar de Pela). Aparentemente la tendencia es negativa, pasando de 13.800 aves de media y máximo de 22.600 en el periodo 2005-2008 a 9.600 aves de media en 2009-2014 (-30%); aunque es posible que las diferencias se deban a la metodología. Por una parte, en 2005-2008 se obtuvieron cifras muy altas, puestas en duda por algunos autores; por otra, los valores de 2009-2011 son bajos y también puestos en duda; los valores de 2012-2014 se consideran fiables al ser obtenidos en Sierra Brava mediante recuentos fotográficos. Si se tienen en cuenta sólo los tres años 2012-2014, la media regional asciende a 15.315 y la tendencia pasa a ser positiva (+10%). Por tanto, es mejor considerarla como estable. En periodos previos la media fue de sólo 836 en el periodo 1990-1995 y 13.800 en 2005-2008.
- Registros estivales. Una pareja en Sierra Brava (CC) los días 05/05/12 y 13/05/12 (M. Kelsey). 2 machos en Valdecañas (CC) el 28/05/13 (A. Sánchez, F. Hurtado, J. Rodríguez y M. Flores). En el embalse de Alcollarín (CC) 2 machos el 12/05/14 (M. Kelsey), 3 machos y una hembra el 19/05/14 (J. Muddeman), y 2 machos el 02/06/14 (M. Kelsey) y el 14/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios).
- Llegadas. 4 en Guijo de Coria (CC) el 20/09/09 y 2 hembras en Galisteo (CC) (S. Mayordomo). 2 machos 09/08/10 en Casatejada (CC) (E. Palacios y S. Mayordomo). El 19/09/11 se observan 6 en el embalse de Ahigal (CC) (A. Pacheco) y 5 en Casatejada (CC) (E. Pérez-Balsalobre, M. García del Rey, M. Sánchez y S. Mayordomo). En Galisteo (CC), 2 el 01/09/12 (J. Prieta) y 3 el 04/09/12 (S. Mayordomo). Una pareja en Portaje (CC) el 20/09/12 (S. Mayordomo). 2 machos y una hembra en

Moheda Alta (BA) el 31/08/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). 6 en Los Canchales (BA) el 03/09/13 (E. del Viejo, J. Solana, J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Valdecañas (CC) el 08/08/14 y otro en Alcollarín (CC) el 22/08/14 (S. Mayordomo).

- Últimos registros. 15 en La Albuera (BA) el 04/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). Una pareja en Sierra Brava (CC) el 24/04/11 (G. Schreur). En La Albuera (BA) una pareja el 18/04/13 (A. García y A. Núñez).

Cerceta carretona (*Anas querquedula*)

Estatus regional. Invernante ocasional. Migrante poco común en ambos pasos, más frecuente en el prenupcial (80% de los registros; 200-500 ejemplares) que en el postnupcial. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Invernada. una hembra en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), entre el 01/11/10 y el 15/11/10 (J. Prieta y S. Mayordomo).
- Paso prenupcial 2009. 31 machos y 11 hembras en Sierra Brava (CC) el 11/03/09 (S. Fletcher). Un macho en Talaván (CC) el 13/03/09 y un macho y 2 hembras en Portaje (CC) (S. Mayordomo). En Arrocampo (CC) 6 el 13/03/09 (S. Fletcher) y una pareja el 22/03/09 (D. Langlois y S. Langlois). Un macho en la laguna de Galisteo (CC) el 15/03/09, el 20/03/09 y el 17/04/09 (S. Mayordomo).
- Paso prenupcial 2010. laguna de Galisteo (CC) 5 el 17/03/10, 3 machos el 21/03/10 y 2 machos y una hembra el 27/03/10 (S. Mayordomo). 10 en Moheda Alta (BA) el 20/03/10 (Á. Díaz, B. Vigalondo, J. Fernández y M. Llorente). 11 en Sierra Brava (CC) el 21/03/10 (D. Langlois y S. Langlois). En Casas de Hitos (BA-CC), 8 el 29/03/10 (T. Naturalist) y 11 el 31/03/10 (M. Kelsey). 3 en el embalse del Cubilar (CC) el 02/04/10 (A. Maestre y C. Luengo). Un macho en La Albuera (BA) el 04/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez).
- Paso prenupcial 2011. 2 machos y una hembra en Moheda Alta (BA) el 11/02/11 (G. Schreur, M. Kelsey y otros). Una pareja en Arrocampo (CC) el 12/03/11 (E. Palacios, N. Moral y S. Mayordomo). Un macho en la laguna de Galisteo (CC) el 05/04/11 (S. Mayordomo).
- Paso prenupcial 2012. Un macho el 06/03/12 en Guijo de Coria (CC) (J. Prieta). En Charco Salado (CC) un macho el 10/03/12 (P. de la Nava, J. C. López), 3 machos el 17/03/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y el 18/03/12 (S. Langlois, J. A. López y D. Langlois), y 2 machos el 24 y 30/03/12 (S. Mayordomo, M. García del Rey y E. Palacios). En Arrocampo (CC), 4 el 13/03/12 (V. Risco, M. García del Rey y J. Briz),

un macho el 14/03/12 (S. Mayordomo, M. Gómez y J. Prieta) y una el 20/03/12 (L. Rivas). Una en el embalse de Ahigal (CC) el 13/03/12 (A. Pacheco). En Charco Salado (CC) un macho los días 04/04/12 (S. Mayordomo y J. L. Guisado) y 05/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios).

- Paso prenupcial 2013. Una pareja en El Batán (CC) el 10/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). 3 machos y 2 hembras en Los Canchales (BA) el 15/03/13 (F. Bernáldez). Una pareja en Moheda Alta (BA) el 17/03/13 (M. Kelsey). Un macho en el embalse de Alange (BA) el 21/03/13 (J. Guerra). 2 machos y una hembra en la laguna de Galisteo (CC) el 24/03/13 (J. Prieta). Una pareja en La Albuera (BA) el 29/03/13 (A. García y A. Núñez). 2 en Torrealba, Torremocha (CC), el 30/03/13 (J. P. Prieto y W. Haworth). Una pareja en Charco Salado (CC) el 07/04/13 (S. Mayordomo). En Guareña (BA), una pareja los días 12, 14 y 16/04/13 (J. Guerra, M. Gálvez, A. Núñez, F. Castro, F. Lopo, J. Solana, L. Alcántara, S. Pérez, V. de Alba, B. Iglesias). Una pareja en Talaván (CC) el 17/04/13 (C. Clemente). Una pareja en el embalse de Guadiloba (CC) el 19/04/13 (J. L. Bautista). Una en Alange (BA) el 25/04/13 (J. Guerra).
- Paso prenupcial 2014. Un macho en la laguna de Galisteo (CC) el 07/03/14 (S. Mayordomo). Un macho en La Albuera (BA) el 08/03/14 (A. Núñez) y 09/03/14 (F. Montaña). Una pareja en Majadas Altas, Campo Lugar (CC), el 10/03/14 (M. Kelsey). Un macho en el embalse de Brovales (BA) el 21/03/14 (F. Montaña). Un macho en la laguna de Galisteo (CC) el 05/04/14 y el 07/04/14 (S. Mayordomo). Una pareja en Arrocampo (CC) el 13/04/14 (W. Haworth, J. P. Prieto, G. Russell y P. Russell). Un macho en Cerro Alto, Saucedilla (CC), el 16/05/14 (J. Andrews y W. Kleefstra).
- Paso postnupcial. 2009. Un macho en Sierra Brava (CC) el 31/10/09 (J. L. Anguita). 2010. En la laguna de Galisteo (CC), 2 el 16/07/10 y una el 22/07/10 (S. Mayordomo); un macho del 05/08/10 al 08/08/10 (J. Prieta, E. Palacios y S. Mayordomo). Una hembra en Charco Salado (CC) el 18/08/10 (S. Mayordomo). Un macho en Moheda Alta (BA) el 05/09/10 (E. Palacios y S. Mayordomo). 2011. Una hembra en la laguna de Galisteo (CC) el 16/07/11 (S. Mayordomo) y 17/07/11 (J. Prieta). Un macho en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 17/07/11 (J. Prieta). En Charco Salado (CC) una hembra el 02/08/11 (E. Palacios y S. Mayordomo) y 2 el 04/08/11 (E. Pérez-Balsalobre y M. García del Rey). Una hembra/joven en La Albuera (BA) el 22/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). 2012. 2 en Moheda Alta (BA) el 14/08/12 (M. Kelsey). En la laguna de Galisteo (CC) 2 machos del 16/08/12 al 22/08/12 (S. Mayordomo y J. Prieta). 7 en el embalse del Cubilar (CC) el 26/08/12 (S. Mayordomo y C. Clemente). 2013. laguna de Galisteo (CC), 2 el 08/07/13 (J. Prieta). La Albuera (BA), un macho el 13/07/13 (J. C. Paniagua) y una el 05/09/13 (M.

Gálvez). Una hembra en Charco Salado (CC) el 13/08/13 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo). Una hembra en Moheda Alta (BA) el 07/09/13 (M. Gálvez, J. Guerra). Un joven en el embalse del Moral, Santos de Maimona (BA), el 08/10/13 (F. Montaña). 2014, laguna de Galisteo (CC), una el 20/07/14 y el 28/07/14 (S. Mayordomo y E. Palacios), 2-8 del 05/08/14 al 18/08/14 (S. Mayordomo, R. Montero y J. Prieta). Charco Salado (CC), una el 07/08/14 (S. Mayordomo), el 15/08/14 (J. Briz, J. Gutiérrez del Sol y V. Risco) y el 25/08/14 (S. Mayordomo) y 3 el 21/08/14 (J. Prieta). La Albuera (BA), 2 el 11/08/14 (F. Montaña y J. Vázquez). Una en Majadas Altas, Campo Lugar (CC), el 26/08/14 (M. Kelsey). Casas de Hitos (BA-CC), una el 30/08/14. Moheda Alta (BA); una el 30/08/14, 2 el 02/09/14 y una el 06/09/14 (M. Kelsey). Canchales (BA), una el 03/09/14 (J. Guerra).

Cerceta aliazul (*Anas dicors*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Saucedilla en mayo de 2014.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primer registro para Extremadura. Un macho en la balsa de Cerro Alto, Saucedilla (CC), el 16/05/14 (J. Andrews y W. Kleefstra).

Cuchara común (*Anas clypeata*)

Estatus regional. Reprodutor muy escaso o esporádico (20-50 individuos, 0-10 parejas; año 2007). Invernante común (media 20.600, máximo 25.400; 2012-2014) con tendencia creciente a largo plazo (+212% en 1990-2014) y decreciente a corto plazo (-29% en 2005-2014). Monotípica.

Criterio. Época de cría y cifras destacadas fuera de Vegas Altas (>250).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 14.574 individuos en 2009, 15.737 en 2010, 16.234 en 2011, 25.413 en 2012, 21.076 en 2013 y 15.240 en 2014 (media 18.045 aves). Se concentra en la Zona Centro, comarca de Vegas Altas, donde utiliza embalses para el reposo diurno. Entre ellos destaca Sierra Brava, con 17.800 ejemplares en enero de 2012 (lejos de los 28.700 de 2006), seguido por el embalse de Cubilar (máximo 3.100) y las charcas de Majadas Altas (máximo 2.700). Ninguna localidad más ha superado el millar de ejemplares (Orellana y Gargáligas, lo hicieron antes de 2009). Aparentemente la tendencia es negativa, pasando de 29.150 aves de media y máximo de 51.900 en el periodo 2005-2008 a 18.050 aves de media en 2009-2013 (-38%); aunque es posible que las diferencias se deban a la metodología. Por una

parte, en 2005-2008 se obtuvieron cifras muy altas, puestas en duda por algunos autores; por otra, los valores de 2009-2011 son bajos y también puestos en duda; los valores de 2012-2014 se consideran fiables al ser obtenidos en Sierra Brava mediante recuentos fotográficos. No obstante, teniendo en cuenta los tres años 2012-2014, la media regional es similar (20.576) y la tendencia sigue siendo negativa (-29%). En periodos previos la media fue de sólo 8.500 en el periodo 1990-1995 y 29.150 en 2005-2008.

- Reproducción. Una hembra y un nido con 8 huevos en Valdecañas (CC) el 20/06/11 (S. Mayordomo y J. Prieta). En el embalse de Villalba de los Barros (BA), pareja con un pollo el 01/06/13 (A. Núñez, F. Montaña, J. M. Álvarez y J. A. Román) y 2 machos el 12/06/13 (Á. Sánchez y J. M. Abad). Varios pollos en Los Canchales (BA) el 02/06/13 (F. Lopo). La Albuera (BA): una el 07/06/14 (J. C. Paniagua), una pareja el 16/06/14 (J. A. Román) y 7, entre ellos juveniles, el 29/06/14 (J. C. Paniagua).
- Registros en mayo y junio. Arrocampo (CC), un macho el 17/06/09 (J. Prieta y S. Mayordomo), 2 machos el 01/05/13 (E. Palacios y S. Mayordomo) y una hembra el 15/05/14 (J. Prieta). La Albuera (BA), un macho el 21/06/09, un macho el 01/05/11 (J. Guerra y M. Gálvez) y 2 machos y una hembra el 17/05/13 (A. Núñez). Casas de Hitos (BA-CC), 3 machos y una hembra el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo). Valdecañas (CC), un macho el 05/05/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Guerrero y M. Flores), un macho el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y C. Clemente), varios el 28/05/13 (M. Flores), 20 el 15/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Prieta, J. L. Guisado y S. Mayordomo), 5 el 04/05/14 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 8 el 26/05/14 (C. Clemente). En el embalse de Talaván (CC), uno el 20/05/11 (A. Núñez). En Sierra Brava (CC), 2 el 05/12/12 (M. Kelsey), un macho el 08/05/12 (J. Muddeman) y 10 el 13/05/12 (M. Kelsey). En Charco Salado (CC), un macho el 06/05/12 y una pareja el 19/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). En Lancho, Arroyo de la Luz (CC), un macho del 11/05/12 al 25/05/12 (S. Mayordomo). Un macho en Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), el 20/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). laguna de Galisteo (CC), una pareja el 30/05/12 (S. Mayordomo). En la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), 2 machos el 01/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y 3 machos y una hembra del 04 al 07/05/13 (A. Núñez, E. Palacios, S. Mayordomo, V. de Alba, F. Montaña, J. Solana, J. Vázquez y S. Pérez). Lagunas de Torremejía (BA), un macho el 02/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y 11/05/13 (E. Streich y M. Gálvez). 2 machos en el arrozal de Riolobos (CC) el 03/06/13 (S. Mayordomo). En embalse de Alcollarín (CC), 3 el 14/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios).

- Llegadas. Una hembra en Galisteo el 02/08/09 y un macho y 3 hembras en Gañán, Guijo de Coria (CC), el 08/08/09 (S. Mayordomo). En Galisteo (CC) una hembra el 02/07/10 (S. Mayordomo) y una hembra y 2 machos el 03/07/10 (C. Clemente y J. Mahillo). Una hembra en Talaván (CC) el 16/07/11 y en Charco Salado el 26/07/11 (S. Mayordomo). En Charco Salado (CC) 3 hembras el 02/08/12 (S. Mayordomo y J. Prieta). Una hembra en la Anguila, Serrejón (CC), el 08/08/12 (S. Mayordomo). 10 en La Albuera (BA) el 06/07/13 (J. M. Mirasierra y J. C. Paniagua). 4 en Galisteo (CC) el 08/07/13 (J. Prieta). 2 en Valdecañas (CC) el 02/08/14 (S. Mayordomo).
- Últimos registros. 8 parejas en Valdecañas (CC) el 19/04/12 (Á. Sánchez), un macho en Llancho, Arroyo de la Luz (CC), el 20/04/12 (S. Mayordomo) y 2 parejas en Charco Salado (CC) el 29/04/12 (J. Briz). 2 en Torremejía (BA) el 30/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez).
- Híbridos. En Orellana, ancón de Casas de Don Pedro (BA), el 17/02/13 (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo): ejemplar no identificado que podría ser un cuchara australiano (*Anas rhynchos*), un híbrido entre cuchara europeo y cerceta canela (*Anas clypeata* x *A. cyanoptera*) o un híbrido entre cuchara europeo y cerceta aliazul (*A. clypeata* x *A. discors*). Otro similar en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 29/11/14 (J. Solana).

Cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)

Estatus regional. Accidental. Cuatro registros entre 1989 y 2003; dos en enero, uno de junio y otro sin fecha. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Una en enero de 1989, localidad desconocida; una en enero de 1990 en el embalse de Orellana; y una en la cuenca del Tajo en 1991-1997 (Prieta, 2007). Dos aves en Cáceres el 06/06/03 (B. Luc).

Pato colorado (*Netta rufina*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso (5-25 parejas; año 2007) con tendencia desconocida. Invernante escaso (media 45, máximo 95; 2009-2014) con tendencia muy negativa a largo plazo (-86% en 1990-2014) y a a corto plazo (-66% en 2005-2014). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 24 individuos en

2009, 95 en 2010, 58 en 2011, 18 en 2012, 24 en 2013 y 52 en 2014 (media 45 aves). Las oscilaciones pueden deberse a la diferente cobertura. Las principales localidades son los embalses de Los Canchales (81 en 2010), Alange (34 en 2011) y Orellana (20 en 2012) y las lagunas de La Albuera (22 en 2014). Presencia irregular de pequeños bandos en 4-6 localidades por año. La tendencia es claramente decreciente, pasando de 328 aves de media y 1.382 de máximo (todas en Orellana) en 1990-1995, a 135 de media y máximo de 401 en el periodo 2005-2008 y a 45 aves de media y 95 de máximo en 2009-2014. La enorme pérdida de importancia de Orellana, que acogía buenas concentraciones en época de muda que en parte se mantenían en invierno, es responsable de la mala situación actual.

- Año 2009. 2 parejas en Sierra Brava (CC) el 05/05/09 (J. Muddeman). 4 en el embalse de Ayuela (CC) el 19/09/09 (C. Fernández). Una hembra en Portaje (CC) el 18/10/09 (S. Mayordomo). 2 machos en Moheda Alta (BA) el 05/12/09 (C. Clemente y S. Mayordomo).
- Año 2010. Casas de Hitos (BA-CC), 6 del 23/01/10 al 28/01/10 (A. Maestre y C. Luengo; M. Kelsey). Moheda Alta (BA), 4 el 25/01/10 (M. Kelsey). La Albuera (BA), una pareja el 18/03/10 (J. Muddeman) y 3 machos el 04/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). 2 machos en Arrocampo (CC) el 20/06/10 (C. Clemente). Una hembra en Portaje (CC) el 26/09/10 (S. Mayordomo).
- Año 2011. Un macho en Casas de Hitos (BA-CC) el 21/01/11 (E. Palacios, J. García, M. Á. Muñoz y F. Ramírez). El 06/02/11 se observa un macho en la Charca de Brozas (CC) (F. Carrero, P. Be Water y R. Parra). Embalse de Cubilar (CC), una pareja el 06/02/11 (C. Jewitt y M. Jewitt), una hembra el 13/11/11 (M. Gálvez, E. Palacios, J. Guerra, M. J. Valencia, S. Mayordomo y X. Piñeiro) y 3 machos el 15/11/11 (F. Bernáldez). Una pareja en Sierra Brava (CC) el 11/02/11 (G. Schreur, M. Kelsey y otros). 5 machos y una hembra en embalse del norte de Badajoz el 24/04/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). 5 machos y una hembra en el Gadiana, Talavera la Real (BA), el 04/05/11 (G. Schreur). 10 machos y 2 hembras en el embalse de Alange (BA) el 17/05/11 (Á. Sánchez). Una hembra en la laguna de Galisteo (CC) el 31/07/11 (S. Mayordomo). Una hembra en La Albuera (BA) el 18/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). Un macho en La Atalaya, Aldea del Cano (CC) del 25 al 29/09/11 (M. Iglesias; S. Mayordomo). En Moheda Alta (BA) un macho el 29/11/11 (M. Kelsey).
- Año 2012. Embalse de Llerena (BA), 2 el 14/01/12 (G. Gahete), 2 machos y una hembra el 05/06/12 (J. Vázquez y F. Montañón). Moheda Alta (BA): una hembra el 14/01/12, 2 machos y una hembra el 29/01/12 y 11/02/12, una hembra el 28/07/12, un macho el 09/11/12, 2 machos el

10/11/12 y 7 el 25/11/12 (S. Mayordomo, M. Cardalliaguet, A. Vivas, C. Clemente, J. Solana). 11 en Madrigalejo (CC) el 18/01/12 (D. Rivera, B. Cienfuegos y Á. L. Sánchez). Morantes (BA): una pareja el 21/01/12 9 el 17/03/12, 2 parejas el 30/03/12, 4 machos y 3 hembras el 06/05/12, un macho el 23/12/12 (P. Herrador, J. L. Bautista, I. Jerez, F. Lopo). La Atalaya (CC): 5 machos y 2 hembras el 04/03/12 (J. Solana), 3 parejas el 09/03/12 (S. Molano), uno el 23/09/12 (J. Solana y C. Fernández), una pareja el 29/09/12 (J. Prieta), 2 machos el 14/10/12, 2 el 19/08/12 (J. Solana), 2 el 04/11/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 2 machos el 18/11/12 (J. C. López), 3 el 18/12/12 (A. Maestre). Los Canchales (BA), 4 machos y 2 hembras el 23/03/12, 2 el 05/12/05/12, 2 machos el 20 y 27/10/12 (E. del Viejo y A. Cangas), 2 machos el 04/11/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en el Guadiana, La Zarza (BA), el 03/05/12 (G. Pizarro). Sierra Brava (CC), 7 machos y 4 hembras el 08/05/12 (J. Muddeman), 12 el 13/05/12 y 2 parejas el 21/05/12 (M. Kelsey). Un macho en la gravera del Soto (BA) el 11/06/12 (J. Solana). En Portaje (CC), 3 machos el 18/07/12 y 26/07/12, 5 del 04/08/12 al 23/08/12 (S. Mayordomo). 3 machos y 3 hembras/juveniles en García de Sola (BA) el 06/09/12 (S. Pérez). Embalse del Cubilar (CC), un macho el 18 y 19/10/12 (E. Peña), 8 el 17/11/12 (M. Kelsey) y 4 el 18/11/12 (SEO-Badajoz). Un macho en la charca de La Isla, Logrosán (CC), el 28/10/12 (S. Mayordomo y J. Mahillo).

- Año 2013. Sierra Brava (CC), uno el 12/01/13, 8 el 12/03/13, 5 el 02/11/13, un macho el 13/11/13, 2 machos el 08/12/13, un macho y 2 hembras el 15/12/13 (E. Palacios, J. Prieta, M. Kelsey, C. Clemente, S. Mayordomo, A. Núñez y otros). Alange (BA), uno el 13/01/13, una pareja el 21/03/13, uno el 22/03/13, 2 machos y una hembra el 06/05/13, una pareja el 11/05/13 y un macho los días 15/05/13 y 20/05/13, 2 el 13/06/13, una hembra el 26/09/13, un macho el 10/11/13 (J. Solana, M. Gálvez, J. Guerra). Orellana (BA), 20 el 24/01/13 (D. Rivera), 150 el 04/03/13 (Á. L. Sánchez), 2 machos el 17/05/13 (M. Gálvez), 10 el 20/12/13 (J. A. Barquero). Embalse de Los Molinos (BA), 2 el 27/01/13 (L. Alcántara). Embalse del Zújar (BA), 10 el 28/01/13 (L. Lozano). Valdelagrana (BA): 15 machos y 12 hembras el 12/02/13 (Á. Sánchez y J. M. Rama), 30 el 06/09/13 (C. González), 6 el 13/09/13 (Á. L. Sánchez y C. González) y 2 el 24/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Villalba de los Barros (BA), un macho el 16/02/13, una pareja el 17 y 19/04/13, 4 machos el 12/06/13 (F. Bernáldez, J. M. Abad, B. Iglesias, M. Gálvez). La Albuera (BA), 21 el 28/02/13, 6 el 22/03/13, 4 el 30/03/13, 3 el 17/04/13, 2 parejas el 18/04/13, un macho el 21/04/13, 2 machos el 07 y 09/05/13, 2 parejas el 06/07/13, una pareja el 10/07/13, 4 el 03/08/13, uno el 11/08/13, 5 el 20/08/13, 6 el 31/08/13 y 2 el 08/09/13 (J. Guerra, M. Gálvez, A. Núñez, E. del Viejo, F. Yuste, V. de Alba, J. C. Paniagua,

A. García, F. Bernáldez, L. Alcántara, S. Pérez, F. Macías, F. Montaña y J. Vázquez). Los Canchales (BA), 3 machos y una hembra el 15/03/13 (F. Bernáldez) y hembra con 4 pollos el 24/05/13 (S. Pérez). Lagunas de Torremejía (BA), una pareja el 25/03/13, una hembra el 15/05/13 (A. Cama, J. Guerra, M. Gálvez y M. Pauli). Laguna del Hondo, Granja de Torrehermosa (BA), 4 parejas el 29/03/13 (G. Gahete). En el Guadiana (BA), 3 machos y una hembra el 26/04/13 (F. Lopo). La Atalaya (CC), 3 el 21 y 23/07/13, un macho el 04/08/13, 7 el 15/08/13, 8 el 17/08/13, una hembra el 06/09/13, 5 el 22/09/13, 3 el 26/09/13, 6 el 29/09/13, 6 el 05/10/13, 3 el 29/10/13 y una hembra el 15/12/13 (J. Solana, C. Clemente, M. García del Rey, S. Mayordomo, S. Pérez, J. Guerra, M. Gálvez, E. Palacios). Gravera del Soto (BA), una hembra el 05/08/13 (J. Solana). Charca de Murtales (BA), 22 machos el 13/08/13 (A. Gil y J. Fernández). Gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), una hembra el 09/09/13 (R. Montero). En Portaje (CC), una hembra el 04/10/13 (S. Mayordomo) y 2 hembras el 20/10/13 (J. Prieta). Embalse del Moral (BA), un macho el 17/11/13 (A. Núñez, C. Clemente, E. Palacios y otros).

- Año 2014. La Albuera (BA), 6 el 11/01/14, 7 el 25/01/14, 7 el 09/02/14, 7 el 20/02/14, un macho el 07/03/14, 2 parejas el 08, 09 y 17/03/14, 3 machos y 2 hembras el 06 y 26/04/14, una hembra el 12/07/14, uno el 14/10/14 (P. Mendoza, J. C. Paniagua, J. Muddeman, J. P. Prieto, G. Schreur, A. Núñez, F. Montaña, F. Lopo, L. Alcántara, J. Mazón). Alange (BA), 5 el 14/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra), 6 el 06/07/14 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). Embalse de Tentudía (BA), 5 el 18/01/14 (A. Pacheco). Los Canchales (BA): 8 el 24/01/14 (E. del Viejo) y una hembra el 04/09/14 (M. Gálvez). Orellana (BA), 10 el 28/01/14, uno el 16/02/14, 4 el 23/02/14 (M. Kelsey, P. Kelsey, F. Montaña, G. Montaña, M. Gálvez, J. Guerra). Río Ardila (BA), un macho el 15/02/14 (F. Montaña). Valdelagrana (BA), 12 el 10/03/14 (A. Cama, M. Gálvez, J. Guerra y M. Pauli). Moheda Alta (BA), 2 parejas el 26/03/14, una pareja el 01/04/14, un macho el 30/10/14 y 01/11/14 (M. Kelsey). Morante (BA), un macho el 10/04/14 (P. Herrador). Torrealba (CC), un macho el 12/04/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Gravera del Soto (BA), 1 pareja el 14/04/14 (M. Gálvez). Guadiana, Talavera la Real (BA): 2 machos el 16/04/14 (J. C. Paniagua). Villalba de los Barros (BA), 2 el 17/04/14, 2 machos y una hembra el 10/05/14, una hembra el 19/08/14 (J. M. Álvarez, F. Montaña, J. Vázquez). Alcollarín (CC), 2 el 18/04/14, una pareja el 26 y 27/04/14, el 25/05/14, el 02/06/14, un macho el 14/06/14 (F. Yuste, C. Clemente, S. Mayordomo, M. Kelsey, E. Palacios). Lagunas de Torremejía (BA), una pareja el 20/04/14 (J. G. Aparicio). Casas de Hitos (BA-CC), una pareja el 21/04/14 (M. Kelsey). laguna de Galisteo (CC), una hembra el 05/08/14 (S. Mayordomo).

Esparragalejo (BA), un macho y 2 hembras el 26/09/14 (J. A. Román). Charca del canal de Las Dehesas (BA), 2 machos el 27/09/14 (J. Muddeman). Sierra Brava (CC), 6 el 18/10/14 (F. Yuste), un macho el 29/12/14 (M. Kelsey). La Atalaya (CC), uno el 04/11/14 (S. Molano). Embalse de Montijo (BA), uno el 15/11/14 (A. Cangas y E. del Viejo).

Porrón europeo (*Aythya ferina*)

Estatus regional. Reprodutor muy escaso (10-25 parejas; año 2007) con tendencia actual desconocida. Invernante escaso (media 750, máximo 1.964; 2009-2014) con tendencia negativa a largo plazo (-65% en 1990-2014), pero estable a corto plazo (2005-2014). Grandes fluctuaciones entre años. Monotípica.

Criterio. Época de cría, fenología y cifras importantes (>25).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 1.003 individuos en 2009, 110 en 2010, 280 en 2011, 464 en 2012, 1.964 en 2013 y 675 en 2014 (media 750 aves), siendo la cifra de 2013 el mayor registro histórico regional. Las oscilaciones pueden deberse a la diferente cobertura y las cifras pueden quedar subestimadas debido a que ocupa pequeños humedales que no siempre son objeto de censo; así como al esfuerzo realizado en Orellana. Las principales localidades son los embalses de Orellana (1.324 en 2013), Cubilar (550 en 2009), Villalba de los Barros (204 en 2014) y Alange (186 en 2011), gravera Atalaya (104 en 2012) y balsas de Moheda Alta (105 en 2013) y Valdelagrana (102 en 2014). Se distribuye de modo disperso por todo el territorio, aunque en los Llanos de Cáceres y en los embalses del noreste de Badajoz puede aparecer en mayor número. La tendencia es claramente decreciente en la región, pasando de 2.150 aves de media y 3.200 de máximo en 1990-1995, a 685 de media y máximo de 1.245 en el periodo 2005-2008 y 750 aves de media y 1.964 de máximo en 2009-2014.
- Época de cría. Laguna de Galisteo (CC), una pareja el 30/05/12 (S. Mayordomo). Arrocampo (CC), 7 machos y 3 hembras el 23/06/12 (S. Mayordomo). Embalse de Talaván (CC), una pareja el 29/04/12 (A. Jiménez), 3 machos y una hembra el 20 y 24/04/13 (E. Palacios y S. Mayordomo) y un macho el 27/06/13 (M. Kelsey). Lancho (CC), una pareja el 20/04/12, 8 el 11/05/12, 15 el 17/05/12, 9 el 25/05/12, 3 machos y una hembra el 01/06/12 (S. Mayordomo). Los Arenales (CC), 40 el 20/04/12, 3 parejas el 17/05/12, 2 machos y una hembra el 25/05/12, un macho el 01/06/12 (S. Mayordomo). La Atalaya (CC), 2 machos el 13/05/11, un macho el 21/05/12, 11 machos y 4 hembras el 02/06/12, 10 el 07/06/12, un macho el 16/06/13 (S. Mayordomo, E. Palacios, C.

Clemente). Torrealba (CC), un macho el 12/05/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Sierra Brava (CC), 6 el 13/05/12 (M. Kelsey). Casas de Hitos (BA-CC), un macho el 02/05/11 (Melanotos Extremadura). Villalba de los Barros (BA), una hembra con pollos el 28/06/12 (J. Elías). La Albuera (BA), 8 el 21/04/13 (J. Guerra, L. Alcántara y M. Gálvez), un macho el 17/05/13 (A. Núñez), 2 adultos con 4 pollos el 22/06/13 (A. García y A. Núñez). Una hembra con 6 pollos en el río Atarja, Medina de las Torres (BA), el 03/07/14 (F. Montaña).

- Llegadas. Un macho en Guijo de Coria (CC) el 18/07/09 (S. Mayordomo). Un joven el 02/08/10 en Charco Salado (CC) (S. Mayordomo). Uno en Gabriel y Galán (CC) el 01/08/11 (A. Pacheco). 6 en Aldea del Cano (CC) el 12/08/11 (C. Fernández). 6 en Arrocampo (CC) el 23/08/11 (J. Prieta). Una hembra en Portaje (CC) el 18/07/12 y 5 en Moheda Alta (BA) el 28/07/12 (S. Mayordomo). 2 machos en La Albuera (BA) el 06/07/13 (J. M. Mirasierra y J. C. Paniagua).

Porrón pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus regional. Muy escasa en paso e invernada (2,8 aves de media y 6 de máximo en enero 2009-2014). Tendencia al aumento, en especial a partir de 2012. Presencia todos los meses con máximos en invierno. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de un individuo en 2009, cero en 2010 y 2011, 6 en 2012, 5 en 2013 y 5 en 2014 (media 2,8 aves). Detectado en cuatro localidades. La tendencia es aparentemente creciente y la presencia se hace regular los últimos inviernos, en paralelo al aumento de registros a lo largo del año.
- Año 2009. Un macho en La Anguila, Serrejón (CC), el 16/01/09 (S. Mayordomo).
- Año 2010. Sin registros recibidos.
- Año 2011. La Atalaya (CC), un macho el 27/09/11 (M. Iglesias), 29/09/11 (S. Mayordomo), el 21/12/11 (A. Gil, J. Guerra y S. Mayordomo) y 3 el 31/12/11 (A. Rodríguez, F. Carrero y R. Parra). Un macho en La Anguila, Serrejón (CC), el 10/12/11 (S. Mayordomo).
- Año 2012. Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), una hembra el 02/12/12 (S. Mayordomo, M. García del Rey y J. Prieta). La Atalaya (CC), 4 el 12/01/12 (A. Gil), uno el 12/02/12 (J. Solana), uno el 22/02/12 (S. Mayordomo), 4 el 01/03/12 (M. Iglesias), 4 el 09/03/12 (S. Molano), un macho el 21/05/12, el 02/06/12 (S. Mayordomo), el 17/06/12 (A.

Ceballos), el 22/07/12 (Ó. Llama) y el 19/08/12 (J. Solana), 4 machos y una hembra el 16/09/12 (J. Solana), 4 el 23/09/12 (C. Fernández), 29/09/12 (J. Prieta) y 06/10/12 (L. Snell), uno el 14/10/12 (J. Solana), 6 el 25/10/12 (M. Iglesias), uno el 04/11/12 (S. Mayordomo y E. Palacios), 2 el 24/11/12 (J. Solana). Embalse de Cubilar (CC), 3 el 18/11/12 (SEO-Badajoz). Moheda Alta (BA), 2 el 14/08/12 (M. Kelsey), 4 el 26/08/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente), un macho el 28/10/12 (S. Mayordomo, M. García del Rey, J. Mahillo, E. Palacios y C. Clemente), uno el 09/11/12 (S. Mayordomo). Villalba de los Barros (BA), 2 el 17/01/12 (L. Alcántara).

- **Año 2013.** Arrocampo (CC), una pareja el 05/05/13, un macho el 11/06/13 (M. Kelsey). Los Calles, Toril (CC), una pareja el 16/10/13 (J. Prieta), 4 el 01/11/13 (E. Palacios, J. G. Aparicio), 4 el 08/11/13 (S. Mayordomo), 5 el 23/11/13 (A. Redondo, G. Rivas y L. Rivas), 10 el 09/12/13 (A. Redondo y J. G. Labrador). La Atalaya (CC), un macho el 08/01/13 (M. Iglesias), una hembra el 14/01/13 (J. Muddeman), 5 el 19/01/13 (M. Cardalliaguet), 3 el 17/02/13 (J. Solana), 4 el 21/07/13 (C. Clemente, M. García del Rey y S. Mayordomo), 3 el 23/07/13 (S. Pérez), un macho el 17/08/13 (C. Clemente y S. Mayordomo), 4 machos el 22/09/13 (C. Clemente, J. Solana y S. Mayordomo), un macho el 26/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez), 4 el 28/10/13 (A. Puente), un macho el 29/10/13 (M. Gálvez), 3 el 10/11/13 (A. Núñez y V. de Alba), 3 el 17/11/13 (J. Solana), 4 el 28/11/13 (S. Mayordomo) y 3 el 15/12/13 (J. Solana). Torrealba (CC), 2 el 06/09/13 (S. Mayordomo), 2 el 12/09/13 (C. Clemente y S. Mayordomo), 6 el 05/10/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). Corral Alto, Zorita (CC), uno el 30/11/13 (J. L. Guisado y P. Goñi). La Trebolosa, Madrigalejo (CC), 2 el 27/07/13 (M. Kelsey). Valdelagrana (BA), 2 el 06/09/13 (C. González) y un macho el 13/09/13 (Á. L. Sánchez y C. González).
- **Año 2014.** Arrocampo (CC), una pareja el 13/03/14 (M. Kelsey), 16/03/14 (S. Mayordomo, E. Palacios) y 21/03/14 (J. Briz); 2 machos y una hembra el 30/03/14 (S. Mayordomo, E. Palacios); una pareja el 21/04/14 (G. Hernández, V. López, J. J. Ramos), uno el 18/05/14 (J. Briz), un macho mancando el 17/06/14 (C. Clemente, S. Mayordomo). Los Calles, Toril (CC), 5 el 05/01/14 (J. Prieta), 3 el 12/01/14 (E. Palacios), 2 el 04/07/14 (Ó. Díaz, M. García del Rey). Charco Salado (CC), una pareja el 04/04/14 y el 05/04/14 (R. Sancho). La Atalaya (CC), uno el 01/08/14 (S. Mayordomo), el 10/08/14 y el 17/08/14 (J. Solana), 7 el 06/09/14, 5 el 07/09/14 (J. Solana), 2 el 28/09/14 (J. L. Bautista, I. Jerez), 2 el 13/10/14 (C. González), 2 parejas el 04/11/14 (S. Molano), uno el 08/11/14 (J. Solana), 6 el 17/11/14 (J. L. Bautista), un macho el 27/12/14 (J. M. Jiménez). Torrealba (CC), uno el 12/04/14, 5

el 31/05/14 (C. Clemente, S. Mayordomo). Alcollarín (CC), un macho el 30/12/14 (F. Montaña). Majadas Altas, Campo Lugar (CC), uno el 26/08/14 (M. Kelsey). La Albuera (BA), uno el 21/03/14 (A. Núñez) y el 06/04/14 (L. Alcántara y J. C. Paniagua). Moheda Alta (BA), una hembra el 30/10/14 (M. Kelsey), el 01/11/14 (M. Gálvez, J. Guerra, J. Solana) y el 06/11/14 (M. Kelsey), una pareja el 21/11/14 (F. Bernáldez, M. Gálvez y F. Macías), el 22/11/14 (F. Montaña, G. Montaña) y el 29/11/14 (C. Clemente, S. Mayordomo) y uno el 30/11/14 (N. Renwick).

- **Híbridos.** Un macho *Aythya nyroca x ferina* en Casas de Hitos el 01/02/10 (J. Corral y Ó. Llama), otro en el embalse de Ahigal (CC) el 06/02/12 (A. Pacheco) y 19/02/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y otro en el embalse de Brovales el 20/08/12 (J. Vázquez y F. Montaña).

Porrón moñado (*Aythya fuligula*)

Estatus regional. Reproducción esporádica (0-3 parejas en el embalse de Sierra Brava hasta 2007; sin información posterior). Invernante escaso (media 193, máximo 294; 2009-2014) con tendencia negativa a largo plazo (-76% en 1990-2014), algo menos pronunciada a corto plazo (-23% en 2005-2014). Fluctuaciones entre años. Monotípica.

Criterio. Época de cría, fenología y cifras importantes (>20).

- **Censos de enero 2009-2014.** Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 52 individuos en 2009, 90 en 2010, 280 en 2011, 294 en 2012, 186 en 2013 y 260 en 2014 (media 193 aves). Las oscilaciones pueden deberse a la cobertura y las cifras pueden quedar subestimadas porque ocupa pequeños humedales que no siempre son objeto de censo y por el esfuerzo realizado en Orellana. Las principales localidades, únicas en superar las 50 aves, son los embalses de Orellana (212 en 2013 y 103 en 2014), El Noque/Brozás (99 en 2012), Charco Salado (52 en 2010 y 2013) y Alange (84 en 2011) y las Charcas del Ratón (86 en 2011). La tendencia es claramente decreciente en la región, pasando de 790 aves de media y 1.085 de máximo en 1990-1995, a 250 de media y máximo de 379 en el periodo 2005-2008 y 193 aves de media y 294 de máximo en 2009-2014.
- **Época de cría.** Una pareja el 28/05/10 en la Charca de Juana Morena, Talaván (CC) (S. Mayordomo). Una pareja en Zorita (CC) el 11/05/11 (Á. Sánchez). En Sierra Brava (CC), una pareja el 08/05/12 (J. Muddeman) y un macho y 2 hembras el 13/05/12 (M. Kelsey). Una pareja en el embalse de Villalba de los Barros (BA) el 01/06/13 (A. Núñez, F. Montaña, J. M. Álvarez y J. A. Román). 2 machos y una hembra en La Albuera (BA) el 10/07/13 (S. Pérez). En La Atalaya,

Aldea del Cano (CC), 2 machos los días 13/07/13, 14/07/13 (J. Solana) y 21/07/13 (C. Clemente, M. García del Rey y S. Mayordomo).

- Cifras de interés. En Charco Salado (CC), 52 el 20/01/13 (D. Langlois, J. Briz, M. García del Rey, M. Kelsey y S. Langlois). En Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), 25 el 03/02/12 (V. Risco, J. Briz y C. Andrés). En la Charca de Brozas (CC), 46 el 15/01/12 (C. Fernández) y **99** el 05/01/13 (C. Fernández). En La Atalaya (CC), 30 el 04/03/12 (J. Solana). En Sierra Brava (CC) 35 el 05/01/10 (J. M. Tapia y M. Jiménez). En Corral Alto, Zorita (CC), 27 el 13/01/12 (J. Porras) y 29/01/12 (S. Mayordomo, P. Goñi, J. L. Guisado y C. Clemente). En Orellana (BA) 35 el 09/01/10 (J. L. Anguita) y **212** el 24/01/13 (Á. Sánchez, Á. L. Sánchez, D. Rivera). En el embalse de Horno Tejero (BA) 41 el 12/01/12 (A. Gil).
- Fenología. Una pareja en Oliva de Plasencia (CC) el 28/03/10 (S. Mayordomo). 8 machos y 2 hembras en Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), el 30/10/11 (S. Mayordomo). Una hembra en La Atalaya (CC) el 29/09/12 (J. Prieta). Una pareja en Valdepajares, Peraleda de la Mata (CC), el 09/04/13 (M. Flores). Una hembra en la gravera Viñuelas, Galisteo (CC), el 18/10/14 (S. Mayordomo). Un macho en Majadas Altas, Campo Lugar (CC), el 28/10/14 (M. Kelsey).

Porrón bastardo (*Aythya marila*)

Estatus regional. Accidental. Doce registros (19 ejemplares): 7 en Llanos de Cáceres, 3 en Vegas Altas, una en Campo Arañuelo y una en La Albuera; dos en diciembre, ocho en enero y cuatro en febrero; años 1986, 1991 (3), 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2010 y 2013 (2). Subespecie *A.m.marila*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros 2009-2014. Un macho y una hembra/joven en Sierra Brava (CC) el 08/01/10 (J. L. Anguita). Una hembra en Charco Salado, Casatejada (CC), del 12/01/13 al 03/02/13 (M. Flores, P. Gómez, C. Clemente, D. Langlois, E. Palacios, J. Briz, J. Prieta, J. Guerra, J. Portillo, M. García del Rey, M. Kelsey, M. Gálvez, M. Á. Muñoz, Ó. Díaz, R. Montero, S. Langlois, S. Mayordomo, V. Risco). Una hembra en Valdelagrana, Badajoz (BA), el 12/02/13 (Á. Sánchez y J. M. Rama).

Negrón común (*Melanitta nigra*)

Estatus regional. Accidental. Tres registros: 5 en Badajoz (1978-1979), macho en Albuquerque (abril 2012) y Sierra Brava (junio 2013). Subespecie *M.n.nigra*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Cinco en Badajoz en 1978-1979 (L. Sanabria y F. de Lope).
- Segundo y tercer registros para Extremadura. Un macho en el embalse de la Peña del Águila, Alburquerque (BA), el 08/04/12 (A. Puente, A. Melero y L. Puente). Uno en el embalse de Sierra Brava (CC) el 01/06/13 (D. Crossley y M. Kelsey).

Negrón especulado (*Melanitta fusca*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Saucedilla en enero de 2002.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Uno en Saucedilla, 12/01/02 (J. Álvarez y P. Gómez).

Serreta mediana (*Mergus serrator*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en marzo de 1997 en Brozas.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Hembra en charca de Brozas, marzo 1997 (S. Villa).

Serreta grande (*Mergus merganser*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en Plasencia y Monfragüe en enero y febrero de 2011.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primeros dos registros en Extremadura: Una hembra de 1º invierno en La Torrecilla, Plasencia (CC), del 09/01/11 al 05/02/11 (S. Mayordomo, J. Prieta, R. Montero, A. Rodrigo, C. Clemente, E. Amengual, E. Palacios, J. Gayo, J. Gómez, J. Mahillo, J. Prieta, M. Curiel, M. Alonso, M. Á. Muñoz, F. Ramírez, J. Pérez). Otra hembra de 1º invierno en el embalse de Torrejón-Tiétar, Monfragüe (CC), del 21/01/11 al 26/02/11 (J. M. Benítez,, C. Sánchez, D. Langlois, M. García del Rey, M. Kelsey, N. Moral, S. Langlois, S. Mayordomo, J. Muddeman y R. Guzmán).

Malvasía cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus regional. Accidental. Cuatro registros: dos en La Albuera (diciembre 1989, abril 1994), uno en Cornalvo (junio 2003) y Alcollarín (noviembre 2014). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Un macho en La Albuera en diciembre 1989 y otro en abril de 1994 (F. Gragera). Una hembra en Cornalvo del 4 al 8/06/03 (J.M. Benítez, M. Carvajal, I. Valverde).
- Cuarto registro para Extremadura. 2 hembras/jóvenes en el embalse de Alcollarín (CC) el 18/11/14 y sólo una del 19/11/14 al 27/11/14 (M. Kelsey, S. Daly, M. Gálvez, J. Guerra, M. Á. Muñoz, B. Small, S. Mayordomo, N. Renwik, J. Solana, V. de Alba, F. Bernáldez, F. Macías, A. Núñez, C. Clemente, F. Montaña, G. Montaña, E. Palacios, R. Montero, J. Torfs y M. Viskens).

Perdiz roja (*Alectoris rufa*)

Estatus regional. Residente abundante (420.000 ejemplares en 2004-2006, 4'5% de España) con tendencia negativa. Subespecie *A.r.hispanica*, sin descartar *A.r.intercedens* en el sur. Se producen sueltas de aves puras y de híbridos para su caza.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,2% y reducción poblacional de -36% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es “declive fuerte”, con una pérdida media anual de -10% (SEO/BirdLife, 2013b).

Codorniz común (*Coturnix coturnix*)

Estatus regional. Reprodutor estival común (¿15.600? ejemplares en 2004-2006; 1'8% de España) con tendencia decreciente. Migrador abundante. Invernada regular sin cuantificar (¿200-1.000? ejemplares) y con tendencia desconocida. Subespecie *C.c.coturnix*.

Criterio. Fechas extremas e invernada.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,4% y reducción poblacional de -6% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Invernada. Una en olivar de Mohedas de Granadilla (CC) el 16/11/10 (A. Pacheco). En Galisteo (CC), una en maizal el 22/01/12, 2 en arrozal el 23/12/12, una el 24/12/14 (J. Prieta). Una en Valdeñigos (CC) el 09/01/09 (J. Prieta). Una en Casar de Miajadas (CC) el 19/12/14 (J. Porras). 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 15/11/09 (S. Villa y S. Mayordomo). 2 en Moheda Alta (BA) el 06/12/09 (S. Mayordomo). 2

cazadas en Santa Amalia (BA) el 18/11/12 (SEO-Badajoz). Una en San Vicente de Alcántara (BA) el 07/12/14 (J. C. Salgado). En Alange (BA), una el 09/01/13 y una el 20/11/14 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en Fuente del Maestre (BA) el 30/01/13 (Á. Sánchez). 8 en Taliga (BA) el 26/01/14 (Á. T. Mejías).

- Fechas extremas. Casas de Hitos (BA-CC), presente el 28/02/09 (E. Palacios, A. Rodríguez, S. Rodríguez y V. Pérez). Primeros cantos en La Serena el 27/02/11 (R. Romero). 4 en Alange (BA) el 20/10/12 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). Una en Santa Amalia (BA) el 07/02/13 (F. Yuste). Una en Montehermoso (CC) el 11/02/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Una en Los Canchales (BA) el 13/02/13 (J. Solana). Una en Valverde de Mérida (BA) el 24/02/13 (M. Gálvez). Una en Casas de Hitos (BA-CC) el 03/10/13 (M. Kelsey). Una en Charco Salado (CC) el 13/10/13 (Ó. Llama y otros). 2 en el embalse de Cubilar (CC) el 27/10/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera y N. Baeza).

Colimbo chico (*Gavia stellata*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en Cornalvo (abril 2000) y en Alange (diciembre 2007) Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Un 1º invierno en Cornalvo el 22/04/00 (J. Matute, G. Para, M. J. Sánchez y R. Herrero). Uno en el embalse de Alange el 20/12/07 (C. Moreno y F. Montaña).

Colimbo ártico (*Gavia arctica*)

Estatus regional. Accidental en invierno. Dos registros en Llanos de Cáceres, en enero de 1995 y enero de 1998. Subespecie *G.a.arctica*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Un joven en Petit de Abajo, Arroyo de la Luz, enero 1995 (A. Acha). Uno en embalse de Valdesalor el 25/01/98 (A. Acha y M. Ruiz).

Colimbo grande (*Gavia inmer*)

Estatus regional. Accidental en invierno. Cuatro registros en los embalses de Gabriel y Galán (marzo 1991), Orellana (abril 2008), Alburquerque (enero-febrero 2009) y en Almendralejo (diciembre 2012). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Adulto en Gabriel y Galán, marzo 1991 (J. Briz). Adulto en Orellana el 15/04/08 (I. T. Escribano, J. Gómez, J. M. Abad y J. S. Gutiérrez).

- Tercer registro para Extremadura. Un joven recogido en el polígono industrial de Almendralejo (BA) el 03/12/12 y liberado al día siguiente (J. Sánchez e I. González).

Zampullín picogruoso (*Podilymbus podiceps*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Trujillo en mayo de 2010.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primer registro en Extremadura. Un ejemplar en Huertas de la Magdalena, Trujillo, el 13/05/10 (N. Milbourne, J. Barnet, J. Willmott, P. Massey y J. Porras), el 14/05/10 (P. Vantieghem) y el 15/05/10 (N. Milbourne).

Zampullín común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus regional. Residente común (1.000-3.000 individuos, 300-1.000 parejas; año 2007) con tendencia desconocida. Invernante común (1.000-2.500 ejemplares) con tendencia decreciente a largo plazo (-67% en 1990-2014) y estable a corto plazo (2005-2014). Forma concentraciones postnupciales de varios centenares. Subespecie *T.r.ruficollis*.

Criterio. Cifras destacadas (>200).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 120 individuos en 2009, 39 en 2010, 140 en 2011, 1.083 en 2012, 209 en 2013 y 434 en 2014 (media 331 aves). Al tratarse de de una especie de presencia dispersa en pequeños humedales que no siempre son objeto de censo, las cifras anteriores se consideran parciales y condicionadas el número de humedales visitados. Ninguna localidad ha superado el centenar de aves en los seis inviernos y las de mayor importancia no se repiten de un año a otro. La tendencia es aparentemente decreciente, pasando de 1.025 aves de media en 1990-1995, a 359 de media y máximo de 659 en el periodo 2005-2008 y 331 aves de media y 1.083 de máximo en 2009-2014. No obstante, sería necesario realizar en el futuro censos con similar esfuerzo para poder comparar de modo fiable.
- Cifras destacadas. Charca de Brozas (CC): 200 el 14/10/10 (G. Schreur y J. Tarrío) y 395 el 17/08/11 (C. Fernández). La Albuera (BA), 322 el 20/08/13 (F. Montaña y J. Vázquez). Torrealba (CC), 200 el 01/08/14 (S. Mayordomo). Embalse de Alcollarín (CC): 290 el 22/08/14 (S. Mayordomo) y 220 el 31/08/14 (M. Kelsey).

Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus regional. Residente común (1.500-3.000 individuos, 500 parejas; año 2007) con tendencia desconocida. Invernante común (2.000-3.000 ejemplares) con tendencia positiva tanto a largo plazo (+85% en 1990-2014) como a corto plazo (+67% en 2005-2014). Tras la cría puede concentrarse en grandes embalses (hasta 1.000). Subespecie *P.c. cristatus*.

Criterio. Cifras destacadas (>100).

- **Censos de enero 2009-2014.** Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 542 individuos en 2009, 398 en 2010, 440 en 2011, 2.356 en 2012, 2.009 en 2013 y 1.260 en 2014 (media 1.167 aves). La cifra de 2013 es el máximo regional. Las oscilaciones pueden deberse a la diferente cobertura. Las principales localidades son los embalses de Alange (655 en 2012), La Serena (504 en 2012) y García de Sola (376 en 2013); en todos los casos superando el máximo previo conocido (332 en Orellana en 2005-2008). La tendencia es aparentemente decreciente, pasando de 630 aves de media en 1990-1995, a 700 de media y máximo de 1.290 en el periodo 2005-2008 y 1.170 aves de media y 2.350 de máximo en 2009-2014. No obstante, sería necesario realizar en el futuro censos con similar esfuerzo para poder comparar de modo fiable.
- **Cifras destacadas.** Gabriel y Galán (CC), 300 el 16/09/11 (A. Pacheco). Valdecañas (CC), 250 el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y C. Clemente) y 350 el 22/09/12 (S. Mayordomo). Sierra Brava (CC), 200 el 24/01/09 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo), 300 el 28/07/12, 700 el 26/08/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente) y 465 el 27/07/13 (M. Kelsey). Los Canchales (BA), 124 el 24/09/11 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta, S. Mayordomo) y 150 el 9/10/11 (A. Cangas, A. Garrote, E. del Viejo). Embalse de Alange (BA), 200 el 06/12/11 (A. Núñez, J. Solana y V. de Alba), 665 el 15/01/12 (L. Alcántara y J. Solana), 200 el 12/07/12 (J. M. Castaño, J. M. Rama), 630 el 05/08/12 (L. Alcántara) y 500 el 14/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Embalse de La Serena (BA), 504 el 18/01/12 (X. Piñeiro). Embalse de Valuengo (BA), 117 el 14/09/11 (A. Núñez). Villalba de los Barros (BA), 123 el 01/09/12 (J. A. Román), 411 el 07/09/12 (F. Montañó) y 296 el 14/09/12 (J. A. Román).
- **Otros.** Uno albino en Esparragalejo (BA) el 22/08/11 (Á. Sánchez).

Zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus regional. Reprodutor sin confirmar en Orellana y Alcollarín, en todo caso muy escaso (0-2 parejas). Invernante escaso (<100 ejemplares) con

tendencia creciente a largo plazo y decreciente a corto plazo (-56% en 2005-2014). Subespecie *P.n.nigricollis*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 12 individuos en 2009, 2 en 2010, 15 en 2011, 68 en 2012, 54 en 2013 y 72 en 2014 (media 37 aves). Las oscilaciones se deben a la diferente cobertura de los censos, con cifras subestimadas en los años 2009 a 2011. La principal localidad y única en superar las 10 aves es el embalse de Orellana (11 en 2009, 51 en 2012, 36 en 2013, 59 en 2014). La cifra obtenida en este humedal condiciona el total regional, como ya ocurría en el periodo 2005-2008. Sierra Brava y los humedales de Llanos de Brozas-Cáceres que fueron importantes antes de 2005, no se han recuperado. La tendencia ha pasado de positiva (en 1990-1995 era un invernante muy raro) a decreciente, en 2005-2008 la media fue de 84 aves (más del doble que la actual) y el máximo de 109.
- Reproducción. De modo impreciso se dice que ha criado en un ancón del embalse de Orellana en 2013, pero sin dar fechas, detalles o autores (Á. Sánchez). Indicios de nidificación en el embalse de Alcollarín (CC) en 2014, pero sin confirmar que tenga éxito: 3 parejas en cortejo el 19/05/14 (J. Muddeman) y 2 parejas y un posible nido el 25/05/14 (C. Clemente).
- Año 2009. Sin registros recibidos.
- Año 2010. Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), un joven el 23/08/10 (E. Palacios y S. Mayordomo). Charca de Brozas (CC), 2 el 28/11/10 y 3 el 29/12/10 (S. Mayordomo). Sierra Brava (CC), uno el 20/07/10 (M. Kelsey), 2 adultos el 05/09/10 (E. Palacios, S. Fletcher y S. Mayordomo). Moheda Alta (BA), uno con plumaje estival el 13/03/10 (M. Kelsey).
- Año 2011. Portaje (CC), uno el 05/11/11 (E. Palacios, S. Mayordomo). Galisteo (CC), uno en la laguna del 18 al 26/11/11 (J. Prieta, S. Mayordomo) y otro en Valdefuentes el 18/11/11 (C. Mills). Ventaquemada, Guijo de Granadilla (CC), uno del 21/09/11 al 30/11/11 (J. Prieta, S. Mayordomo). Valdecañas (CC), 2 el 23/08/11 (J. Prieta). Cubilar (CC), uno el 27/11/11 (J. C. López, J. L. Bautista, P. Herrador, S. Mayordomo). Esparragalejo (BA), uno el 22/08/11 y del 12 al 30/10/11 (A. Cangas, E. del Viejo, J. C. Paniagua, J. P. Prieto, S. Mayordomo). Alange (BA), 2 el 06/09/11 (Á. Sánchez).
- Año 2012. Embalse de Ahigal (CC), uno el 24/02/12 (J. C. Paniagua). Brozas (CC), 2 el 15/01/12 (C. Fernández) y 4 el 01/12/12 (G. Schreur). Sierra Brava (CC), 5 el 10/01/12, uno el 23/02/12 (M. Kelsey). Moheda Alta (BA), uno el 24/01/12 (M. Kelsey), el 25/11/12 (J. Solana) y el 01/12/12 (J. C. López). Orellana (BA), 51 el 11/01/12, 45 el 05/03/12, 20

- el 04/10/12 y 30 el 17/10/12 (Á. L. Sánchez). Embalse de La Serena (BA), 9 el 18/01/12 (X. Piñeiro). El Paredón, Campanario (BA), uno el 23/11/12 (W. Haworth, J. P. Prieto). Esparragalejo (BA), un juvenil el 23/09/12 (S. Mayordomo, E. Palacios, C. Clemente). Villalba de los Barros (BA), uno el 10/11/12 (V. de Alba, F. Montaña, A. Núñez).
- Año 2013. Arrocampo (CC), uno el 20/01/13 (D. Langlois, J. Briz, M. García del Rey, S. Langlois). Los Calles, Toril (CC), uno el 20/09/13 (J. Prieta). Salto del Gitano, Monfragüe (CC), uno el 18/08/13 (Á. Sánchez). Brozas (CC), 10 el 18/01/13 (F. Bernáldez). Torrealba (CC), uno el 06 y 12/09/13 (C. Clemente, S. Mayordomo). Sierra Brava (CC), 3 el 07, 08 y 10/09/13 (J. Guerra, M. Gálvez, M. Kelsey), 2 el 10, 13 y 22/11/13 (A. Calvo, M. Kelsey) y el 15/12/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). Moheda Alta (BA), uno el 30/11/13 (M. Kelsey, S. Mayordomo). Orellana (BA), 27 el 29/01/13 (J. A. Barquero), 36 el 07/02/13 (J. Muddeman), 21 el 17/02/13 (C. Clemente, E. Palacios, L. Alcántara, M. García del Rey, S. Mayordomo), uno el 01/03/13 (J. A. Barquero). La Albuera (BA), uno el 30/03/13 (A. Núñez, E. del Viejo, F. Yuste, V. de Alba). Valdelagrana (BA), uno el 06 y 13/09/13 (C. González). Esparragalejo (BA), un joven el 15/10/13 (F. Crystal). Villalba de los Barros (BA), uno el 02/02/13 (A. Núñez, F. Montaña, I. Sánchez, J. Solana, V. de Alba), 3 el 09 y 19/04/13 (J. Guerra, M. Gálvez, F. Bernáldez).
 - Año 2014. Brozas (CC), uno el 27/01/14 (C. Clemente, S. Mayordomo). Torrealba (CC), uno el 06/04/14 y 2 el 12/04/14 (C. Clemente, S. Mayordomo). Alcollarín (CC), 6 el 18 y 26/04/14 (F. Yuste, C. Clemente), 8 el 27/04/14 (S. Mayordomo, E. Palacios), 11 el 19 y 25/05/14 (J. Muddeman, C. Clemente), 8 el 11/06/14 (M. Kelsey), 25 el 14/06/14 (S. Mayordomo, E. Palacios), 13 el 31/08/14 (M. Kelsey), uno el 13 y 29/09/14 (M. Kelsey), uno el 28/10/14 (M. Kelsey) y 8 el 15/12/14 (M. Gálvez, J. Guerra). Sierra Brava (CC), uno el 05 y 09/01/14 (S. Mayordomo, M. Kelsey), 3 el 11/01/14 (SEO-Extremadura), uno el 16/02/14 (M. Kelsey, P. Kelsey). Moheda Alta (BA), 3 el 26/03/14 (M. Kelsey). Orellana (BA), 60 el 28/01/14 (M. Gálvez, J. Guerra), 40 el 09/02/14 (S. Mayordomo, E. Palacios), 30 el 16/02/14 (M. Kelsey y P. Kelsey), 18 el 23/02/14 (F. Montaña y G. Montaña). Embalse de la Serena (BA), 5 el 29/01/14 (M. Gálvez, J. Guerra). La Albuera (BA), 2 el 20/02/14 (J. Muddeman, J. P. Prieto, G. Schreur), uno el 22/02/14 (M. Gálvez, J. Guerra), uno el 03/03/14 y 08/04/14 (M. Kelsey), 2 el 05/07/14 (F. Montaña). Gravera del Soto (BA), uno el 13/03/14 (M. Gálvez, J. Guerra). Brovales (BA), 3 el 23/09/14 (F. Montaña). Villalba de los Barros (BA), 4 el 05/04/14 (J. M. Álvarez). Atarja, Medina de las Torres (BA), uno el 05 y 09/04/14 (F. Montaña). Termosolar La Garrovilla (BA), uno el 15/09/14 (C. González).

Paño europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus regional. Accidental. Un registro: dos aves en noviembre de 1997 en Fregenal de la Sierra. Subespecie probable *H.p.pelagicus* (Atlántico).

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro previo. Dos muertas tras temporal en Fregenal de la Sierra el 06/11/97 (J.C. Delgado).

Paño boreal (*Oceanodroma leucorhoa*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Miajadas en enero de 2013.

Criterio. Todas las observaciones.

- Primer registro para Extremadura. Encontrado un ejemplar muerto en Miajadas (CC) el 21/01/13 tras un temporal (V. M. Quintana).

Paño de Madeira (*Oceanodroma castro*)

Estatus regional Accidental. Dos registros: febrero 1970 en Badajoz y febrero 1995 en Benquerencia de la Serena. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos. Un 1º año en Badajoz ciudad en febrero de 1970 tras un temporal (Gómez-Tejedor). Uno anillado en islas Berlengas (Portugal) muerto el 24/02/95 en Benquerencia de la Serena (Oficina Anillamiento).

Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus regional. Reproductor común (>850 nidos en 2015) con tendencia muy positiva (+550%, 2003-2015). Invernante común (8.500 ejemplares, enero de 2013, 11% de España) con tendencia decreciente (-22% en 2003-2013), especialmente en Cáceres (-40% en 2003-2013; por -4% de Badajoz). Subespecies *Ph.c.carbo* y *sinensis*.

Criterio. Reproducción, cifras destacadas (más de 150) y fechas extremas.

- Población reproductora. >850 nidos en 2015; 651 en 2012 y 132 en 2007. En el año 2012 tuvo lugar un nuevo censo nacional en España con un resultado de 21 colonias y 1.605 parejas (SEO/BirdLife). Cifras que duplican las 11 colonias y triplican las 532 parejas censadas en 2007 (Molina, 2012). En 2007, sólo se conocía una colonia en el embalse de La Serena con 102 nidos (otras dos colonias indicadas en el censo de 2007 se

consideran errores: embalse de Valuengo y río Guadiana en Valdetorres). En Extremadura se controlaron tres colonias con 651 nidos en 2012 en embalses de Badajoz: La Serena (272 nidos en 2011, 619 nidos en 2012, 575 en 2013, >600 en 2015; X. Piñeiro y M. J. Valencia), Alange (23 nidos en 2012 y 88 en 2013; L. Alcántara) y Alqueva (9 nidos en 2012 y 59 en 2015; J. Hernández y E. Costillo). En 2014 se forma una nueva colonia en el embalse de Villalba de los Barros, Badajoz (58 nidos en 2014 y 120 en 2015; J. M. Álvarez Leal) y en 2015 se localiza la primera colonia de la provincia de Cáceres (25 nidos en el embalse de Guijo de Granadilla; J. Prieta).

- Censo de enero 2013. En Extremadura se censaron 8.500 aves (11% de España) en 72 dormideros, destacando el río Guadiana y su entorno y por detrás las cuencas de Alagón, Tiétar-Tajo y Salor en Cáceres y Ardila, Zújar y Matachel en Badajoz. En Badajoz se censaron 42 dormideros y 5.736 aves, destacando el embalse de Valuengo (1.032 aves), la presa de Orellana (832) y Alange (456). En Cáceres se censaron 30 dormideros y 2.762 aves, destacando el embalse de Casa Zafra (490 individuos), presa de Torrejón (325) y Arrocampo (328). La cobertura fue deficiente en el suroeste de Cáceres (sólo 20 aves) y en la comarca de Trujillo (55 aves). Los embalses agruparon el 56% de aves y las riberas fluviales el 43%. El sustrato más empleado fueron árboles de 5 metros o más (82%), con uso preferente de eucaliptos en Badajoz y chopos en Cáceres. Desde 1990, Extremadura ha perdido importancia relativa en el contexto español, pasando de ser la primera región a la cuarta. La tendencia en relación a 2003 es negativa a nivel regional (-22%), sobre todo en Cáceres (-40%), pues Badajoz se mantiene estable (-4%).
- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta especie, no obstante, las cifras obtenidas por la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife entre 2009 y 2014 ofrecen valores entre 1.400 y 6.200 individuos con una amplísima distribución, por ejemplo, en 2012 fue censado en 106 humedales.
- Concentraciones. El Borbollón (CC), 400 el 31/01/09 (C. Clemente, J. Mahillo). Portilla del Tiétar, Monfragüe (CC), 433 el 13/02/12 (J. M. Diu). Embalse del Salor (CC), 540 el 27/12/10 (S. Mayordomo). Cubilar (CC), 1.500 el 15/01/11 (J. M. Traverso). Mérida (BA), 450 el 25/12/10, 1.000 el 03 y 25/11/12 (Á. Sánchez). Guadiana, La Zarza (BA), 500 el 28/10/14 (M. Gálvez). Guadiana, Medellín (BA), 500 el 23/01/14 (F. Yuste). Guadiana, Badajoz, más de 1.000 el 11/11/11, el 06/12/11, el 01/11/12 (J. C. Paniagua). Alange (BA), 827 el 20/10/13 (J. Guerra). Valuengo (BA), 483 el 28/08/13 y 569 el 18/09/13 (J. A. Román).
- Otros registros. Uno leucístico en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 29/10/12, que sigue varias semanas más (J. Prieta).

Pelicano común (*Pelecanus onocrotalus*)

Estatus regional. Origen dudoso. Presencia de aves anilladas procedentes de cautividad y no se descartan llegadas naturales. Entre noviembre de 2006 y mayo de 2008, 7-11 aves en 7 localidades y otra cita en octubre de 2011.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos. Uno en Mérida el 26/11/06 (M. J. Salguero). Uno en San Vicente de Alcántara el 22/01/07 (J. Gordillo). Uno en Portaje del 21/02/07 al 30/04/07 (J. Corral, S. Mayordomo, M. A. Muñoz, C. Clemente, J. Mahillo). Uno en Lancho, Arroyo de la Luz, el 22/09/07 y 21/10/07 (F. Carrero). Uno en Galisteo el 7/10/07 (R. Montero, S. Mayordomo). Vertedero de Cáceres: uno el 19/10/07 y el 23/10/07 y dos el 2/11/07 y el 10/01/08 (F. Carrero). Uno en Alqueva el 8/01/08 y el 13/05/08 (J. G. Navedo y otros).
- Nuevos registros. Uno en vuelo cerca de Don Benito (BA) el 21/10/11 (A. Fernández).

Avetoro común (*Botaurus stellaris*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso (0-2 parejas, primer caso en 2007). Invernante muy escaso y localizado (¿10-25? ejemplares). En 2009-2014 todas las citas en Arrocampo y Galisteo, excepto una Santa Amalia en 2011. Tendencia desconocida, quizás en aumento. Subespecie *B.s.stellaris*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta especie, no obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) nunca fue observado y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 3 en 2012, 2 en 2013 y uno en 2014 en el embalse de Arrocampo y graveras de Galisteo.
- Segunda caso de reproducción. El 07/07/12 se observan 2 jóvenes y un adulto (S. Mayordomo). En Casazafra (CC), donde crió en 2007 y 2008, el hábitat se ha degradado por la sobreexplotación ganadera y deja de tener condiciones para la presencia de avetoro (SEO-Cáceres).
- Embalse de Arrocampo. Presencia invernal regular de 1-3 ejemplares, citas estivales en 2012. 2009. Uno el 02/01/2009 (M. Kelsey). 2010. Uno el 18/03/10 (J. Briz y V. Risco). 2011. Uno el 08/01/11 (S. Mayordomo), uno el 27/02/11 (G. Schreur y M. Kelsey), uno el 16/11/11 (E. Palacios, I. Gallardo, M. García del Rey, M. Á. Muñoz, S. Mayordomo), dos el 05/12/11 (M. García del Rey, S. Mayordomo). 2012. Uno el 10, 21 y 28/01/12 (S. Mayordomo, J. Julián, L. Sitges), 2 el 28/01/12 (U. Fuente), uno el 16, 24 y 25/02/12 (L. Rivas, A. Redondo, (S. Mayordomo, S. Fletcher), 05, 08 y 14/03/12 (S. Langlois, M. García del Rey, I. Gallardo,

- D. Langlois, S. Mayordomo, M. Gómez, J. Prieta), 12 y 22/04/12 (A. Redondo, S. Mayordomo, E. Palacios), 17 y 28/05/12 (M. García del Rey, E. F. Larreta, E. Pérez-Balsalobre), 3 el 07/07/12 (S. Mayordomo), uno el 02/09/12 (M. Carregal, G. Fernández), 11/10/12 (R. Vicente), 10/11/12 (M. Kelsey) y 02/12/12 (J. G. Labrador) y 3 el 23/12/12 (J. Ceballos, A. Ceballos). 2013. Uno el 02, 14, 26 y 29/01/13 (Á. Rabanal, J. Muddeman, E. Pérez-Balsalobre, J. Briz, M. García del Rey, R. Montero), 03 y 04/02/13 (P. García, R. Vicente, L. Sitges), 09, 16, 20 y 28/03/13 (E. Palacios, S. Mayordomo, L. Martínez, J. Prieta, M. Á. Muñoz, F. Ramírez), 14/04/13 (C. Clemente, J. Mahillo, J. C. López) y 09/10/13 (S. Mayordomo). 2014. Uno el 17, 18 y 19/01/14 (J. G. Aparicio, J. Briz, J. Guerra), 17/05/14 (D. Langlois, S. Langlois), 26/11/14 (J. Porras), 2 el 02/12/14 (J. L. Bautista, S. Mayordomo) y uno el 06 y 17/12/14 (V. de Alba, F. Montaña, A. Núñez, F. Bernáldez, M. Gálvez).
- Galisteo (CC). Presencia invernal regular de 1-2 ejemplares. 2012. Gravera Valdefuentes, uno los días 08/01/12 (S. Mayordomo); 18, 19, 25, 26 y 28/02/12 (M. Coca, J. M. Colorado, Á. G. Mendoza, S. Mayordomo, J. C. Paniagua, V. Risco, J. Mahillo, J. Briz, C. Clemente), 04, 05 y 13/03/12 (H. Sánchez, S. Mayordomo); y 2 los días 21 (J. Prieta) y 29/02/12 (S. Mayordomo, J. Mahillo, C. Clemente, C. Villaverde). Uno en arrozal el 23/12/12 (J. Prieta). 2013. En Valdefuentes, Galisteo (CC), uno el 26 (C. Clemente y J. Mahillo) y 28/01/13 (S. Mayordomo). 2014. En Galisteo (CC), uno en el arrozal el 24/06/14 (M. Viskens) y uno en la gravera de Viñuelas el 05 y 17/12/14 (S. Mayordomo).
 - Otros registros. Uno en Santa Amalia el 01/11/11 (F. Yuste, J. P. Prieto).

Avetorillo común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus regional. Reproductor común (300-500 parejas, el 10% de España) con tendencia estable. Invernante escaso (>50 ejemplares) con tendencia al aumento. Subespecie *I.m.minutus*.

Criterio. Observaciones en época de cría (excepto Arrocampo y Guadiana), invernada y fenología.

- Población invernante, enero 2011. 16 ejemplares en Extremadura, siendo la región con mayor número de contactos y el 31% de la población nacional. Las citas fueron 9 aves en el Azud de Badajoz, 6 en el Puente Viejo de Mérida y uno en el embalse de Arrocampo; las dos primeras localidades fueron las más importantes de España (Garrido *et al.*, 2012).
- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos, no obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) nunca fue observado y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 5 en 2012, 10 en 2013 y 18 en 2014 en 3-10 localidades cada año (río Guadiana,

embalse de Arrocampo y graveras de toda la región).

- Invernada. Valdefuentes, Galisteo (CC), uno el 02/12/10, 2 el 22/01/12 y una hembra el 28/01/13 (S. Mayordomo). Arrocampo (CC), invernante regular con máximos en 2009-2014 de 3 el 07/12/12 y 4 el 13/01/13 (J. Muddeman, M. García del Rey, S. Mayordomo y otros). Guadiana, Badajoz (BA), invernante regular con máximos en 2009-2014 de 6 el 16/01/11, 10 el 25/01/11, 6 el 10/12/11 y 7 el 20/02/12 (J. C. Paniagua). Guadiana, Mérida (BA), invernante regular con máximo 6 el 19/12/11 (Á. Sánchez). Otras localidades. Graveras de La Granja (CC), uno el 19/12/11 (R. Montero). Guadiana, uno en Valverde de Mérida (BA) el 29/01/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Palazuelo (BA), una hembra el 28/01/11 (M. Kelsey). El Torviscal (BA), uno el 05/11/11 (J. P. Prieto). Unión ríos Gévora-Zapatón (BA), 3 el 26/02/12 (G. Schreur). Charca Jerez de los Caballeros (BA), uno el 26/02/12 (F. Montaña).

Martinete común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (172 parejas y 6 colonias en 2011; 3% de España) con tendencia al aumento. Invernante muy escaso (52-75 ejemplares en 2011-2014; 2% de España) con tendencia creciente. Subespecie *N.n.nycticorax*.

Criterio. Censo de colonias, citas de invernada y fenología.

- Población reproductora, año 2011. Se censaron 172 parejas en 6 localidades (el 3% de las 5.354 parejas de España), que por orden de importancia fueron: río Guadiana en Badajoz capital (83 parejas en dos subcolonias de 80 y 3 parejas), embalse de Montijo en Mérida (37 parejas en dos subcolonias de 32 y 5 parejas), embalse de Arrocampo (21 parejas), embalse de Alqueva-Arroyo de la Higuera (21 parejas en dos subcolonias de 11 y 10 parejas), Cornalvo (8 parejas) y embalse de Portaje (2 parejas). Tendencia al aumento, pasando de 15-132 parejas entre 1994-2000 a 111-145 en 2002 y 172 en 2014 (Garrido *et al.*, 2012). Es posible que haya más colonias y nidos aislados no conocidos; en concreto, en el río Tíetar hay al menos dos tramos con presencia constante en primavera-verano donde no se han hecho prospecciones de ningún tipo.
- Población invernante, enero 2011. Se registraron 52 ejemplares en Extremadura, el 1,8% de las 2.828 aves censadas en España. Las localidades con presencia fueron el tramo urbano del Guadiana en Badajoz (41 aves en 3 dormitorios), el embalse de Montijo en Mérida (10 aves) y el río Guadiana en Talavera la Real (un ejemplar) (Garrido *et al.*, 2012).

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos, no obstante, las cifras obtenidas en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) nunca fue observado y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 16 en 2012, 35 en 2013 y 75 en 2014 en 2-3 localidades cada año. Casi toda la población invernante se concentra en los tramos urbanos del río Guadiana en Badajoz (máximo 54 aves en 2014) y Mérida (máximo 21 en 2014), con citas aisladas en otros humedales.
- Invernada. Río Jerte, Plasencia (CC), uno el 17/01/09 (J. Prieta) y uno del 21/01/13 al 25/02/13 (R. Montero, J. Prieta, S. Mayordomo). Arrocampo (CC), un juvenil el 08/02/12 (S. Mayordomo, J. Prieta) y 2 el 24/11/14 (S. Mayordomo) y el 07/12/14 (J. Briz). Guadiana, Badajoz (BA), invernante regular con cifras destacadas en 2009-2014 de 10 el 25/01/11, 18 el 6/02/11, 15 el 10/12/11 y 21 el 14/01/14 (J. C. Paniagua). Guadiana, Mérida (BA), invernante regular con cifras destacadas en 2009-2014 de 20 el 23/01/11, 24 el 10/10/11, 15 el 21/01/12 (J. Solana); y 16 el 21/11/12 (Á. Sánchez). Otras localidades: Talavera la Real (BA), 4 el 24/01/11 (A. Cangas, E. del Viejo, G. Schreur, P. Schreur). Embalse de Alange (BA), uno el 14/01/12 (L. Alcántara, J. Solana). Río Rucas (BA), 15 en vuelo el 13/01/13 (J. Muddeman).
- Fenología. Arrocampo: uno el 05/04/09 (R. Montero), 6 adultos el 04/04/12 (S. Mayordomo, J. L. Guisado), un adulto el 20/03/13 (J. Prieta) y 2 adultos el 23/03/14 (S. Mayordomo y E. Palacios).
- Otros registros. Cría probable en el embalse de Portaje: del 09/07/10 al 23/07/10 se ven dos juveniles, dos adultos y un 2º año (E. Palacios, S. Mayordomo) y 2 adultos el 12/07/13 y un joven y un adulto en agosto de 2011 (S. Mayordomo).

Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (11 parejas y 5 colonias en 2011; 0,5% de España) con tendencia al aumento. Invernante muy escaso (15-25 ejemplares en 2009-2014; 10% de España) con tendencia creciente. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones (en Arrocampo sólo nidificación e invernada).

- Población reproductora, año 2011. Se censaron 11 parejas en 5 localidades (el 0,5% de las 2.076 parejas de España), que por orden de importancia fueron: Arrocampo (4 parejas), embalse de Alqueva-Arroyo de la Higuera (3 parejas), embalse de Montijo (2 parejas), Azud del Guadiana en Badajoz (1 pareja) y embalse de Orellana (1 pareja con 2 pollos) (Garrido *et al.*, 2012). En 2012 se constata la reproducción en el

Azud del Guadiana, Badajoz, al observarse juveniles el 21/07/12 (J. C. Paniagua) y el 05/08/12 (P. Herrador y J. L. Bautista); en junio de 2014 se observan 3 nidos activos (A. Fernández y J. C. Paniagua).

- Población invernante, enero 2011. En enero de 2011 tan solo se registraron 3 ejemplares en Extremadura, el 10% de las 31 aves censadas en España, todas en el embalse de Arrocampo. Este censo se considera claramente infravalorado (Garrido *et al.*, 2012).
- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos, no obstante, las cifras obtenidas en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) nunca fue observado y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 4 en 2012, 8 en 2013 y 9 en 2014 en 3-5 localidades cada año. Las únicas localidades con citas anuales son el embalse de Arrocampo y el Azud de Badajoz, con registros puntuales en otras zonas. Se considera que estas cifras infravaloran la población invernante real y que está presente de modo regular en arrozales y humedales asociados del Guadiana y del Alagón y quizás en algunos embalses, como el de Brovales. En una revisión de los datos existente se considera la invernada reciente en cinco localidades: río Guadiana-Badajoz (4-10 aves), arrozales de Vegas Altas (2-10), Arrocampo (1-5), Galisteo-El Batán-Valdeobispo (1-2) y embalse de Brovales (0-1), para un total estimado en la región de 15-25 ejemplares.
- Año 2009. Arrocampo (CC), una en enero (A. Howes), 3 nidos el 17 y 20/06/09 (J. PrietaS. Mayordomo). Laguna de Valdeobispo (CC), una el 09/12/09 (J. Prieta, S. Mayordomo).
- Año 2010. Embalse de Montijo (BA), un nido el 27/04/10 (J. Prieta). laguna de Valdeobispo (CC), una el 11/07/10 (E. Palacios, S. Mayordomo). Palazuelo (BA), una el 14/11/10 (M. Kelsey).
- Año 2011. El Batán (CC), presente del 29/09/11 al 22/10/11 con máximo de 6 del 08 al 15/10/11 (J. Prieta), y una del 18/11/11 al 30/12/11 (J. Prieta, S. Mayordomo). Arrocampo (CC), al menos dos invernantes y 4 parejas reproductoras (J. Prieta, S. Mayordomo). Guadiana, Badajoz (BA), presencia todo el año con máximo de 8 el 10/12/11 (J. C. Paniagua). Santa Amalia (BA), una el 21/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez), 30/09/11 (F. Yuste), un joven el 06/10/11 (Á. Sánchez), una el 06/11/11 (F. Yuste) y 2 el 12/11/11 (Á. Yuste, F. Yuste). Arrozales de Vegas Altas (BA/CC), una el 22/01/11 (SEO-Cáceres), una el 4/02/11 (S. Fletcher), 2 el 03/03/11 (M. Kelsey), una el 29/10/11 (J. P. Prieto), una el 13/11/11 (E. Palacios y otros), 2 el 29/11/11 (M. Kelsey) y una el 03/12/11 (Ó. Llama y R. Vicente). Otras localidades, laguna de Galisteo (CC), una el 29/08/11 (J. Prieta) y el 05/09/11 (S. Mayordomo). Canal de Casas de Belvís (CC), una el 15/10/11 (J. Briz). Charca de Montijo (BA), 8 el

- 30/07/11 (Á. Sánchez). Esparragalejo (BA), una el 08/08/11 y el 11/09/11 (E. Palacios, J. C. Paniagua, S. Mayordomo). Villanueva de la Serena (BA), una el 12/06/11 (Á. Sánchez). Entorno de Los Canchales (BA), 7 adultos y 8 jóvenes el 21/07/11 (Á. Sánchez). La Haba (BA), un joven el 30/07/11 (J. L. Pérez Chiscano y J. P. Prieto).
- Año 2012. Arrocampo (CC), presencia todo el año; en invernada: 2 el 10/01/12, 4 el 08/02/12 y 3 el 11/11/12 (S. Mayordomo, V. Risco, J. Briz, J. Prieta). Arrozales Vegas Altas: una en Logrosán (CC) el 18/01/12 (M. Gómez), en Palazuelo (BA) el 23/05/12 (J. P. Prieto) y Santa Amalia (BA) el 17/03/12 (F. Yuste). Guadiana, Badajoz (BA), presencia todo el año, en 2012 cría por primera vez, destacan 4 nupciales en junio 2012, 19 el 09/09/12 y 8 el 13/11/12 (J. C. Salgado, J. C. Paniagua, A. Fernández). Embalse de Montijo (BA), vuelve a nidificar, no se observa en invierno. Una en la charca de Esparragalejo (BA) el 06/07/12 (E. del Viejo y A. Cangas). Otras localidades: arrozal de El Batán (CC), una el 01/11/12 (S. Mayordomo); embalse de Brovales (BA), una el 14/01/12 y el 17/08/12 (F. Montaña y A. Núñez).
 - Año 2013. El Batán (CC), una el 20/01/13 (J. Prieta), 2 el 06/06/13 (E. Palacios y J. Mahillo), 2 el 03/11/13 (S. Mayordomo) y una el 19/11/13 (C. Clemente). Arrocampo (CC): presencia todo el año, al menos 2 invernantes y máximo de 2 aves en primavera, con sólo un nido confirmado el 12/06/13 (J. Prieta). Guadiana, Badajoz (BA): presencia todo el año, al menos 2 invernantes y máximo de 7 el 29/08/13 (J. C. Paniagua). Esparragalejo (BA), una los días 27/04/13, 12/05/13, 15/06/13, 21/07/13 y 30/07/13 (A. Cangas, E. del Viejo, P. Herrador y otros); 3 del 01/08/13 al 25/08/13 (F. Bernáldez, F. Macías, J. G. Aparicio y otros). Embalse de Montijo (BA), ausente en invierno, máximo de 7 el 26/05/13 (F. Díez y S. Pérez) y en el entorno 6 en la charca de la Albuera, Mérida, el 25/07/13; 8 en la charca de la Valluncosa y 4 en el río Aljucén (Á. L. Sánchez, Á. Sánchez). Otras localidades. Vegas Altas, una en Santa Amalia (BA) el 24/01/13 (S. Fletcher) y una en Palazuelo (BA) el 24/11/13 (M. Á. Muñoz). Embalse de Villaba de los Barros (BA), una el 17/04/13 (B. Iglesias, M. Gálvez). laguna de Galisteo (CC), una el 09/07/13 (S. Mayordomo) y el 31/10/13 (J. Prieta). Embalse de Brovales (BA), una el 06/08/13, el 17/12/13 y el 23/12/13 (F. Montaña). Los Canchales (BA), 3 el 10/08/13 (C. González). Río Matachel, Alange (BA), una el 06/09/13 (J. Guerra). Quebrada de las Palomeras, Navalmodal de la Mata (CC), una el 22/12/13 (J. Briz y V. Risco).
 - Año 2014. Galisteo (CC), una en la gravera Viñuelas el 10/08/14 (S. Mayordomo) y una en la laguna el 26/10/14 (J. L. Bautista y R. Montero). Arrocampo (CC), una en enero, al menos dos nidos el 15/05/14 y una en noviembre (SEO-Cáceres). Guadiana, Badajoz (BA), 1-4 invernantes, la

colonia cambia de ubicación con máximo de 12 aves y 3 nidos el 19/05/14 y 4 parejas el 04/06/14 (J. C. Paniagua, A. Fernández, J. Mazón). Arrozales Vegas Altas. En Rena (BA) una el 21/01/14 (L. Lozano); en Moheda Alta (BA) 2 el 01/04/14; en Palazuelo (BA) una el 11/06/14, 2 el 26/06/14 y una el 20/07/14 y 26/11/14; en Casas de Hitos (BA-CC) una el 08/08/14 (M. Kelsey) y en Vegas Altas (BA) 2 el 24/10/14 (Á. Sánchez). Embalse de Montijo (BA), al menos un nido en 2014 (C. González). Otras localidades. Gravera en Coria (CC), una el 18/05/14 (J. Prieta). Balsas de Sierra de Fuentes (CC), una el 26/01/14 y gran parte del invierno (E. Herguido). Guadiana del Caudillo (BA), una el 10/06/14 (J. L. Bautista). La Albuera (BA), 2 el 08/04/14 (M. Kelsey). Los Barruecos (CC), una el 10/06/14 (J. Gutiérrez). Embalse de Proserpina (BA), una el 23/08/14 (J. G. Aparicio). Gravera del Soto (BA), una el 11/09/14 (J. Guerra). Embalse de Brovales (BA), 2 el 25/03/14 y una el 15/12/14 (F. Montaña y J. Vázquez). Charca de La Haba (BA), 2 el 07/06/14 (J. P. Prieto). Embalse de Alcollarín (CC), 2 el 20/07/14 (M. Kelsey).

Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus regional. Residente común (8.320 parejas en 2011; el 21% de España) con tendencia decreciente, especialmente en la cuenca del Tajo. Invernante común (31.000 individuos en 2011; el 17% de España) con tendencia negativa. Subespecie *B.i.ibis*.

Criterio. Censos en colonias y dormideros invernales, concentraciones (>500 aves).

- Población reproductora, año 2011. Se censaron 8.320 parejas en 13 localidades (el 21% de las 40.057 parejas de España), que por orden de importancia fueron: embalse de Orellana (2.050 parejas), río Guadiana-Badajoz (2.050), embalse de Montijo-Mérida (1.135), embalse de Valungo (675), La Cumbre (550), Las Infantas-Trujillo (450), embalse de Alqueva-Arroyo de la Higuera (470), Ruanes (275), embalse de El Borbollón (255), embalse de La Serena (160), embalse de Arrocampo (120), embalse de Los Molinos (115) y embalse de Portaje (15 parejas). Con fechas posteriores se ha sabido de otras colonias ocupadas en 2011 y no censadas, aunque aparentemente de poca importancia. Tendencia decreciente, así en la cuenca extremeña del Guadiana los censos realizados ofrecen datos de 16.415 parejas (1991), 16.276 (1992), 8.500 (1994), 7.405 (1996), 5.725 (1997), 7.397 (2002) y 6.655 (2011). Por tanto, tras un aparentemente severo declive a principio de los años 1990 (los censos de 1991 y 1992 han sido puestos en duda, pues nunca ha sido explicado el tremendo declive del 50% entre 1992 y 1994) se pasa a un

periodo de 20 años de cierta estabilidad con fluctuaciones (Garrido *et al.*, 2012). Por el contrario, la tendencia en la cuenca del Tajo es claramente negativa. En este caso no hay cifras concretas publicadas, pero en El Borbollón, principal colonia de la cuenca del Alagón, se ha pasado de 1.500 parejas a sólo 250 y sigue disminuyendo; en el valle del Tiétar han desaparecido las colonias en dehesa y aunque Arrocampo ha sido colonizado recientemente, sólo mantiene una pequeña colonia (50-150 parejas según los años); en los Llanos de Cáceres, donde hubo importantes colonias en los años 1990, la especie dejó de criar en 2010 y en 2011 todas las colonias conocidas estaban vacías, al igual que en años siguientes. En la actualidad se mantienen 3-5 colonias en los Llanos de Trujillo, pero otras han sido abandonadas. En 2011 quedaban 3 colonias con 1.275 parejas; en 2014 hay tres colonias (dos se mantienen, una desaparece y se localiza otra que ya parecía existir) que sólo suman 273 parejas (J. Porras, com. pers.), lo que supone un nuevo descenso del 80% en sólo 3 años.

- Población invernante, enero 2011. Se registraron 30.917 ejemplares en 39 dormideros en Extremadura, el 17% de las 185.168 aves censadas en España. Por provincias fueron 22.315 en 23 dormideros de Badajoz y 8.602 en 15 de Cáceres. El tamaño de los dormideros osciló entre 16 y 6.103 ejemplares, superando once de ellos el millar de aves. Destacan el Azud de Badajoz (6.100), río Zújar-Villanueva de la Serena (4.200), embalse de Valungo (2.700), Madrigalejo (2.400) y río Guadiana-Montijo (2.000), todos ellos en la cuenca del Guadiana. En la cuenca del Tajo sólo dos superan ligeramente las mil aves: Arroyo Concejo-Cáceres (1.100) y río Alagón-Coria (1.050). En cuanto a su distribución, es evidente la importancia del río Guadiana y sus vegas, seguidas por otras zonas llanas agrícolas.
- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos dado que no está estrechamente ligada a humedales. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife (2009-2014) se anotaron 358 en 2009, 842 en 2010, 660 en 2011, 4.793 en 2012, 6.702 en 2013 y 7.977 en 2014. Aunque parece que hay aumento, posiblemente sólo es un reflejo de la mejora de la calidad del censo en el periodo de 6 años considerado, que en pocos casos incluye dormideros.
- Nuevas colonias: embalse de Portaje (CC), 10 nidos en junio 2010 (C. Clemente, J. Mahillo, S. Mayordomo) y embalse de Tentudía (BA), 50 nidos el 06/07/12 (A. Pacheco).
- Concentraciones. Vertedero de Mérida (BA), 800 el 05/10/10 y 1.500 el 06/11/11 (Á. Sánchez). Dormidero en Valdefuentes, Galisteo (CC), 4.562 el 26/09/11, 2.700 el 23/08/12 y 4.000 el 14/10/14 (J. Prieta). Grupo de unas 5.000 en embalse de La Serena (BA) el 12/06/12 (S. Pérez, D.

Rivera y otros). 3.000 en el Azud de Badajoz el 14/06/12 y el 25/10/14 (J. C. Paniagua). Nuevo dormitorio con 1.500 en embalse de Montehermoso (CC) el 14/11/12 (C. Clemente). Dormitorio con 750 en el río Ardila, Jerez de los Caballeros (BA) el 12/09/13 (J. C. Delgado). Dormitorio de Plasencia (CC), 1.050 el 17/01/09 y 1.000 el 06/11/11 (J. Prieta).

Garceta dimorfa (*Egretta gularis*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros de ejemplares puros en Borbollón (1986) y Vegas Altas (2005). Numerosos registros de presuntos híbridos a partir de 2005 en Guadiloba, Coria, Guijo de Coria, Portaje, Arrocampo (con intento de cría), Navalmoral de la Mata, Charco Salado, Talayueta, Don Álvaro y embalse de Brovales. Subespecie probable *E.g.gularis* del oeste de África.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos de ejemplares puros. Adulto en Borbollón en junio-agosto de 1986 (G. Schreur). Uno en El Torviscal el 25/09/05 (V. M. Quintana y J. Nubla).
- Registros previos de presuntos híbridos. Uno en Guadiloba el 5/03/05 (J. Calle, C. Fernández, J. L. Guisado, J. Prieta), uno en Brovales el 23/10/07 (F. Montaña) y el 11/01/08 (E. Costillo), uno en Coria el 4/04/08 (R. Montero) y el mismo en Guijo de Coria del 17/08/08 al 25/09/08 (S. Mayordomo).
- Subespecie *schistacea*. Pendiente de homologación. Un ejemplar con caracteres del morfo blanco de la subespecie *E. g. schistacea* en el embalse de Portaje (CC) el 12/07/12 y el 26/07/12 (S. Mayordomo).
- Registros de presuntos híbridos en 2009-2014.
 - Una en la Laguna del Gañán, Guijo de Coria (CC) el 18/07/09 (S. Mayordomo) y en el embalse de Portaje (CC) los días 07/08/09, 12/09/09 (S. Mayordomo) y 19/09/09 (C. Clemente, J. Mahillo). Posiblemente la misma citada en Coria y Guijo de Coria en 2008.
 - Arrocampo (CC). En 2009, uno los días 12/03/09 (S. Fletcher y C. Jewitt), 13/03/09 (S. Fletcher), 19/03/09 (A. Ceballos) y el 22/03/09 (D. Langlois y S. Langlois). En 2012, uno el 18/10/12 (J. M. Castrillo y F. G. Crego). En 2013, en la garcera un ejemplar el 04/04/13 (C. Clemente, M. de Gabriel) al 22/05/13 (A. Redondo), forma pareja y comparte nido con una garceta común pero aparentemente fracasan (otros observadores: A. Briz, J. Briz, A. M. Ruiz, E. Palacios, J. Mahillo, J. Prieta, J. V. Oropesa, J. C. López, M. Á. Muñoz, F. Ramírez, R. Montero, S. Mayordomo, V. Risco, A. Núñez, J. Guerra, M. Gálvez, V. de Alba, P. Vera). En octubre de 2013, una en el dormitorio el 09/10/13 (S. Mayordomo).

- Tres registros en Campo Arañuelo en 2011 y 2013, quizás de el mismo ejemplar de Arrocampo: en Navalmoral de la Mata (CC) los días 18/11/11 y 20/11/11 (J. Briz, M. García del Rey y V. Risco); en Charco Salado, Casatejada (CC), el 16/07/13 (J. Briz, S. Mayordomo y V. Risco) y en Talayuela (CC) el 29/08/13 (P. Gómez).

- Posible híbrido sin descartar un ejemplar puro en el Molino de la Aceña, Don Álvaro (BA), el 19/11/13 (J. Guerra).

Garceta común (*Egretta garzetta*)

Estatus regional. Residente escasa (424 parejas en 2011; el 4,5% de España) con tendencia creciente, especialmente en la cuenca del Guadiana. Invernante común (1.273 individuos en 2011; el 7,3% de España) con tendencia estable o en ligero aumento, sobre todo en la cuenca del Tajo. Migrante numerosa, sobre todo durante la dispersión postnupcial. Subespecie *E.g.garzetta*.

Criterio. Censos en colonias y dormideros y cifras de interés (>50).

- **Población reproductora, año 2011.** Se censaron 424 parejas en 13 localidades (el 4,5% de las 9.347 parejas de España), que por orden de importancia fueron: embalse de Orellana (135 parejas), río Guadiana-Badajoz (80), embalse de Montijo-Mérida (45), embalse de Valuengo (43), embalse de Alqueva-Arroyo de la Higuera (31), embalse de Arrocampo (29), embalse de Los Molinos (28), embalse de El Borbollón (14), embalse de Portaje (7), embalse de La Serena (5), La Cumbre (4), Las Infantas-Trujillo (2) y Ruanes (1 pareja). Las 13 colonias citadas son las mismas con censo positivo de garcilla bueyera, es decir el 100% de las colonias tienen ambas especies. Con fechas posteriores se ha sabido de otras colonias ocupadas en 2011 y no censadas, aunque aparentemente de poca importancia. Tendencia creciente, así en la cuenca extremeña del Guadiana los censos realizados ofrecen datos de 85 (1994), 87 (1995), 208 (1996), 214 (1997), 281 (2002) y 367 (2011). Por tanto, en menos de dos décadas se ha multiplicado por más de cuatro veces a un ritmo anual de +7,1% Para la provincia de Cáceres el aumento también es muy evidente, pasando de 22 parejas en 2002 a 57 en 2011, tendencia contraria a otras zonas de la cuenca del Tajo de Madrid y Castilla-La Mancha donde la tendencia es muy negativa (Garrido *et al.*, 2012).
- **Población invernante, enero 2011.** Se registraron 1.273 ejemplares en Extremadura (823 en Badajoz y 450 en Cáceres) en 38 dormideros (20 en Badajoz y 18 en Cáceres). Siete dormideros albergaron más de 50 aves, destacando el embalse de Valuengo (230), Madrigalejo (125) y río Guadiana en Montijo (100). Como en el caso de la garcilla bueyera el

área geográfica de mayor importancia son las vegas del río Guadiana.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife (2009-2014) se anotaron 51 en 2009, 181 en 2010, 245 en 2011, 533 en 2012, 471 en 2013 y 568 en 2014. Aunque parece que hay aumento, posiblemente sólo es un reflejo de la mejora de la calidad del censo en el periodo de 6 años considerado, que en pocos casos incluye dormideros.
- Registros en interés. Nueva colonia en el embalse de Portaje (CC) en junio 2010 (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo). En Charco Salado (CC), 182 el 19/09/09 y 147 el 12/10/11 (J. L. Guisado, M. García del Rey, P. Goñi, S. Mayordomo). 63 en Santa Amalia (BA) el 11/03/10 (F. Yuste). 95 en el embalse de Alange (BA) el 06/09/11 (Á. Sánchez). 150 en Los Canchales (BA) el 24/09/11 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta, S. Mayordomo). 300 en el Azud de Badajoz el 01/11/12 (J. C. Paniagua). 317 en el embalse de Montijo (BA) el 25/11/12 (Á. Sánchez).

Garceta grande (*Egretta alba*)

Estatus regional. Reproductora muy escasa en una localidad (confirmado en 2010; 1-3 parejas en el embalse de Arrocampo en 2010-2014) con tendencia creciente. Invernante escasa (máximo registrado 125 ejemplares en 2013; estima de 150-200) con tendencia creciente. Subespecie *E.a.albus*.

Criterio. Plumaje nupcial, nuevas localidades y cifras de interés (>10 aves).

- Reproducción. Primer caso conocido en el año 2010: una pareja cría con éxito al menos dos pollos en Arrocampo (J. Prieta, S. Mayordomo y E. Palacios). En el curso del Censo de ardeidas reproductoras de 2011 se localizaron dos parejas, el 4% de las 53 censadas en 13 localidades de España (Garrido *et al.*, 2012). En años siguientes han criado al menos dos parejas en Arrocampo, siendo tres las parejas probables en el año 2013, que supone el máximo para Extremadura. En esta localidad hay citas de aves con plumaje nupcial desde 2006, siendo posible que la especie llevará reproduciéndose con anterioridad. Aunque se han observado aves nupciales en otras localidades, en ninguna de ellas se ha constatado la reproducción hasta la fecha (2015).
- Población invernante, enero 2011. Se registraron 67 aves en 18 dormideros, el 4,6% de las 1.459 aves censadas en España. Por provincias fueron 31 en Badajoz y 36 en Cáceres. El tamaño de los dormideros osciló entre 1 y 15 ejemplares, destacando el río Tiétar-Malpartida de Plasencia (15), Arrocampo (9), embalse de Valdecaballeros (7) y río Zújar-Villanueva de la Serena (6). El resto de dormideros acogían cuatro o menos aves (Garrido *et al.*, 2012). Aparte de este censo, las localidades

principales se sitúan en el río Guadiana en Valverde de Mérida-La Zarza (70 aves), el embalse de Alcollarín (33), Arrocampo (>30) y el río Tiétar (25).

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife (2009-2014) se anotaron 2 en 2009, 28 en 2010, cero en 2011, 56 en 2012, 125 en 2013 y 95 en 2014. La tendencia mostrada es claramente positiva, aunque seguramente las cifras estén infravaloradas y dependan mucho de la calidad del censo de cada año. Así, en 2011 no se anotó ningún ejemplar por la Junta de Extremadura cuando en el censo nacional de dormideros se vieron 67 ejemplares. En 2013 se superó por vez primera el registro de 100 aves (125). La población invernante como mínimo se estima en 150 aves, aunque podría ser superior a las 200. Al menos 3 parejas anidando en el embalse de Arrocampo (CC) el 12/06/13 (J. Prieta).
- Aves nupciales. En Arrocampo (CC) se citan regularmente desde 2006. En 2012 se vieron 5 entre el 23/03/12 y el 28/05/12 (SEO-Cáceres). Orellana (BA), una el 13/03/12 (Á. Sánchez). Embalse de Portaje (CC), una el 28/03/12 (S. Mayordomo). Valdefuentes, Galisteo (CC), una el 06/05/12 (J. Mahillo). Lancho, Arroyo de la Luz (CC), una el 11 y 25/05/12 y 25/05/12 (S. Mayordomo).
- Registros 2009-2014. Valverde de Mérida (BA), 68 en dormidero el 27/10/14 (J. Guerra). Guadiana, La Zarza (BA), >50 en dormidero el 27/10/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Arrocampo (CC), en dormidero, 30 el 29/11/09 (D. Langlois, M. García del Rey, S. Langlois, V. Risco), 30 el 01/04/10 (D. Langlois, S. Langlois), 25 el 05/03/12 (J. Prieta), 26 el 14/10/12 (S. Mayordomo, S. Langlois, M. García del Rey, D. Langlois), 49 el 07/12/12 (J. Muddeman), 20 el 17/01/13 (J. Guerra, M. Gálvez), 24 el 09 y 16/10/13 (S. Mayordomo, J. Prieta) y 20 el 22/10/14 (J. L. Bautista). Charco Salado (CC), 24 el 11/09/09, 15 el 02/10/10, 29 el 13/10/11 (S. Mayordomo), 12 el 02/02/14 (M. Kelsey) y 25 el 17/02/14 (M. García del Rey). Los Canchales (BA), 17 el 24/09/11, 25 el 09/10/11, 16 el 25/10/11 y 20 el 13/11/11 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta, S. Mayordomo, A. Cangas, A. Garrote, E. del Viejo, J. P. Prieto). Embalse de Montijo (BA), 24 el 25/11/12 (Á. Sánchez) y 12 el 08/12/12 (A. Calvo). Otras localidades. Río Tiétar, Toril (CC), 18 en dormidero el 27/01/11 (J. Prieta). Campo Lugar-Palazuelo (CC/BA), 15 el 07/10/11 (S. Fletcher). Sierra Brava (CC), 15 en dormidero el 07/01/13 (M. Jiménez y P. Tapia). Río Zújar (BA), 28 el 13/01/13 (J. P. Prieto). Embalse de Alcollarín (CC), 15 el 28/10/14 (M. Kelsey). Embalse del Cubilar (CC), 11 el 13/11/11 (E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, S. Mayordomo). Villanueva de la Vera (CC), 11 en vuelo el 12/05/10 (D. Langlois).

Garza real (*Ardea cinerea*)

Estatus regional. Reproductor común (1.560 parejas y 90 colonias en 2014; 18% de España) con tendencia creciente. Invernante común (>2.500 ejemplares) con tendencia creciente. Subespecie *A.c.cinerea*.

Criterio. Censos en colonias y cifras de interés (>40).

- Población reproductora, año 2011. Se censaron 1.230 parejas en 75 localidades (el 18% de las 6.994 parejas de España; sólo superada por Andalucía). Por provincias hubo 31 colonias y 265 parejas en Badajoz y 44 colonias y 965 parejas en Cáceres. Por orden de importancia las mayores colonias fueron: embalse de El Borbollón (185 parejas), Los Ejidos-Talayuela (135, posiblemente más de 150), embalse del Salor (57), presa de Gabriel y Galán (52), San Marcos-Talayuela (47), Cuarto de Pilas-Badajoz (42) y Llanos de Reluz-Jerez de los Caballeros (42). El resto no superaban las 40 parejas (Garrido *et al.*, 2012). No obstante, la cobertura no fue total, en especial en Badajoz, donde por ejemplo no fue censada la colonia más importante (El Plantonal-Villanueva del Fresno: 130 nidos en 2014). Después de 2011 se han localizado 14 nuevas colonias, algunas en realidad ocupadas antes de 2011. Con la nueva información se calcula que en 2014 había más de 1.500 parejas reproductoras de garza real en Extremadura en al menos 90 colonias. La tendencia por tanto es claramente positiva, superando todos los censos anteriores. La garza real no nidificaba en Extremadura en 1950, en 1960 se conocía una colonia con 5 nidos, en 1970 eran 2 colonias con 76 nidos, 4 colonias y 164 parejas en 1980, 8 colonias y 565 parejas en 1990, 25 colonias y 882 parejas en 2002, 75 colonias y 1.230 parejas en 2011 y 90 colonias y 1.560 parejas estimadas en 2014.
- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos ya que no forma dormideros, por lo que no es posible determinar la población invernante con precisión. No obstante, las cifras obtenidas en los censos de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife (2009-2014) se anotaron 210 en 2009, 317 en 2010, 359 en 2011, 783 en 2012, 484 en 2013 y 668 en 2014. En todos los casos son censos parciales que infravaloran la población, estimada en más de 2.500 ejemplares. Con la información disponible no es posible establecer la tendencia invernal en Extremadura, pero se supone que al ser una especie residente en aumento como reproductor en Extremadura y España, la tendencia invernal debe ser la misma.
- Cifras de interés. Embalse de Alange (BA), 151 el 06/09/11 (Á. Sánchez). Valdecañas (CC), 80 el 08/09/11 (E. Palacios, S. Mayordomo). Embalse de Portaje (CC), 254 el 16/09/11 (S. Mayordomo). Los Canchales (BA), 83 el 09/10/11 (A. Cangas, A. Garrote, E. del Viejo).

Embalse de Valungo (BA), 147 el 26/07/12 (F. Montaña) y 100 el 17/08/12 (S. Pérez).

- Otros registros. Una captura una agachadiza común en el arrozal de El Batán (CC) el 17/02/12 (S. Mayordomo).

Garza imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus regional. Reproductora estival escasa (50-75 parejas; 2% de España) con tendencia creciente. Migrante escasa y dispersa. Invernante esporádica. Subespecie *A.p.purpurea*.

Criterio. Todas las observaciones (en Arrocampo sólo censos y fenología).

- Población reproductora, año 2011. Se censaron 105 parejas en 8 localidades ocupadas (el 2% de las 5.379 parejas de España). Por provincias hubo 7 colonias y 59 parejas en Badajoz y una colonia y 46 parejas en Cáceres. Los datos por localidad fueron: embalse de Arrocampo (46 parejas), río Zújar-Campanario (14), embalse de Alqueva-Arroyo de la Higuera (10), embalse de Los Molinos (4), Embalse de Montijo (2), Valdecaballeros (2), Azud de Badajoz (1) y embalse de Orellana (1). La tendencia es claramente positiva, superando todos los censos previos. Los primeros datos de nidificación son de 1992 en Arrocampo, 1996 en el río Zújar y 1997 en el embalse de Montijo. En 1994 se estimaron 50 parejas en Arrocampo, única localidad conocida entonces. En 2002 se estimaron 70-80 parejas en Extremadura, 50-60 de ellas en Arrocampo, 15 en Montijo y 5 en el río Zújar. En 2008 se hizo el primer censo en Arrocampo, con un resultado de 40-45 parejas. Las cifras de 2011 indican una expansión de la especie (de 1 a 8 localidades) y un incremento poblacional regional (de 50 a 105 parejas), aunque la principal colonia de Arrocampo parece estable desde su formación hace más de 20 años.
- Registros invernales. Arrocampo (CC): una el 16/11/11, 05/02/12 y un adulto el 01/01/13 (E. Palacios, I. Gallardo, M. García del Rey, M. Á. Muñoz, S. Mayordomo, S. Langlois y D. Langlois). Campo Lugar (CC), una el 16/11/13 (A. Calvo).
- Llegadas. Arrocampo (CC), una el 13/03/09 (S. Fletcher), una el 16/03/10 (M. Kelsey), 5 el 18/03/10 (J. Briz, V. Risco), una el 12/03/11 (E. Palacios y S. Mayordomo), una el 05/03/12 (Á. Sánchez), una el 03/03/13 (J. Briz, J. Guerra, M. Gálvez, V. Risco). Valdefuentes, Galisteo (CC), una el 30/03/11 y el 12/03/12 (S. Mayordomo). Mérida (BA), una el 17/03/12 (L. Alcántara). Badajoz, un adulto el 24/03/13 (J. C. Paniagua). Villagonzalo (BA), 3 el 26/03/13 (J. Guerra, M. Gálvez). Torremayor (BA), una el 28/02/14 (J. P. Prieto).

- Últimos registros. Una en Badajoz (BA) el 07/10/10 (J. C. Salgado). Joven en Casas de Belvís (CC) el 09/10/10 (J. Briz). Una en La Granja (CC) el 10/10/10 (R. Montero). Adulto en Arrocampo (CC) el 12/10/11 (J. L. Guisado, M. García del Rey, P. Goñi, S. Mayordomo). Una en Medellín (BA) el 26/09/12 (F. Yuste). Joven en Galisteo (CC) el 07/10/12 (J. Prieta). Adulto en Arrocampo (CC) el 14/10/12 (S. Mayordomo, S. Langlois, M. García del Rey, D. Langlois). Una en El Batán (CC) el 05/11/13 (C. Clemente). Una en Galisteo (CC) el 18/10/14 (S. Mayordomo). Santa Amalia (BA), una el 23/10/14 (F. Yuste).

Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)

Estatus regional. Reproductora escasa (155-197 parejas en 2009-2014) con tendencia estable. Invernante muy escasa (50-75 ejemplares) con tendencia desconocida, posiblemente positiva. Forma concentraciones postnupciales de hasta 170 ejemplares. Monotípica.

Criterio. Invernada (noviembre a enero), cifras destacadas (>5) y fenología.

- Población reproductora, 2009-2014. Los resultados publicados por la Junta de Extremadura son de 162-165 parejas y 188 pollos volados (2009), 155-161 parejas y 205 pollos (2010), 195 parejas y 309 pollos (2011), 162 parejas y 151 pollos (2012), 189 parejas y 276 pollos (2013) y 197 parejas y 322 pollos (2014). La población ha oscilado entre 155 y 197 parejas censadas, con altibajos seguramente debidos a la diferente cobertura y máximos en 2011 y 2014, que son también los años con mayor número de pollos volados. Es posible que los años con peores condiciones para la reproducción haya más parejas que fracasan pronto o no inician la crianza y pasen inadvertidas en los censos. La tendencia en el periodo 2009-2014 es aparentemente estable, lo mismo que se aprecia a más largo plazo en el periodo 1993-2014, que tuvo un máximo de 219 parejas en 1995 (única ocasión que superan las 200 parejas). En Extremadura se estiman 200-220 parejas reproductoras. Por provincias se conocen datos de 2013 y 2014, con valores de 116 y 118 parejas en Cáceres y 73 y 79 en Badajoz. En 2013 y 2014 los parámetros reproductores fueron de 82 y 83% parejas con éxito, tasa de vuelo de 2,45 y 2,37 pollos/nido con éxito y productividad de 1,97 y 1,63 pollos/nido ocupado. En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 365 plataformas el 54% estaban en árbol (60% alcornoque, 12% encina, 11% pino resinero, 11% pino piñonero, 5% roble melojo y dos en eucalipto y uno en pino laricio), el 45% en roca (75% cortado fluvial y 25% cantil serrano) y dos en otros sustratos. Estos valores son muy diferentes a los de 2013, donde se indica un 54% de

nidos en roca y un 46% de nidos en árbol; aunque sería necesario disponer de datos de nidos ocupados para hacer una comparación adecuada.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta especie. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife (2009-2014) se vieron 2 en 2009, 2 en 2010, cero en 2011, 7 en 2012, 9 en 2013 y 23 en 2014 en 0-7 localidades diferentes cada año. El aparente aumento observado probablemente es debido a la mejora en la calidad de los censos.
- Llegadas. Debido a la presencia de invernantes es difícil establecer con precisión el regreso de las aves migradoras. 2 en Monfragüe (CC) el 11/02/09 (M. García del Rey) y en cortejo el 13/02/09 (S. Mayordomo). Una en Valdeobispo (CC) el 06/02/10 (C. Clemente). Una en Monfragüe (CC) el 31/01/11 (M. Kelsey) y el 6/02/11 (E. Palacios y M. Á. Muñoz). Una en Monfragüe el 29/01/12 (J. Esteban) y el 30/01/12 (R. Abuín). El 03/02/12, una en Alcuéscar (CC) (J. L. Rivero). El 5/02/12, 3 en Valverde de Burguillos (BA) (A. Núñez), y 2 en Guijo de Granadilla (CC) (J. Julián, I. Solana). 2 en Hornachos (BA) el 02/02/13 (Á. Sánchez). En Logrosán (CC), una el 02/02/13 (H. Zweers) y 2 el 08/02/13 (E. Peña). Una en Toril (CC) el 04/02/13 (L. Sitges). Una en Puerto Peña (BA) el 07/02/13 (J. Muddeman). Una en Monfragüe (CC) el 22/01/14 (R. Serradilla). Una en Puerto Peña (BA) el 31/01/14 (M. Gálvez, J. Guerra).
- Agrupaciones postnupciales. Censo aéreo el 24/09/11, 82 aves: 26 en el Tiétar (CC) y embalse de Rosarito (AV) (J. Mahillo), 11 en el arroyo Guadarrojo (CC) (S. Mayordomo) y 45 en la cola de Orellana (BA) (C. Clemente). 35 en Gabriel y Galán (CC) el 15/09/10 (A. Pacheco). Trujillo y entorno (CC): 40 el 09/09/10 (M. Kelsey), 46 aves el 9/09/11 (J. Porras), 42 el 05/09/12, 109 el 09/09/12, 45 el 12/09/12 (J. Esteban) y 43 el 18/08/14 (J. Porras). 15 en el embalse del Tozo (CC) el 17/09/13 (J. Hawkins). En Orellana (BA), 33 el 24/10/10 y 14 el 29/10/13 (Á. Sánchez, D. Rivera). 18 en el Matachel (BA) el 31/08/11 (R. Sánchez). 8 en el Aljucén, Mérida (BA), 23/09/11 (Á. Fernández). 61 en el embalse de Alange (BA) el 13/09/12 (J. Sánchez, Á. L. Sánchez, Á. Sánchez). 11 en el embalse de Llerena (BA) el 10/09/13 (J. Guerra, J. C. Albero, M. Gálvez, S. Fernández). 12 en Brovales (BA) el 02/10/13 (F. Montaña). 7 en el Canal de Las Dehesas, Logrosán (CC), el 18/10/13 (J. A. Román). 46 en Valuengo (BA) el 14/09/14 (V. de Alba y A. Núñez).
- Últimos registros. La presencia de invernantes hace difícil precisar las fechas de migración postnupcial. 3 en Alburquerque (BA) el 24/10/09 (G. Schreur). 33 en Orellana (BA) el 33 el 24/10/10 (Á. Sánchez). En Monfragüe (CC), una el 30/10/11 (S. Mayordomo) y el 07/10/12 (A.

Rubio). 6 en Cubilar (CC) el 12/10/12 (E. Peña). Un juvenil en el embalse de Llerena (BA) el 13/10/12 (J. Vázquez, J. A. Delgado, F. Montaña, A. Núñez). Un adulto en Barcarrota (BA) el 19/10/12 (M. Gálvez, J. Guerra). 2 en el canal de Las Dehesas (BA) el 22/10/12 (E. Peña). Una en Galisteo (CC) el 14/10/14 (J. Prieta). Una en Brovales (BA) el 20/10/14 (F. Montaña y A. Núñez). Una en Gadiana del Caudillo (BA) el 20/10/14 (J. L. Bautista). 12 en el Canal de las Dehesas (BA) el 25/10/14 (Á. Sánchez). Una en Alcollarín (CC) el 28/10/14 (M. Kelsey). 2 en Santa Amalia (BA) el 31/10/14 (J. A. Román).

- Invernada 2008-2009. Borbollón (CC), una el 04/01/09 (C. Clemente y J. Mahillo). Brozas (CC), 2 el 04/01/09 (J. L. Valiña). Tiétar en Valdeíñigos (CC), 2 el 09/01/09 (J. Prieta). Ceclavín (CC), 2 el 10/01/09 (C. Pacheco).
- Invernada 2009-2010. Navalvillar de Pela (BA), una el 19/11/09 (M. Kelsey). Valdeíñigos (CC), una el 25/11/09 (J. Prieta). Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), 3 el 17/12/09 (R. Montero) y una el 09/01/10 (S. Mayordomo). Madrigalejo (CC), 5 el 17/12/09 (J. M. Tapia, M. Jiménez). Acehúche (CC), una el 18/12/09 (A. Rodríguez). 56 en vuelo sobre Cáceres capital el 21/12/09 (A. Rodríguez) y sobre Monfragüe (CC) el 22/12/09 (J. Guerra). Una en Orellana (BA) el 09/01/10 (J. L. Anguita). Una al norte del Almonte (CC) el 26/01/10 (M. Kelsey). Una en el Tiétar (CC) el 31/01/10 (J. Briz).
- Invernada 2010-2011. Oliva de Plasencia (CC): una el 10/11/10 (R. Montero), 3 el 14/11/10 (R. Vicente), 6 el 17/11/10 (J. Prieta), 2 el 22/12/10 (R. Guzmán), una el 26/12/10 (R. Montero) y una el 02/01/11 (C. Clemente, J. C. Paniagua, S. Mayordomo). En Moheda Alta (BA), 2 el 27/11/10 (Á. Sánchez) y una el 27/01/11 (M. Kelsey). El 26/12/10 una en Santa Cruz de la Sierra (CC) (M. Rodríguez). Una en Alburquerque el 9/01/11 (L. Venancio) y el 30/01/11 (J. C. Salgado). Una en Serrejón (CC) el 13/01/11 (J. L. Rivero y S. Fletcher). 2 en Zorita (CC) el 21/01/11 y una en Vegas Altas (BA) el 23/01/11 (E. Palacios, J. García, M. Á. Muñoz, F. Ramírez).
- Invernada 2011-2012. Moheda Alta (BA), 1-2 del 31/10/11 al 10/11/11 (M. Kelsey). En el Canal de la Dehesas (CC), 18 el 04/11/11 (Á. Sánchez). En Mérida (BA), 3 inmaduros el 06/11/11 (Á. Sánchez). Una en Lancho, Arroyo de la Luz (CC), el una 06/11/11 (C. Fernández, J. M. Brías, R. Parra). Una en Gargáligas (BA) el 23/11/11 (E. Palacios, M. Á. Muñoz, S. Mayordomo). 2 en el embalse de Jarilla (CC) el 30/11/11 (J. Prieta, S. Mayordomo). Una en Madrigal de la Vera (CC) el 17/12/11 (D. Langlois). Una en Los Arenales (CC) el 21/12/11 (J. Guerra, S. Mayordomo). En Oliva de Plasencia (CC), 4 en Fresnedilla el 29/12/11 (J. Montero) y una en el Pozo de la Mozas el 31/12/11 (S. Mayordomo).

Una en La Zarza (BA) el 10/01/12 y otra en Cornalvo (BA) el 12/01/12 (J. Solana). 3 en El Sevillano, Puebla de Alcocer (BA), el 13/01/12 (J. A. Barquero). El 14/01/12 una en la Charca de La Isla, Logrosán (CC) (J. Mahillo, C. Clemente). 2 en Navalvillar de Pela (BA) el 18/01/12 (M. Gómez Calzado). En el embalse de Montijo (BA), un inmaduro anillado en Chequia el 12/02/12 (P. Herrador, J. L. Bautista).

- Invernada 2012-2013. El 27/10/12: 2 en el embalse de Jarilla (CC) (S. Mayordomo, R. Cano, L. M. Parejo) y una en la laguna de Galisteo (R. Cano y L. M. Parejo). En Oliva de Plasencia (CC), 2-5 del 27/10/12 y 23/01/13, una de ellas anillada en Chequia (J. Julián, R. Montero, J. Prieta, R. Borrega, P. Núñez, S. Mayordomo). Una en Charco Salado (CC) el 06/11/12 (R. Virosta). Río Tiétar (CC): una en La Bazagona el 13/11/12 (R. Sancho) y el 19/12/12 (J. Prieta, I. Hernández), 2 en Villanueva de la Vera el 27/11/12 y el 31/01/13 (P. Gómez), y una en Monfragüe el 17/01/13 (A. Puente de la Rosa) y 24/01/13 (M. García del Rey). En Toril (CC), una el 19/12/12 (J. Parra), el 23/01/13 (M. García del Rey) y el 30/01/13 (Ó. Díaz). Una en Corral Alto, Zorita (CC), el 09/11/12 (S. Mayordomo). En la Solana, Herrera de Alcántara (CC), una los días 12 y 14/11/12 (A. Galán). En Orellana (BA), 2-22 del 13/11/12 al 24/01/13 (Á. Sánchez, Á. L. Sánchez, D. Rivera). En Logrosán (CC): 1-3 del 14/11/12 al 13/01/13 (H. Zweers). Valverde de Burguillos (BA), una el 19/11/12 (V. de Alba). Una sobre Torremayor (BA) el 21/11/12 (F. Lopo). Una en Monesterio (BA) el 27/12/12 (J. Conejero). El 23/01/13 una en Zorita (CC) (F. Yuste). 2 en Casatejada (CC) el 29/01/13 (R. Montero).
- Invernada 2013-2014. Una en Galisteo (CC) el 27/11/13 (S. Mayordomo). Villar de Plasencia (CC), una el 05/11/13 (R. Montero). Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), 2-5 del 11/11/13 al 12/01/14 (R. Montero, J. Prieta, J. Montero, L. M. Parejo, J. M. Diu, J. M. Herranz). 2 en Herrera de Alcántara (CC) el 28/11/13 (A. Galán). Una en Brozas (CC) el 27/01/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Una en Jarripa, Torremocha (CC), el 25/11/13 (A. Puerto). Una en Campo Lugar (CC) el 26/01/14 (A. Calvo y J. P. Prieto). Canal de las Dehesas (BA/CC), 1-11 del 01/11/13 al 22/11/13 (J. Á. Sánchez, L. Salguero, A. Calvo, J. A. Barquero, Á. Sánchez). Moheda Alta (BA), 1-3 del 16/11/13 al 30/01/14 (A. Calvo, M. Kelsey, J. Muddeman). 3 en Navalvillar de Pela (BA) el 21/01/14 (M. Gómez Calzado). 3 en El Sevillano, Puebla de Alcocer (BA), el 12/11/13 (J. A. Barquero). 2 en el río Ardila (BA) el 11/01/14 (E. del Viejo). En Brovales (BA), una del 17/12/13 al 13/01/14 (F. Montaña, A. Núñez, J. Vázquez). En Valuengo (BA), una del 29/12/13 al 10/01/14 (A. García, V. de Alba, A. Núñez). 4 en Campillo de Llerena (BA) el 05/01/14 (F. Macías).

- Invernada 2014-2015. 2 en Torrejoncillo (CC) el 04/11/14 (A. Pacheco). En Oliva de Plasencia (CC), 1-4 del 24/11/14 al 23/12/14 (J. Torfs, M. Viskens, H. Sánchez, S. Mayordomo). Río Tiétar, Monfragüe (CC), una del 05/11/14 al 02/12/14 (M. Kelsey, J. Arias, J. L. Rivero). Una en Santa Marta de Magasca (CC) el 02/11/14 (M. Kelsey). En el embalse de Alcollarín (CC), 1-5 del 18/11/14 al 22/11/14 (S. Daly, M. Kelsey, B. Small, S. Mayordomo, N. Renwick, F. Montaña). Una en Campo Lugar (CC) el 22 y 29/11/14 (C. Clemente, S. Mayordomo, E. Palacios, A. Calvo). Una en el canal de las Dehesas (BA) el 19/12/14 (M. Kelsey). Una en Pizarro (BA) el 30/11/14 (F. Yuste). Una en el río Ardila, Valencia del Ventoso (BA) el 02/11/14 (V. de Alba, A. Núñez). En Brovales (BA), 1-2 del 15/11/14 al 15/12/14 (F. Montaña).

Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus regional. Reproductora estival común (12.000 parejas en 2004; 33% de España) con tendencia creciente, quizás estable en los últimos años. “Invernante” (en otoño) común (7.000-8.000 individuos en 2004) con tendencia creciente. Subespecie *C.c.ciconia*.

Criterio. Cifras destacadas (>500) y fenología.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos no son representativos para esta especie y el mes de enero está considerado como fecha de migración prenupcial y de ocupación de zonas de reproducción. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife (2009-2014) se vieron 889 en 2009, 1.040 en 2010, 798 en 2011, 3.061 en 2012, 2.844 en 2013 y 3.383 en 2014 con una amplia distribución (72 humedales con presencia en 2014).
- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,3% y aumento poblacional de +76% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un aumento medio anual de +3,4% y total de +310% (SEO/BirdLife, 2013b).
- Concentraciones. 1.500 en el vertedero de Mérida (BA) el 26/02/12 (Á. Sánchez). 1.000 sobre Baños de Montemayor (CC) el 04/08/13 (J. Prieta).
- Invernada. Vertedero de Mérida (BA), 2.850 el 28/09/10, 2.500 el 20/10/10, 1.500 el 17/09/11 y 1.200 el 06/11/11 (Á. Sánchez). 134 en el Ecoparque de Mirabel (CC) el 27/10/10 (J. Prieta y S. Mayordomo). 1.000 en la laguna del Palancoso (CC) el 15/01/12 (V. Risco y J. Briz). En arrozales de Riobobos (CC), 1.071 en los el 17/01/12 y 236 el 15/11/12 (J. Prieta).

- Reproducción. Junio de 2011: colonia con 130 nidos junto al vertedero de Mirabel (CC), 82 en encinas y 48 en tendido de alta tensión (J. Prieta), y colonia con unos 150 nidos en el embalse del Salor (CC) (J. Jaén). 3 nidos en el suelo en una isla del embalse de La Serena (BA) el 18/05/12 (S. Pérez, M. A. Sánchez, D. Rivera y otros).

Marabú africano (*Leptotilos crumeniferus*)

Estatus regional. Accidental. Origen desconocido. Diez registros de al menos a 7 individuos entre 2000 y 2009. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos. Uno en septiembre 2000 en Gabriel y Galán (M. Morales). Uno en diciembre de 2000 en Malpartida de Cáceres (A. Tejerina). Uno en Los Barruecos el 16/05/03 (Diario HOY). Uno en la charca de Merinillas (BA) el 11/12/03 (J. Hernández), en el vertedero de Badajoz el 20/12/03 (J. Mazón) y entre Cheles y Villanueva del Fresno el 14/01/04 (J. I. Ruiz de la Concha). Uno en Guadiloba el 16/05/05 (A. Moga). Uno en Guadiana del Caudillo el 7/10/05 (T. Álvarez). Un adulto en La Torrecilla, Plasencia, el 27/10/08 (J. Prieta) y en Acehúche el 2/11/08 (A. Rodríguez) y el 6/11/08 (I. Solana y J. Julián)
- Nuevo registro. Uno, que es el mismo que se vio 2008, en el embalse de Portaje (CC) el 28/02/09 (M. Pérez).

Morito común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso de reciente aparición (primer caso confirmado en 2012). Población de 5-15 parejas en 2012-2015 con tendencia creciente y expansiva (3 colonias en 2015). Invernante escaso en aumento. Migrante escaso en aumento. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Reproducción. En 2012 se confirman las primeras nidificaciones en la región: en el Azud de Badajoz se localizan 9 parejas, al menos 2 crían con éxito 5 pollos (A. Fernández, J. C. Paniagua). En 2013 no se detectan casos de cría. En 2014 ocupa de nuevo el Azud de Badajoz con al menos 7 nidos (J. C. Paniagua, A. Fernández) y el embalse de Montijo con al menos 4 nidos y 7 pollos volantones (C. González). En 2015 ocupa de nuevo ambas colonias y además se detecta un nido en el embalse de Los Canchales (J. L. Bautista). Los registros concretos en Badajoz son: 2 nidos y 5 jóvenes el 21 y 22/07/12, 61 aves el 20/05/14, 49, incluidos 5 pollos, el 23/05/14 y 5 nidos en junio de 2014 (A. Fernández, J. Mazón y J. C. Paniagua),

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta especie, no obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) nunca fue observado y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 5 individuos en 2012, uno en 2013 y 5 en 2014 en 1-3 localidades cada año.
- Año 2009. 13 en Casas de Hitos (BA-CC) el 16/09/09 (M. Kelsey).
- Año 2010. Uno en el Guadiana, Badajoz, el 22/08/10 y el 27/08/10 (A. Fernández). Uno en Palazuelo (BA) el 11/10/10 (J. García). En Moheda Alta (BA), 2-3 en diciembre 2010 (M. Gómez Calzado).
- Año 2011. Uno en El Batán (CC) el 13/10/11 (J. Prieta). En Arrocampo (CC) uno el 04/01/11 (J. Briz y M. García del Rey) y en Cerro Alto, Saucedilla (CC), uno el 05/03/11 (A. J. Julián, G. Schreur, I. Solana) y uno cojo del 09/07/11 al 30/08/11 (J. Briz, M. García del Rey, H. Sánchez, J. Collado, V. Risco). Uno en Valdecañas (CC) el 28/07/11 (Á. Sánchez, Á. L. Sánchez). Uno en Casas de Don Antonio (CC) el 29/09/11 (J. C. Salgado, M. Rodríguez). En dormitorio de ardeidas, Madrigalejo (CC), uno el 09 y 22/01/11 (M. Kelsey) y 70 en a mediados de noviembre de 2011 (Anónimo). 2 en el embalse de Montijo (BA) el 03/04/11 (J. Solana). En Santa Amalia (BA), 1-5 del 7/09/11 al 06/10/11 (F. Yuste, J. Guerra, M. Gálvez, J. Muddeman). Uno en Torviscal (BA) el 22/10/11 (J. P. Prieto).
- Año 2012. En Arrocampo (CC), 1-6 del 20/02/12 al 22/04/12 (M. Kelsey, R. Montero, E. Palacios y otros) y uno del 12 al 14/10/12 (M. Gálvez, J. Guerra, D. Langlois y otros). En Cerro Alto, Saucedilla (CC), uno del 05 al 17/04/12 (S. Mayordomo, M. Kelsey, J. Prieta y otros). En Charco Salado (CC), **7-12** del 04/04/12 al 01/05/12 (S. Mayordomo, J. L. Guisado, V. Risco, J. Briz y otros). Río Salor (CC), 1-2 del 12/03/12 al 27/04/12 (J. C. Núñez, S. Molano). Azud de Badajoz (BA), 1-16 del 03/03/12 al 31/05/12 (J. C. Paniagua, J. C. Salgado, A. Fernández y otros), 2 jóvenes a 2 km el 17/08/12 y **21** en arrozales de Gévora-Valdebótoa el 18/08/12 (A. Fernández). Embalse de Montijo (BA), 1-24 del 21/01/12 al 31/05/12 (J. Solana, P. Herrador, J. L. Bautista, Á. Sánchez y otros); en el dormitorio se cuentan **entre 9 y 26** del 21/05/12 al 12/11/12 con máximos de 15 en junio, 13 en julio, 26 en agosto, 20 en septiembre y 15 en noviembre (J. Solana, F. Lopo, A. Calvo, S. Pérez y otros). Uno en La Garrovilla (BA) el 19/01/12 (A. Horrillo). En Montijo (BA), 19 el 19/08/12 (P. Herrador). **25** en Torremayor (BA) el 04/11/12 (S. Mayordomo, E. Palacios). En Esparragalejo (BA) uno del 08 al 27/05/12 (E. del Viejo, A. Cangas, Y. Simón, V. de Alba y otros). En Los Canchales (BA), 5 el 19/08/12 y 20 el 01/09/12 (V. de Alba, F. Montaña, A. Núñez). En arrozales de Vegas del Guadiana: **22** en Guadiana del Caudillo (BA) el 24/09/12 (P. Herrador); en Santa Amalia

(BA) uno el 18/01/12 (F. Yuste), uno el 13/09/12 (Á. L. Sánchez) y 3 el 02/12/12 (Á. Sánchez); en Campo Lugar-Palazuelo (CC-BA) 1-4 del 19/02/12 al 13/05/12 y uno el 11/10/12 (L. Lozano, L. Alcántara, A. Gil, J. P. Prieto, J. L. Pérez Chiscano y otros); 3-8 en Moheda Alta (BA), del 24/01/12 al 16/02/12 (M. Kelsey). Uno en el Ardila (BA) el 08/04/12 (F. Montaña). Uno en El Paredón, Campanario (BA), el 29/04/12 (J. P. Prieto).

- **Año 2013.** El Batán (CC), 1-4 del 25/09/13 al 28/12/13 (J. Prieta, R. Montero, S. Mayordomo). Laguna y arrozales de Galisteo (CC), **1-14** del 18/09/13 al 03/11/13, con máximo de 14 el 08/10/13 (K. Sánchez, R. Montero, J. Prieta, S. Mayordomo, C. Clemente y otros); acuden a dormir a la laguna de Valdeobispo (J. Prieta, S. Mayordomo). Uno en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 21/09/13 (A. Redondo). Uno anillado en La Camarga en el dormitorio de Plasencia (CC) el 15/03/13 (J. Prieta, S. Mayordomo). En Arrocampo (CC), 1-4 entran al dormitorio del 03/03/13 al 18/04/13 (E. Palacios, J. Prieta, J. Briz, J. Guerra, M. Gálvez, M. Kelsey, S. Mayordomo, V. Risco) y uno el 09/10/13 (S. Mayordomo). Uno en la charca del Lugar, Malpartida de Cáceres (CC), el 23/12/13 (M. Iglesias). En el azud de La Pesquera, Badajoz, **7-14** del 26/02/13 al 16/03/13 (I. Sánchez, J. C. Paniagua, A. Vega). En Mérida (BA), **2-14** del 13/03/13 al 22/04/13 (J. Guerra, S. Pérez, A. Calvo). 12 en el Gadiana, Villagonzalo (BA), el 21/03/13 (M. Gálvez). En Guareña (BA), 1-4 del 01 al 11/05/13 (A. Calvo, A. Núñez, S. Mayordomo, V. de Alba, S. Pérez y otros). En la gravera del Soto (BA), 1-7 del 04 al 11/05/13 (A. Núñez, E. Palacios, S. Mayordomo, V. de Alba y otros). 14 en Esparragalejo (BA) el 02/08/13 (F. Macías). 3 en el embalse de Alange (BA) el 10/04/13 (J. Guerra, M. Gálvez). En Madrigalejo (CC) **4-17** del 02 al 28/03/13 (E. Peña, M. Kelsey) y 3 el 20/12/13 (J. Porras). 13 en Don Benito (BA) el 20/12/13 (J. M. Álvarez). **60** en Casas de Hitos (CC) el 21/09/13 (J. Hawkins). En Palazuelo (BA), uno el 14/01/13 (J. P. Prieto, M. Cardalliaguet), uno el 13/04/13 y 3 el 27/09/13 (M. Kelsey).

En Santa Amalia (BA), 3-7 del 01/09/13 al 18/12/13 (F. Yuste, J. A. Román, N. Renwick, J. P. Prieto y otros). En La Albuera (BA), 3 el 18/04/13 (A. García, A. Núñez) y hasta 6 del 10 al 27/08/13 (F. Montaña, J. Vázquez, J. A. Román, J. C. Paniagua y otros).

- **Año 2014.** Uno en El Batán (CC) el 03/02/14 (S. Mayordomo). En Riolobos (CC) uno el 10/01/14 (J. Prieta) y el 18/05/14 (E. Palacios, S. Mayordomo). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 05/09/14 (R. Montero). En Arrocampo (CC), **5-22** del 21/03/14 al 04/04/14 (J. Briz, E. Palacios, S. Mayordomo) y uno del 26 al 30/09/14 (J. Muddeman, J. Porras). Uno en Cerro Alto, Saucedilla (CC), el 26/09/14 (M. Kelsey).

Uno en la charca del Lugar, Malpartida de Cáceres (CC), el 12 y 16/01/14 (F. J. Caballero, M. Iglesias). Uno en Campo Lugar (CC), el 01/01/14 (A. Calvo). En Madrigalejo (CC), 3-11 del 27/03/14 al 10/04/14 (H. Zweers, M. Kelsey, A. Ceballos, J. Muddeman y otros), 5 el 22/06/14 (N. Renwick) y 4 el 30/11/14 (J. C. López, M. Pujol). Uno en Moheda Alta (BA) el 07 y 28/03/14 (M. Kelsey). 4 en El Torviscal (BA) el 23/01/14 (J. P. Prieto). Azud de Badajoz (BA), 25 el 14/09/14, 43 el 25/10/14 (J. C. Paniagua y L. R. Hernández) y 42 el 02/12/14 (E. Costillo). Arrozales de Gévora (BA), 42-68 del 23/05/14 al 01/06/14 (A. Fernández) y 3-10 del 13 al 20/12/14 (F. Mendoza y J. C. Paniagua). En Mérida (BA), 1-2 del 02 al 23/05/14 (Á. T. Mejías, A. Rodríguez, J. M. Benítez). En Esparragalejo (BA), 1-3 del 16/05/14 al 04/06/14 (S. Molano, F. Macías, J. L. Bautista). 2 en Lagunas de Torremejía (BA) el 15 y 16/04/14 (F. Bernáldez, F. Macías, L. Alcántara y otros). Uno en La Codosera (BA) el 17/06/14 (F. Camello). En La Albuera (BA) 3-6 del 29/06/14 al 19/08/14 (J. C. Paniagua, F. Montaña, E. del Viejo, J. Mazón y otros). 6 en Los Canchales (BA) el 12/08/14 (F. Montaña, J. Vázquez). Uno en Valuengo (BA) el 20/05/14 (F. Montaña, J. Vázquez, A. Núñez). En Brovales (BA), uno el 23/09/14 y el 20/10/14 (F. Montaña, A. Núñez).

Ibis sagrado (*Threskiornis aethiopicus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad o de poblaciones naturalizadas en Francia. Diez registros en 2004, 2007, 2008, 2012 y 2013. Entre mayo y septiembre, excepto uno en diciembre. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Registros previos.** Dos en Casar de Cáceres en mayo 2004 (A. Maestre, A. Toboso); pareja en Los Arenales, Cáceres, el 7/07/04 y uno en Los Barruecos el 22/08/04 (M. Cardalliaguet). Dos en el vertedero de Villanueva de la Serena el 20/12/07 (J. M. Traverso, J. Porras); uno en Sierra Brava el 01/05/08 (F. García Calle) y uno el 8/09/08 en Corral Alto, Zorita (D. Jiménez).
- **Nuevos registros.** Uno en el embalse de Montijo, Mérida (BA), los días 14/06/12 (G. Pizarro, A. García), 17/06/12 (J. Solana), 18/07/12, 19/07/12, 02/08/12 (S. Pérez) y 19/08/12 (J. Solana). Uno en Arrocampo (CC) los días 04/04/13 (C. Clemente, M. de Gabriel, S. Briones), 05/04/13 (I. Gallardo, M. García del Rey, M. Kelsey, S. Mayordomo, S. Fletcher), 02/05/13 (V. Risco) y 20/05/13 (Ó. Llama). Uno en vuelo sobre Montehermoso (CC) el 24/06/13 (J. Mahillo). Uno en la charca del Guijo, Valverde de Mérida (BA), el 13/07/13 (F. Crystal).

Ibis eremita (*Geronticus eremita*)

Estatus regional. Extinguida en tiempos históricos (presente al menos hasta el siglo XVI en la provincia de Badajoz). Dos registros recientes: un subadulto 10 meses en Trujillo en 2004-2005, posiblemente procedente de cautividad, y un juvenil en La Granja en 207-2008, procedente del programa de introducción en Cádiz.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Un 2º año entre diciembre de 2004 y el 29/09/05 en Trujillo (F. J. Pizarro, M. Rouco, J. Briz, J. Muddeman y otros). Un juvenil procedente de la reintroducción en Cádiz desde diciembre de 2007 al 19/02/08 en La Granja y valle del Ambroz (C. J. Palacios, J. Montero).

Espátula común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial. Reproductora muy escasa (38-76 parejas, 2009-2014) y reciente (primer caso en 2000). Migrante común, especialmente en paso postnupcial (>1.500 ejemplares). Invernante muy escasa (8-51 ejemplares, 2009-2013). Tendencia positiva en todas las épocas. Subespecie *P.l.leucorodia*.

Criterio. Reproducción, invernada (diciembre), cifras destacadas (>25) y fenología.

- Reproducción. En el periodo 2009-2014 los datos conocidos de reproducción se resumen del siguiente modo: 4 colonias y 38 parejas en 2009, 4 colonias y 50 parejas en 2010, 8 colonias y 74 parejas en 2011, 6 colonias y 49 parejas en 2012, 4 colonias y 56 parejas en 2013 y 6 colonias y 76 parejas en 2014, que es el máximo conocido. En total, entre la primera ocupación conocida en el año 2000 y el año 2014 ha criado en un total de 19 localidades, destacando dos colonias del valle del Tiétar (máximos de 35 y 23 parejas), el embalse de Montijo (máximo 25 parejas) y el embalse de Alqueva (máximo 10 parejas). El resto de localidades nunca han superado las 4 parejas reproductoras. Tendencia al aumento.
- Censos en diciembre 2009-2013. El censo nacional de espátula invernante es promovido anualmente por GRUSEC. Para el periodo 2009-2014 los resultados en Extremadura son los siguientes: 8 aves en 2 localidades en 2009, 32 en 3 localidades en 2010, 28 en 6 sitios en 2011, 26 en 9 lugares en 2012 y 51 ejemplares en 12 localidades en 2013. En diciembre de 2014 no se realizó el censo. Las cifras de 2013 son las mayores obtenidas hasta la fecha, siendo el censo con más localidades visitadas. Las principales localidades son los humedales al oeste de Cáceres capital (Arenales, Lancho) y el embalse de Los Canchales, aunque hay observaciones en más de 15 localidades a las que parece presentar poca fidelidad.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta especie y el mes de enero está considerado como fecha de migración prenupcial. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife (2009-2014) se vieron 6 en 2009, cero en 2010 y 2011, 5 en 2012, 25 en 2013 y 51 en 2014 en 3-11 localidades cada año.
- **Invernada**

2008-2009. Portaje (CC), 2 el 09/01/09; Galisteo (CC), una el 04/01/09; Charco Salado (CC), 3 el 16/01/09 (S. Mayordomo). Lancho (CC), 3 el 17/01/09 (F. Carrero, R. Parra).

2009-2010. Portaje (CC), una el 06/11/09 (J. Prieta). Lancho (CC), 10 el 11/11/09 y 6 el 09/12/09 (R. Parra). laguna de Galisteo (CC), una del 06/01/10 al 14/02/10 (J. Prieta, R. Guzmán, S. Mayordomo).

2010-2011. Los Arenales (CC), **19** el 9/01/11 (F. J. Caballero).

2011-2012. 8 localidades. laguna de Galisteo (CC), una el 28/12/11 (J. Prieta). Valdefuentes, Galisteo (CC), una el 24/12/11 (C. Clemente, J. Mahillo). Talaván (CC), 3 el 29/11/11 (R. Montero). Sotillo, Monroy (CC), una el 02/12/11 (S. Mayordomo). Lancho (CC), 12 el 28/11/11 y 6 el 23/12/11 (R. Parra). Los Arenales (CC), 4-7 del 17 al 23/12/11 (A. Cebrián, C. Fernández). La Albuera (BA), **11** el 03 y 18/12/11 (J. C. Paniagua). Los Canchales (BA), 3 el 19/11/11 y 2 el 17/12/11 (E. del Viejo).

2013-2014. 14 localidades. Portaje (CC), una el 20/12/13 (R. Granados). laguna de Galisteo (CC), 2 el 13/01/14 (S. Mayordomo). Vega del Haza, Malpartida Plasencia (CC), una del 09 al 22/12/13 (R. Sancho, E. Palacios). Arroyo Valhondo, Cáceres, una el 08/12/13 (P. Ramiro). Embalse del Tozo (CC), una el 14 y 17/12/13 (J. Porras). Sierra Brava, Zorita (CC), una el 19/12/13 (J. Porras). Los Canchales (BA), 3-37 del 11/11/13 al 13/01/14, con máximo de **37** el 21/12/13 (E. Costillo, E. del Viejo, F. Lopo, J. L. Bautista, M. Gálvez y otros). Morantes (BA), 20 el 22/12/13 (T. Álvarez). Alange (BA), una el 14/01/14 (J. Guerra). Aljucén (BA), una el 22/12/13 (F. Lopo). La Pizarrilla, Villanueva del Fresno (BA), 14 el 15/12/13 (A. Pérez del Barco). Brovales (BA), 1-2 del 28/11/13 al 23/12/13 (S. Mayordomo, F. Montaña). Villalba de los Barros (BA), una el 12/12/13 (H. Gómez-Tejedor). Embalse del Moral (BA), 2 el 17/01/14 (F. Montaña).

2014-2015. 6 localidades. El Batán (CC), una el 06/12/14 (R. Montero). Los Canchales (BA) 1-2 del 12 al 22/12/14 (M. Gálvez, J. Guerra, J. L. Bautista y otros). Morante (BA), una el 19/12/14 (J. L. Bautista). Torremejía (BA), **13** el 28/12/14 (J. Guerra). Alcollarín (CC), 5 el 28/12/14 (A. Mendoza, J. P. Prieto). La Roca de la Sierra (BA), 10 el 29/12/14 (F. Lopo).

- **Migración, cifras destacadas.**

Año 2009. Los Arenales (CC), 20 el 27/07/09 (J. L. Valiña). Lancho (CC), **60** el 04/08/09 (C. Fernández). Molano, Arroyo de la Luz (CC), 23 el 13/09/09 Embalse del Salor (CC), 21 el 13/09/09 (C. Fernández). Los Canchales (BA), **50** el 07/09/09 (J. L. Valiña).

Año 2010. Charco Salado (CC), **32-78** del 19/07/10 al 06/09/1 con máximo el 18/08/10 (S. Mayordomo, M. García del Rey, E. Palacios). Lancho (CC), 33 el 22/08/10 (C. Fernández). Embalse del Salor (CC), 38 el 04/09/10 (J. Jaén). Los Canchales (BA), 60 el 08/09/10 (F. Yuste) y **100** el 26/09/10 (Á. Sánchez).

Año 2011. Portaje (CC), 33 el 11/08/11 y 30 el 02/09/11 (S. Mayordomo). Charco Salado (CC), **30-113** del 21/07/11 al 08/09/11 con máximo el 20/08/11 (E. Palacios, S. Mayordomo, C. Clemente, J. Mahillo y otros). Lancho (CC), **37-80** del 18/08/11 al 06/10/11 con máximo el 11/09/11 (C. Fernández, S. Mayordomo, R. Parra). Los Canchales (BA), **60-86** del 21/07/11 al 24/09/11 con máximo el 05/09/11 (F. Lopo, A. Núñez, S. Mayordomo y otros). La Albuera (BA), **44** el 15/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). Talaván (CC), **42** el 16/09/11 (S. Mayordomo).

Año 2012. Portaje (CC), 24 el 23/08/12 (S. Mayordomo). Charco Salado (CC), 30-35 del 15/07/12 al 08/08/12 con máximo el 23/07/12 (S. Mayordomo). Lancho (CC), **42** el 03/09/12 (S. Molano). Los Canchales (BA), 25 el 26/02/12, 47 el 30/03/12 (J. L. Bautista), **76-150** del 12/08/12 al 30/09/12 con máximo el 15/09/12 (E. del Viejo, S. Mayordomo, C. Clemente, F. Lopo y otros). Morantes (BA) **40-45** del 17 al 30/03/12 (P. Herrador, J. L. Bautista, I. Jerez). Valuengo (BA), 23 el 17/08/12 (S. Pérez). Villalba de los Barros (BA) 38 el 29/07/12 (J. E. Rodríguez) y **51** el 30/09/12 (J. A. Román).

Año 2013. Portaje (CC), 20-34 del 19/07/13 al 18/10/13 con máximo el 04/10/13 (S. Mayordomo, J. Prieta). laguna de Galisteo (CC), **20-50** del 02 al 06/10/13 con máximo el 06/10/13 (J. Prieta, R. Montero, A. Pacheco).

Charco Salado (CC), **52-63** del 16 al 26/07/13 (J. Briz, S. Mayordomo, V. Risco). Azud de Badajoz, 33 en vuelo el 19/10/13 (SEO-Badajoz). Los Canchales (BA), **20-83** del 21/07/13 al 12/10/13 con máximo el el 31/08/13 (C. Clemente, S. Mayordomo, J. Guerra, M. Gálvez, A. Núñez, J. Solana y otros). La Albuera (BA), **20-109** del 25/08/13 al 25/09/13 con máximo el 13/09/13 (F. Bernáldez, F. Macías, J. C. Paniagua, J. A. Román y otros). Valuengo (BA), 20-30 del 28/08/13 al 02/09/13 (J. A. Román, J. Guerra, M. Gálvez). Brovales (BA), 27 el 11/10/13 (G. González).

Año 2014. Charco Salado (CC), **25-56** del 12/07/14 al 15/08/14 con máximo el 07/08/14 (J. Briz, V. Risco, S. Mayordomo). Valdecañas (CC) **46** el 08/08/14 (S. Mayordomo) y **27** el 21/09/14 (J. Briz y V. Risco). Arrocampo (CC), **55** el 15/08/14 (J. Briz y V. Risco). Gabriel y Galán (CC), **60** el 03/09/14 (J. Montero). Lancho (CC), **46** el 20 y 24/07/14 (S. Molano). Embalse del Salor (CC), **38** el 07/08/14 (C-J. Palacios) y **60** el 06/09/14 (J. Arias). Alcollarín (CC), **28-75** del 20/07/14 al 21/09/14 con máximo el 07/09/14 (M. Kelsey, S. Mayordomo, W. Haworth y otros). Los Canchales (BA), **21-168** del 07/08/14 al 27/10/14 con máximo el 15/09/14 (J. A. Román, V. de Alba, J. L. Bautista, A. Núñez, J. Guerra, F. Montaña y otros). La Albuera (BA) **53** el 16/06/14 (J. A. Román) y **37** el 22/06/14 (J. M. Álvarez). Morante (BA), **52** el 11/09/14 (J. L. Bautista). Valungo (BA), **51** el 14/09/14 (V. de Alba y A. Núñez). Esparragalejo (BA) **23** el 15/09/14 (C. González) y **32** el 24/09/14 (J. A. Román). Brovales (BA), **40-62** del 21 al 23/09/14 (F. Montaña). Los Arenales (CC), **70** el 25/09/14 (J. Gutiérrez del Sol).

Flamenco común (*Phoenicopterus roseus*)

Estatus regional. Escasa, irregular y con movimientos erráticos. Más numerosa durante la dispersión postnupcial, entre agosto y octubre. Citas anuales en 2011-2014 con mayoría en la cuenca del Guadiana. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2011. 8 localidades. La Albuera (BA), **11** el 9/02/11 (J. M. Álvarez) y **4** el 11/02/11 (A. Núñez y L. Sanabria). Arrocampo (CC), un adulto el 23/08/11 (J. Prieta). Valdecañas (CC), un joven el 08/09/11 (E. Palacios, S. Mayordomo). Los Canchales (BA), **2** el 09/09/11 (E. del Viejo), **3** el 24/09/11 (Á. Sánchez, D. Rivera y J. Fernández) y uno el 9/10/11 y el 19/11/11 (A. Cangas, E. del Viejo). Torrealba (CC), **1-3** del 26/09/11 al 05/10/11 (S. Mayordomo, A. Maestre, J. J. Espinigoitia, J. P. Prieto). Sierra de Fuentes (CC), **2** el 01/10/11 (A. Maestre, J. J. Espinigoitia). Lancho (CC), **4** el 06/10/11 (R. Parra). Robledillo de Trujillo (CC), uno el 08/10/11 (S. Fletcher).
- Año 2012. 5 localidades. Embalse de Villalba de los Barros (BA), **15** el 28 y 29/07/12 y un inmaduro el 30 y 31/07/12 (V. de Alba, A. Núñez, J. Elías). Valdecañas (CC), **2** el 01/09/12 (S. Mayordomo). Embalse del Salor (CC), **8** el 08/09/12 (C. Fernández). Arrozales de Gargáligas (BA), **13** el 14/10/12 (V. de Alba, M. J. Salguero, A. Núñez). Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), un joven el 12/11/12 (A. Calvo).
- Año 2013. 10 localidades. Carcaboso (CC), uno volando con grullas el 24/02/13 (S.Z.E.). Santa Amalia (BA), **24** el 17/03/13 (F. Yuste e I.

Outón) y un joven el 29/11/13 (F. Yuste) y el 06/12/13 (J. P. Prieto y R. Serra). Embalse de Villalba de los Barros (BA), **21** el 05/04/13 (J. M. Álvarez). Azud de Badajoz (BA), **24** el 06/04/13 (J. C. Paniagua). La Lapa (BA), **28** en vuelo el 08/04/13 (J. Vázquez). Valdecañas (CC), un adulto el 26/07/13 y el 01/08/13 (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo). La Albuera (BA), entre 9 y **56** desde el 05/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez) hasta el 23/10/13; el grupo pierde progresivamente efectivos hasta quedar 4 jóvenes el 23/10 (Á. T. Mejías, C. González, E. del Viejo, F. Montaña, J. A. Román, J. C. Paniagua, J. C. Salgado y otros). Valdelagrana, Badajoz (BA), 9 el 13/09/13 (Á. L. Sánchez y C. González). Embalse de Morante, Badajoz, un joven los días 06 y 11/10/13 (F. Lopo, J. L. Bautista) y 2 jóvenes los días 17 y 18/10/13 (J. L. Bautista, P. Herrador). Los Canchales (BA), uno el 12/10/13 (A. Cangas, E. del Viejo, J. G. Aparicio, J. Guerra, L. Gómez, M. Gálvez).

- Año 2014. 5 localidades. La Albuera (BA), **14** el 24/02/14 (A. Vega) y **22** del 03 al 13/03/14 (A. Cama, J. Cuesta, M. Gálvez, J. Guerra, M. Kelsey, A. Núñez, M. Pauly, J. A. Román). Granja de Torrehermosa (BA), 6 en la laguna del Hueco el 12 y 26/04/14 y 8 todo abril en la laguna de Tres Perrillas (M. Corvillo). Lagunas de Torremejía (BA), **13** desde el 15 al 29/04/14 (F. Bernáldez, F. Macías, M. Gálvez, P. Goñi, J. L. Guisado, L. Alcántara, C. Climent, S. Díaz-Infantes, M. Gálvez, J. Guerra, M. Oro, C. González). Los Canchales (BA), 10 el 05/09/14 (J. L. Bautista, I. Jerez). Moheda Alta (BA), 7 el 19/09/14 (W. Haworth), **18** el 20/10/14 (J. Porras) y uno el 22/10/14 (J. A. Barquero).

Abejero europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus regional. Reproductor estival muy escaso (43-75 parejas; el 2'3% de España) con tendencia desconocida. Monotípica.

Criterio. Observaciones de cría fuera del Sistema Central y fenología.

- Población reproductora. En 2009-2010 tuvo lugar un sondeo nacional de siete rapaces diurnas forestales (Palomino y Valls, 2011), entre ellas el abejero europeo. La población estimada es de 43 territorios (rango 29-58), 36 en Cáceres y 8 en Badajoz, que supone el 2'3% del total español (1.850 territorios). La densidad media fue de 0'10 territorios/100 km², por debajo de la media nacional (0'37) y siendo más alta en Cáceres (0'18) que en Badajoz (0'04). En Extremadura presenta al menos cinco núcleos. El principal se sitúa en Gredos cacereño (La Vera y Valles del Jerte y Ambroz), extendiéndose por el oeste hacia Tierras de Granadilla y valle del Alagón. El segundo núcleo ocupa la sierra de Gata y el tercero Las Villuercas. En Badajoz hay dos pequeños núcleos

recientemente descubiertos, uno en Cijara y otro en Tentudía. La mayoría de la población extremeña se instala en robledales, aunque en zonas marginales hay territorios en alcornoques y pinares (Cijara). Por el método de oteaderos sólo se detectó en Extremadura en 10 cuadrículas, pero fue especialmente frecuente en los valles del Jerte y el Ambroz, comarcas con la mayor probabilidad de observación en España, donde se alcanzan localmente densidades de 9 territorios/100 km². Los transectos en vehículo fueron poco efectivos. En Extremadura se vieron de media tan sólo 4 abejeros cada 1.000 km, aunque localmente se observaron 3 aves/100 km en el valle del Jerte. La tendencia en Extremadura es desconocida, aunque para el conjunto de España se considera en “posible aumento”. Los autores señalan que los resultados son inferiores a estimas previas y deben considerarse como valores mínimos. En Extremadura hay estimas previas de 75 parejas. Es probable que la población real supere el valor de 43 territorios, pues sólo en el Valle del Jerte se localizaron 25 territorios posibles y 12 más en áreas vecinas (J. Prieta, datos propios).

- Llegadas. Año 2009. Uno en Navalmoral de la Mata (CC) el 05/04/09 (J. Briz). 2 en Villanueva de la Vera (CC) el 08/04/09 (D. Langlois y S. Langlois). Año 2010. Uno el 02/05/10 en Plasencia (J. Torfs y M. Viskens). Uno en Ahigal el 06/05/09 (J. Briz, R. Montero y V. Risco). Año 2011. 2 en Grimaldo (CC) el 16/04/11 (R. Guzmán). 3 en Casatejada (CC) el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz, S. Mayordomo). Año 2012. Uno en Santibáñez el Alto (CC) el 09/04/12 (G. Naharro). El 15/04/12, uno en El Torviscal (BA) (L. Lozano, L. Alcántara, J. M. García, F. Lopo, F. Castro y B. Maldonado) y otro en Casas del Castañar (CC) (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez, E. Palacios). Año 2013. Uno en Monfragüe (CC) el 30/04/13 (J. F. Sánchez). Uno en Montehermoso (CC) el 03/05 (J. Mahillo). Año 2014. Uno en Casas del Castañar (CC) el 08/04/14 (J. Prieta) y 2 el 19/04/14 (J. F. Sánchez). Uno en Villalba de los Barros (BA) el 17/04/14 (J. M. Álvarez y F. Montaña).
- Últimos registros. Uno en Gata (CC) el 12/09/10 (F. Buénaga, J. Prieta). Uno en Guijo de Coria (CC) el 10/09/11 (S. Mayordomo). Uno en Monfragüe (CC) el 23/09/11 (M. Kelsey). 2 en Campo Lugar (CC) el 15/09/13 (A. Calvo). Uno en Riomalo de Abajo (CC) el 27/09/13 (A. Pacheco). Uno en Hornachos (BA) el 05/10/13 (D. Huerta, J. Guerra, M. Gálvez, M. Martínez). Uno en Baños de Montemayor (CC) el 20/09/14 (M. Á. Muñoz, E. Palacios). Un joven en Badajoz el 20/10/14 (J. Mazón). Uno en Cornalvo (BA) el 24/10/14 (F. Macías).

Elanio común (*Elanus caeruleus*)

Estatus regional. Residente escaso (200-250 parejas en 2003, 35-50% de España), sujeto a fluctuaciones y con tendencia desconocida. Subespecie *E.c.caeruleus*.

Criterio. Reproducción, observaciones donde la especie es escasa.

- Revisión. Primera reproducción confirmada en 1963 en Portugal y en 1975 en Extremadura. Único censo regional en 2003, con 199 parejas localizadas y 250 estimadas; el 60% en las Vegas del Guadiana (24% en el término municipal de Badajoz). La Junta de Extremadura controla anualmente 10 dormideros invernales, con 22 ejemplares de media, máximo de 120, y un declive conjunto de -18% en 2011-2014. En el programa SACRE se observan 4-15 por año y no es posible establecer tendencias. Durante el censo de milano real se vieron 23 elanios en 4.073 km recorridos en vehículo (5'6 cada mil km), 15 en Badajoz (7'8 por 1000 km) y 8 en Cáceres (3'7 por 1000 km) (Cardalliaguet *et al.*, 2014).
- Registros de interés. Uno en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 06/02/10 (S. Villa). Uno en Las Cansinas, Monfragüe (CC), el 04/06/12 (E. Garzón). Dormidero con 15 ejemplares en La Albuera (BA) el 05/08/14 (J. Antolín, A. García, F. Martínez y Á. Sánchez).

Milano negro (*Milvus migrans*)

Estatus regional. Reproductor estival común (3.000 parejas en 2005, 30% de España) con importante presencia de no reproductores (5.000 en 2005). Tendencia muy positiva. Invernada muy escasa. Subespecie *M.m.migrans*.

Criterio. Fechas extremas, colonias y cifras destacadas (>100).

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,4% y un aumento poblacional de +128% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Invernada. 2008-2009. Uno en Fresnedoso (CC) el 08 y 11/01/09 (J. Briz, V. Risco, C. González). 2009-2010. Uno en Monfragüe (CC) el 13/11/09 (S. Villa). Uno en Madrigalejo (CC) el 17/12/09 (J. M. Tapia y M. Jiménez). Uno en Corte de Peleas (BA) el 19/12/09 (G. Schreur). 2010-2011. 2 en Navalmoral de la Mata (CC) el 01/11/10 (J. Briz, M. García del Rey, V. Risco). Un joven en Cáceres el 10/11/10 (M. Kelsey). Uno en el vertedero de Mérida (BA) el 03/12/10 (Á. Sánchez). Uno en vertedero de Mirabel (CC) el 15/12/10 (J. Prieta, S. Mayordomo). 2011-2012. Uno en Gargáligas (BA) el 03/12/11 (L. Alcántara). El 19/12/11, 2 en Mérida (BA) (Á. Sánchez) y uno en Oliva de Plasencia (CC) (S. Mayordomo).

2012-2013. 2 en el vertedero de Badajoz el 10/11/12 (J. C. Paniagua). Uno en Casatejada (CC) el 14/11/12 (I. Gallardo). Uno en Badajoz el 27/12/11 (G. Silva, J. C. Paniagua). 2 en Badajoz el 30/12/12 (J. Guerra). Uno en Almendralejo (BA) el 15/01/13 (J. C. Salgado). Uno en Alía (CC) el 21/01/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera, J. P. Jiménez). 2013-2014. Uno en Valencia de las Torres (BA) el 01/11/13 (M. Oro, M. S. Díaz, M. Gálvez). Uno en Guadiana del Caudillo (BA) el 22/12/13 (P. Herrador). 4 en el vertedero de Villanueva de la Serena (BA) el 05/01/14 y 3 el 12/01/14 (J. M. Traverso). Uno en Santa Amalia (BA) el 16/01/14 (A. M. Mendoza). Uno en Navalvillar de Pela (BA) el 21/01/14 (J. A. Barquero). 2014-2015. Uno en Cáceres el 04/11/14 (A. Pacheco). Uno en Santa Marta de los Barros (BA) el 04/11/14 y uno en Zafra (BA) el 11/11/14 y el 12/11/14 (F. Montaña). Uno en Sierra de Fuentes (CC) el 15/11/14 (S. Molano). Uno en Malpartida de Plasencia (CC) el 06/12/14 y el 07/12/14 (J. Gayo).

- Concentraciones. 400 en el vertedero de Mirabel (CC) el 03/03/10 (J. Prieta). 250 en paso por Monesterio (BA) el 12/03/10 (A. Pacheco). Dormidero en Mérida (BA): 110 el 07/03/11 (J. Solana) y 350 el 08/03/11 (Á. Sánchez). 200 en Monfragüe (CC) el 22/07/12 (J. Prieta).
- Llegadas. Uno en Cáceres el 15/02/09 (J. M. Brías, C. Fernández) y el 22/02/09 (S. Mayordomo). Uno en Valdeíñigos (CC) el 02/02/10 (M. García del Rey). Uno en Valdesalor (CC) el 29/01/11 (C. Fernández). Uno en Plasencia (CC) el 10/02/11 (M. Á. Muñoz). Uno en Cáceres el 16/02/11 (F. Carrero). Uno en Valdesalor (CC) el 22/02/12 (M. Iglesias), en Monfragüe (CC) el 24/02/12 (M. Kelsey) y en Galisteo (CC) el 25/02/12 (S. Mayordomo). Uno en Plasencia (CC) el 02/02/13 (M. Á. Muñoz). Uno en La Pesga (CC) el 06/02/13 (J. Muddeman). Uno en La Albuera (BA) el 28/02/13 (J. Guerra, M. Gálvez). Uno en Valverde de Mérida (BA) el 13/02/14 (M. Gálvez). Uno en Cáceres el 14/02/14 (J. L. Bautista). Uno en Plasencia el 15/02/14 (S. Mayordomo, E. Palacios).
- Últimos registros. Uno en Galisteo (CC) el 28/10/09 (S. Mayordomo). Uno el 09/09/10 en Trujillo (CC) (M. Kelsey). Uno en Torreorgaz el 21/09/10 (S. Mayordomo). 2 en el embalse del Salor (CC) el 25/09/11 (C. Fernández). Uno en Riobobos (CC) el 01/09/12 (J. Prieta). Un juvenil en Monfragüe el 11/09/12 (M. García del Rey). Uno en Casatejada (CC) el 13/10/13 (Ó. Llama). Uno en Mérida el 15/09/14 (C. González). Uno en Malpartida de Plasencia (CC) el 21/09/14 (J. Gutiérrez). Uno en Cáceres el 29/09/14 (J. L. Bautista). Uno en Herrera de Alcántara (CC) el 07/10/14 (A. Galán). Uno en Magasca (CC) el 27/10/14 (M. Kelsey).

Milano real (*Milvus milvus*)

Estatus regional. Residente escaso (175-221 parejas en 2014, el 10% de España), con tendencia decreciente (-71%, 1994-2014). Invernante común (8.100 ejemplares en 2014) con tendencia negativa a largo plazo (-30%, 1994-2014) y positiva a corto plazo (+21%, 2005-2014). En época de cría el 25-30% son no reproductores. Subespecie *M.m.milvus*.

Criterio. Reproducción, concentraciones (>100), observaciones donde la especie es escasa.

- **Población reproductora.** En 2014 se realizó el tercer censo nacional. En Extremadura el seguimiento más completo fue mediante el método de recorridos en vehículo (7.013 km en 221 cuadrículas por gran parte de Cáceres y norte, suroeste y sierras centrales de Badajoz). Se observaron 77 milanos reales (1,09 aves/100 km) y se estimaron, sumando por comarcas, 221 parejas reproductoras y 175 parejas cuando el cálculo se hace a escala regional. Con el 10% del total español, Extremadura es la tercera región tras Castilla y León y Navarra. En 2013 y 2014 la Junta de Extremadura localizó 53 territorios en 24 cuadrículas, donde se hizo el seguimiento de 19 y 21 nidos, volando 32 y 24 pollos en 2013 y 2014. Asimismo, se hizo una solicitud de cualquier observación efectuada entre abril y junio de 2014; recibiendo 407 registros en 132 cuadrículas (95 de Cáceres y 37 de Badajoz); el 88% hacía referencia a un ejemplar, el 10% a parejas y el 2% a grupos de 3-4 aves; en 197 ejemplares se determinó la edad, siendo adultos el 94%, lo que sugiere que la mayoría podrían ser ejemplares reproductores. En 2014 el milano real se distribuye por casi todo Cáceres, a excepción del sureste, siendo en Badajoz el área más reducida, con mayor presencia en la mitad oeste y sin contactos en el cuadrante sureste. En relación a 1994 el área de ocupación se mantiene en Cáceres, aunque con mucha menor densidad, pero se reduce en Badajoz, donde desaparece en varias comarcas. Comparando los resultados de recorridos en vehículo en los tres censos en Extremadura, la tendencia muestra un declive continuado, muy marcado entre 1994 y 2005 y menos acentuado entre 2005 y 2014. Las cifras obtenidas en 1994 fueron de 650-910 parejas (media 780), en 2005 de 250-314 (media 282) y de 221 parejas en 2014. Si se tienen en cuenta los valores medios la pérdida de población en 2014 es del 71% respecto a 1994 (rango 66-75%), del 21% respecto a 2005 (rango 12-30%) y del 63% entre 1994 y 2005.
- **Población invernante, 2013-2014.** En Extremadura se llevaron a cabo dos métodos: recorridos en vehículo (4.103 km en 116 cuadrículas) y censo de dormideros. Las áreas con mejor cobertura fueron la mitad norte de Cáceres y el noreste y suroeste de Badajoz. En total se observaron 1.102

aves sin considerar concentraciones, es decir 26'9 aves/100 km y una densidad de 0,263 aves/km². De acuerdo a esta metodología, la estima para Extremadura asciende a 8.061. En cuanto a los dormideros, se hizo una revisión de los emplazamientos ocupados entre 2004 y 2013, localizándose unos cien lugares. A continuación estaba previsto un censo conjunto entre SEO/BirdLife y el Gobierno de Extremadura que finalmente no fue posible. El Gobierno extremeño efectuó un censo del 10 al 20 de enero, contando 5.243 aves en 45 dormideros (Caldera *et al.* 2014). Datos de SEO/BirdLife amplían el número de dormideros a 54 y el cómputo conjunto suma 6.636 individuos, aunque la cobertura no fue completa, pues a posteriori se encontraron varios más y hay áreas extensas con invernantes sin dormideros conocidos. A ello habría que sumar las aves reproductoras, unas 400, que no utilizan dormideros. Al igual que en 1994 y 2005, en 2014 el milano real se distribuye por todo el territorio extremeño. Las zonas de mayor densidad se sitúan en la cuenca del Alagón y en el sur y suroeste de Badajoz. Tienen una importancia intermedia la cuenca del Tiétar, los llanos de Trujillo y Cáceres y el noreste y centro-sur de Badajoz. El Sistema Central y Este de Cáceres son las zonas de menor importancia. De acuerdo a los recorridos en vehículo la tendencia es estable en Cáceres y de aumento en Badajoz entre 2005 y 2014, aunque sin recuperarse del fuerte declive sufrido entre 1994 y 2005. La población extremeña es en enero de 2014 un 25-30% inferior a la de 1994 (10.983-12.683 individuos; 11.800 de media; 3.000-3.500 aves menos) y un 21-27% mayor que la de 2005 (6.336-6.485; media 6.400; 1.400-1.700 aves más).

- Dormideros. Más de 35 en Acebo (CC) el 22/11/09 (S. Mayordomo). 500 en Monesterio (BA) el 07/02/10 (A. Pacheco). 150 en Riobobos (CC) el 19/12/10 (C. Clemente y J. Mahillo). 400 en Monesterio (BA) el 8/01/12 (A. Pacheco).

Pigargo europeo (*Haliaeetus albicilla*)

Estatus regional. Accidental. Tres registros en noviembre de 2012, diciembre 2012-enero 2013 y mayo de 2013.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primeros registros para Extremadura. Registro seguro de un ejemplar de 1º invierno en el embalse de Talaván (CC) los días 06/12/12, 07/12/12 (J. Gutiérrez) y 09/12/12 (J. Gutiérrez, J. Cuesta, E. Álvarez). Se ve de nuevo en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 24/12/12 (J. L. Rivero), en Torrejón el Rubio (CC) el 27/12/12 (L. J.

González) y en Monroy (CC) el 08/01/13 (A. Saunders). Dos citas sin fotografías: uno a principio de noviembre de 2012 en Llera (BA) (Agentes del Medio Natural, com. por A. Macarro) y otro en Alía (CC) el 04/05/13 (J. Á. Herrera y N. Baeza).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus regional. Extinguido como reproductor a mediados del siglo XX. 15 citas hasta 2008. A partir de 2007 es regular la llegada de aves en dispersión en muy bajo número, sobre todo inmaduros procedentes de la reintroducción en Andalucía. Subespecie *G.b.barbatus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Revisión.** Reproductor extinguido en la primera mitad del siglo XX. Hasta entonces estuvo distribuido en los principales sistemas montañosos. Antes de 2007 se citaron aves de presunta procedencia pirenaica (15 registros hasta 2008) En 2006 se inician las liberaciones en el proyecto de reintroducción en Cazorla (Andalucía) y su seguimiento remoto demuestra que alcanzan Extremadura. Entre 2007 y 2010 llegaron 3 aves brevemente. A partir de 2011 la presencia es regular y prolongada y se han constatado al menos 12 ejemplares que pueden permanecer entre unas horas y varios meses. La principal área de asentamiento es el Sistema Central (Gredos y en menor medida Las Hurdes y Gata), seguida por el noreste de Badajoz. Otras áreas con datos son Villuercas, riberos del Tajo-Monfragüe, sierras centrales de Badajoz y Sierra Morena, aunque es posible su aparición en cualquier lugar.
- **Nuevos registros.** 2 entre Gredos y Monfragüe (CC) el 02/09/11; se indica que crió en Gredos en 1977, siendo el pollo expoliado por niños que intentaron criarlo en cautividad sin éxito, pues el pollo murió (Anónimo). Un inmaduro en Los Hoyicios, Guadalupe (CC), el 31/05/12 (P. Chamorro). Un inmaduro cerca de Puerto Peña, Talarrubias (BA), el 16/05/13 (C. de Mera y G. Romero). Un inmaduro en Lobón (BA) el 19/08/13 (M. J. García-Baquero). En el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), un joven con decoloraciones (Nerpio) el 02/05/14 (J. Arias y J. Muddeman) y otro sin decoloraciones el 04/05/14 (S. Mayordomo y E. Palacios), este se ve también en Serradilla (CC) (C. Clemente, A. Gómez y Á. Sánchez). Un joven en Sierra de Fuentes (CC) el 25/05/14 (J. M. Benítez). 2 en Losar de la Vera (CC) el 06/06/14 (N. Hornero). Uno en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 09/06/14 (P. Martín). Uno en Losar de la Vera (CC) el 28/07/14 (A. Pablos).

Alimoche común (*Neophron percnopterus*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (153-165 parejas en 2009-2014, 11% de España) con tendencia estable. Invernada escasa y localizada (7-75 ejemplares en 2009-2015) con tendencia al aumento. Subespecie *N.p.percnopterus*.

Criterio. Invernada, fenología y observaciones de interés.

- Población reproductora, 2009-2014. Los resultados publicados por la Junta de Extremadura son de 157 parejas y 85 pollos volados (2009), 153 parejas y 97 pollos (2010), 165 parejas y 106 pollos (2011), 159 parejas y 108 pollos (2012), 165 parejas y 117 pollos (2013) y 153 parejas y 113 pollos (2014). La población ha oscilado entre 153 y 165 parejas censadas, con altibajos posiblemente debidos a la diferente cobertura, y por debajo del máximo de 179 parejas en 2008. La tendencia en el periodo 2009-2014 es aparentemente estable, lo mismo que a más largo plazo en el periodo 1987-2014. Se estima una población de 180-190 parejas reproductoras. Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 120 parejas en Cáceres y 33 en Badajoz. En 2014 los parámetros reproductores de la región fueron de 80% parejas con éxito, tasa de vuelo de 1,07 pollos/nido con éxito y productividad de 0,74 pollos/nido controlado. En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 273 plataformas 270 estaban en roca (51% cortado fluvial y 49% cantil serrano), dos en árbol y una en el muro de una presa en Monfragüe.
- Revisión invernada. La invernada completa fue confirmada en 2008/2009 en el centro-oeste de Cáceres, aunque hay datos de presencia regular al menos desde 2001 y que podría remontarse a la década de 1980. Desde 2006 hay registros en los siguientes municipios: centro-oeste de Cáceres (Alcántara, Brozas, Acehúche, Portezuelo, Torrejoncillo, Portaje, Pescueza, Cachorrilla, Coria, Calzadilla, Casas de Millán, Mirabel, Monroy y Serradilla), Llanos de Cáceres-Trujillo (Aldea del Cano, Torrecillas de la Tiesa y Belén-Trujillo) y norte de Badajoz (La Roca de la Sierra). Hasta enero de 2014 sólo se conocía un dormitorio en el núcleo del centro-oeste cacereño, con censos máximos de 18 (2008/2009), 24 (2009/2010), 16 (2010/2011), 7 (2011/2012), 48 (2012/2013) y 37 (2013/2014). En enero de 2014 se observan en esta zona 49 alimoches en transectos en vehículo y uno en Trujillo. En 2014/2015 se localizan dos dormitorios más, seguramente activos en inviernos previos, con un censo de 67 aves el 28/12/2014. Poco después se localiza un cuarto dormitorio, estimándose un mínimo de 75-80 aves para todo el núcleo. Se observan aves de todas las edades, predominando los adultos (60-75% de las aves

censadas). Autoría de los datos: Manuela Rodríguez, Ángel Rodríguez, Miguel Ángel Muñoz, Iván Solana, Andrés Rodríguez, Javier Prieta, Sergio Mayordomo y César Clemente.

- Registros invernales. En el área habitual del centro-oeste de Cáceres: 2 adultos y un joven el 01/11/10 (E. Palacios y M. Á. Muñoz); En Canchos de Ramiro (CC), 3 el 26/12/10 (C. Clemente) y uno el 23/01/14 (J. M. Moreras, P. Rodríguez); en Portaje (CC) 2 el 28/01/12, uno el 17/01/13 (S. Mayordomo), 4 el 07/12/13 (M. Rodríguez) y uno el 06/12/14 (R. Montero); 2 en Torrejoncillo (CC) el 19/01/14 (S. Mayordomo). Censos en dormitorio: 36 el 02/02/13 (Á. Rodríguez, M. Rodríguez); 55 el 05/12/14 (Á. Rodríguez, M. Rodríguez) y 67 el 28/12/14 (C. Clemente, S. Mayordomo, J. Prieta, Á. Rodríguez y M. Rodríguez). Otras localidades: En Viñuelas, Galisteo (CC), 5 el 13/11/13 (S. Mayordomo). En Herrera de Alcántara (CC), un inmaduro el 04/12/14 (A. Galán). En Brozas (CC), uno en enero de 2010 (H. Dalmau y C. Torregrosa). En Sierra de Fuentes (CC), uno el 20/01/13 (F. Holgado) y un subadulto el 15/11/14 (S. Molano). En Torrecillas de la Tiesa (CC), uno el 10/01/14 (A. Ortega). En La Roca de La Sierra (BA), un adulto el 15/12/10 (Á. L. Sánchez) y uno el 09/12/13 (T. Álvarez). En Sierra Carija, Mérida (BA), uno el 14/01/13 (M. Á. Romo).
- Llegadas. Uno en Monfragüe (CC) el 13/02/09 (S. Mayordomo). Uno en Serrejón (CC) el 17/02/10 (M. García del Rey). Uno en Madrigalejo (CC) el 04/02/11 (S. Fletcher). Uno en Canchos de Ramiro (CC) el 20/02/11 (F. Yuste). 2 en Monfragüe (CC) el 21/02/11 (C. Jewitt y R. Montero). Un adulto en Monfragüe (CC) el 31/01/12 (J. Esteban). 2 adultos en Torrejoncillo (CC) el 06/02/12 (A. Pacheco). Un adulto en Santa Amalia (BA) el 11/02/12 (F. Yuste). Un adulto en Monfragüe (CC) el 13/02/12 (J. M. Diu). Uno en Aldea del Cano (CC) el 12/02/13 (J. C. López). 2 en Monfragüe (CC) el 17/02/13 (J. Casado). Uno en San Pedro de Mérida (BA) el 18/02/13 (J. P. Prieto). El 24/02/13, 8 en Canchos de Ramiro, Cachorrilla (CC), y 2 en Marisantos, Pescueza (CC) (Á. Rodríguez y M. Rodríguez). Uno en Monfragüe (CC) el 30/01/14 (M. Kelsey y N. Renwick). Uno en La Aldea del Obispo (CC) el 18/02/14 (N. Renwick). Uno en Cáceres el 22/02/14 (J. Muddeman y G. Schreur).
- Últimos registros. Uno en Portaje (CC) el 09/10/09 (S. Mayordomo). Uno en Membrío (CC) el 14/10/10 (G. Schreur y J. Tarrío). Un joven en Monfragüe (CC) el 01/10/11 (D. Langlois y S. Langlois). Un joven y un adulto en La Aldea del Obispo (CC) el 2/10/11 (J. Muddeman). 2 en Portaje (CC) el 15/09/12 (S. Mayordomo). Un 4º año y un 1º año en Aldea del Cano (CC) el 22/09/12 (S. Molano y A. Fernández). Un inmaduro en Monfragüe (CC) el 29/09/12 (J. L. Rivero). Uno en Cañaverl (CC) el 05/10/12 (C. Dávila). 2 en Galisteo (CC) el 04/10/13

(C. Clemente y J. Mahillo). Un joven en Monfragüe (CC) el 05/10/13 (M. Kelsey; M. García del Rey). 2 en Torrejoncillo (CC) el 26/09/14 (A. Pacheco). Uno en Cáceres el 28/09/14 (Á. Sánchez). 3 en Monfragüe (CC) el 28/09/14 (B. Fernández y J. Gutiérrez del Sol). 4 en Galisteo (CC) el 30/09/14 (J. L. Bautista y S. Mayordomo). Un joven en Herrera de Alcántara (CC) el 22/10/14 (A. Galán).

Buitre leonado (*Gyps fulvus*)

Estatus regional. Residente común (1.950 parejas en 2008, 7⁵% de España) con tendencia al aumento. Importante presencia de no reproductores. Subespecie *G.f.fulvus*.

Criterio. Censos y observaciones de interés.

- Registros de interés. 150 en el vertedero de Cáceres el 03/12/11 (A. Gil). 512 contados y >600 estimados en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 13/12/11 (J. Prieta). Uno leucístico en Cachorrilla (CC) el 24/04/10 (C. Clemente y J. Mahillo). Fechas extremas de cría en Monfragüe (CC): una pareja aporta material al nido en la Portilla del Tiétar el 24/11/09 (M. García del Rey); en el Salto del Gitano una pareja incubando el 19/12/10 (M. García del Rey y S. Mayordomo), uno incubando mientras la pareja aporta material al nido el 14/12/11 (S. Mayordomo y M. García del Rey), un adulto cebando a un joven el 25/11/12 (S. Mayordomo) y un nido con un pollo y un huevo sin eclosionar el 07/04/13 (E. Palacios, J. Arias y S. Mayordomo).

Buitre moteado (*Gyps rueppelli*)

Estatus regional. Especie muy escasa en dispersión desde África. 20 registros en 9 localidades entre 1990 y 2014, siempre individuos aislados; todos en el periodo mayo-octubre excepto dos en invierno con máximo en mayo-junio (13 citas; 65% del total). Citas anuales desde 2008 y sólo tres anteriores (1990-1992, 2000 y 2004). Subespecie probable *G.r.rueppelli*.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos. Un adulto entre 1990 y 1992 en Santiago y Valencia de Alcántara (J. Hernández, J. A. Otano, V. M. Pizarro). Un inmaduro en Oliva de Mérida el 28/05/00 (L. Salguero). Un adulto en Valencia de Alcántara el 16/06/04 (L. R. López). Un joven en la Portilla del Tiétar, Monfragüe, el 24/05/08 (A. López y A. Molina).
- Año 2009. Un adulto con caracteres híbridos *G.rueppelli* x *G. fulvus* en San Vicente de Alcántara (BA) el 10/01/2009 (J. Gordillo).

- Año 2010. Un inmaduro en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), los días 05/06/10 y 06/06/10 (J. Porras, E. García, M. García del Rey, S. Mayordomo y otros).
- Año 2011. Un inmaduro en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 18/06/11 (S. Mayordomo y R. Montero). Un subadulto en Serradilla (CC) el 05/08/11 (D. Álvarez, I. Izquierdo e I. Álvarez).
- Año 2012. Un inmaduro en Mojón Gordo, Aldea del Cano (CC), el 12/10/12 (S. Molano).
- Año 2013. Uno 2º año calendario en los riscos de Valbellido, Salvaleón (BA), los días 21/05/13 (M. Gálvez), 22/05/13 (F. Montaña y M. Gálvez), 23/05/13 (A. Núñez, F. Montaña y J. Vázquez), 24/05/13 (J. Corral, L. Alcántara y Ó. Llama) y 25/05/13 (J. G. Aparicio y J. Portillo). Uno 3º año calendario en el vertedero de Mirabel (CC) los días 25/05/13 (E. Palacios, J. Prieta y S. Mayordomo) y 26/05/13 (J. Portillo). Uno 3º-4º año calendario en Villanueva del Fresno (BA) el 22/06/13 (A. Pérez del Barco). Un inmaduro en Mirabel (CC), cerca del basurero, el 28/07/13 (D. Álvarez). Un inmaduro en la sierra de Magacela (BA) el 21/08/13 (J. M. García).
- Año 2014. En Torrejón el Rubio (CC), un juvenil el 24/05/14 (D. González) y otro el 09/09/14 (E. Cabrero). Un ejemplar fotografiado en el Salto del Gitano, sin fecha, foto publicada en facebook el 04/07/14 (En Ruta). Uno en Torre de Miguel Sesmero (BA) el 26/10/14 (J. Milan).

Buitre negro (*Aegyptius monachus*)

Estatus regional. Residente común (837-919 parejas en 2009-2014; 46% de España). Tendencia creciente. Importante presencia de no reproductores. Monotípica.

Criterio. Censos y observaciones de interés.

- Población reproductora, 2009-2014. Los resultados publicados por la Junta de Extremadura son de 853-862 parejas y 602 pollos volados (2009), 757-858 parejas y 515 pollos (2010), 867 parejas y 526 pollos (2011), 837 parejas y 577 pollos (2012), 897 parejas y 590 pollos (2013) y 919 parejas y 578 pollos (2014). La población ha oscilado entre 757 y 919 parejas censadas. La tendencia en el periodo 2009-2014 es estable o en ligero aumento. A más largo plazo, en el periodo 1989-2014, la tendencia es claramente positiva, aumentando desde 343 parejas (1989, seguramente muy infravalorado) a 920 parejas (2005; máximo de la serie). Se estima una población de 1.200 parejas reproductoras repartida en once núcleos o colonias, que varían entre un nido y 342 parejas (máximo en Sierra de San Pedro en 2009). Se conocen dos censos

desglosados por colonias, en 2009 y 2013, que se reparten del siguiente modo: Sierra de San Pedro 342 y 316 parejas, Monfragüe 315 y 275, Gata-Hurdes-Granadilla 102 y 209 (aparentemente se duplica, pero es más lógico pensar en una importante mejora de la calidad del censo), Los Ibores 34 y 40, Tajo Internacional 45 y 37, Cijara 9 y 13, Cañaveral 4 y 6 y Canchos de Ramiro 0 y 1 parejas. Los núcleos de Siruela y Montánchez, con nidos aislados en años previos, no han vuelto a ser ocupados y el incipiente núcleo de Villuercas (1-2 parejas en 2007) no aparece citado en los censos oficiales 2009-2014 a pesar de seguir activo. Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 821 parejas en Cáceres y 98 en Badajoz. En 2014 los parámetros reproductores en la región fueron de 70% parejas con éxito y productividad de 0,63 pollos/nido controlado. Asimismo se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. En todo caso, de 1.634 plataformas indicadas todas se localizan en árbol (64% alcornoque, 21% pino resinero, 14% encina y 1% pino piñonero) excepto tres situadas en sustratos diferentes no precisados.

- Registros de interés. Concentraciones en vertederos: 51 en Mirabel (CC) el 06/04/10 (J. Prieta), >150 en Cáceres el 03/12/11 (A. Gil) y 97 en Mérida (BA) en octubre de 2013 (J. A. Román). Un nido a 1.250 msnm en Pinofranqueado (CC) en agosto de 2011 (A. Pacheco). El 15/04/13, uno muy claro en Los Ibores (CC) (P. Gómez) y otro, o el mismo, en Casas de Belvís (CC) el 16/11/13 (J. Briz).

Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus regional. Reproductora estival común (980 parejas en 2010; el 9% de España) con tendencia posiblemente creciente. Invernada excepcional. Monotípica.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Población reproductora. En 2009-2010 tiene lugar un sondeo nacional de siete rapaces diurnas forestales (Palomino y Valls, 2011), entre ellas la culebrera europea. La población calculada es de 980 territorios (rango 940-1.020), que supone el 9'4% de España (10.380 territorios). La densidad media es de 2'4 territorios/100 km², por encima de la media nacional (2'1). Cáceres, con 570 territorios estimados, acoge la mayor población provincial, aunque por densidad (2'87 territorios/100 km²) sea la cuarta. Por su parte, Badajoz alberga 410 territorios, 1'88/100 km². La culebrera se distribuye ampliamente, destacando la mitad oriental de Cáceres y el noreste de Badajoz, lugares con mayor probabilidad de observación en España. Aunque en la provincia de Badajoz, sobre todo en

su mitad oeste, es menos común, algunas localidades arrojaron las densidades puntuales más elevadas del país (2'5 territorios en tan solo 10 km²). En conjunto fue detectada en el 41% de las cuadrículas oteadas. Considerando los transectos en vehículo, en Extremadura se vieron 2'5 aves de media cada 100 km, siendo observada en el 65% de las cuadrículas muestreadas. El IKA medio de España fue de 1'6. La tendencia en España es estable según el programa SACRE, aunque la migración en el Estrecho de Gibraltar ha aumentado a un ritmo anual del 6'6% en el periodo 1998-2009. También ha aumentado el IKA en relación a estudios previos. Por tanto, es probable que esté en aumento.

- Llegadas. Una en Pago de San Clemente (CC) el 19/02/09 (M. Kelsey). Una en Valdesalor (CC) el 27/02/09 (A. Domínguez). 3 en Monfragüe (CC) el 28/02/10 (C. Clemente y J. Mahillo) y una en Plasencia (CC) (J. Prieta). Una en Cabañas del Castillo (CC) el 26/02/11 (G. Schreur y M. Kelsey). El 27/02/11, 2 en Monfragüe (C. Clemente, F. Carrero, J. Caballero, J. Caballero). El 28/02/11, 2 en La Serena (BA) (R. Romero), una en Mérida (BA) (Á. Sánchez) y otra en Cáceres (J. Caballero). Una en Plasencia (CC) el 31/01/12 (J. Esteban). Una en Mérida (BA) el 02/02/12 (F. Lopo), en los Santos de Maimona (BA) el 25/02/12 (E. del Viejo) y en Albuquerque (BA) el 26/02/12 (Familia Schreur). Una en Montehermoso (CC) el 14/02/13 (J. Mahillo). Una en Castuera (BA) el 24/02/13 (M. Gálvez). Una en Alange (BA) el 26/02/14 (M. Gálvez) y otra en Santa Cruz de la Sierra (CC) (U. Bühlmann, J. P. Prieto y K. Walker).
- Últimos registros. Una en Plasencia (CC) el 14/10/09 (J. Prieta). Una en Villar del Rey (BA) el 18/10/09 (G. Schreur y J. Prieta). Una en Almendralejo (BA) el 18/10/10 (R. Vicente). Una en Almaraz el 8/10/11 (J. Muddeman). Una en Esparragalejo el 12/10/11 (Á. Sánchez). Una en Monfragüe (CC) el 05/10/12 (A. Rubio). Una en Santa Marta de Magasca (CC) el 05/11/12 (M. Kelsey). Una en Monfragüe (CC) el 16/10/13 (I. García). Una en Gabriel y Galán (CC) el 25/10/13 (J. Montero). Una en El Carrascalejo (BA) el 26/10/13 (J. Solana). Una en Alange (BA) el 28/10/14 (M. Gálvez). Una en Monfragüe (CC) el 31/10/14 (Ó. Díaz) y el 08/11/14 (J. L. Rivero).
- Primer registro en diciembre: una cerca del El Gordo, en el límite entre Cáceres y Toledo, el 07/12/10 (J. Briz).

Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus regional. Reproductor común (143 parejas en 2013; 7'5% de España) con tendencia muy creciente (+650% en 1999-2013). Invernante común (307 ejemplares en 2006; 5% de España) con tendencia muy positiva.

Subespecie *C.a.aeruginosus*.

Criterio. Nuevas localidades de cría, censos en dormideros.

- **Población reproductora.** En 2013 se efectuó el quinto censo extremeño de aguilucho lagunero (Traverso, 2013). Se censaron 143 parejas, 138 seguras (103 en Badajoz y 35 en Cáceres); 84 de ellas (el 60%) criando en sustrato natural y 54 (el 40%) en cultivos de cereal. La tendencia es claramente positiva, en especial en la cuenca del Guadiana que pasa de 74 parejas seguras en 2006 a 101 en 2013, concentrando la comarca de Vegas Altas el 60% del total regional. Los censos anteriores arrojan el siguiente resultado: 18-24 parejas (1999), 34-38 (2002), 54-65 (2003), 88-99 (2006), 123-130 (2010) y 138-143 (2013). El incremento es por tanto de +650% entre 1999 y 2013 (8 veces más), siendo mucho mayor en Badajoz (multiplica por 20) que en Cáceres (“sólo” se triplica). La reproducción en 2013 se estudió en 45 nidos, 40 con éxito criaron 84 pollos; la tasa de vuelo fue de 2'1 y la productividad de 1'87, por debajo de la media de 2'42 y 2'04 del conjunto de los seis censos realizados.
- **Censos de enero 2009-2014.** Los censos diurnos no son representativos para esta especie, no obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 21 en 2009, 48 en 2010, 24 en 2011, 161 individuos en 2012, 222 en 2013 y 122 en 2014 en un máximo de 24 localidades cada año. La tendencia es al aumento.
- **Dormideros.** En Madrigalejo (CC), 65 el 22/12/09, 97 el 03/01/10 y 140 el 30/12/12 (P. Tapia y M. Jiménez). En Galisteo (CC), aumento importante desde 1-2 ejemplares en 200-2005, a 10 el 11/12/10 y 40-45 el 20/12/14 (J. Prieta). En Vegas Altas (BA), 75 el 18/11/12 (Á. Díaz). **Mayor dormidero en España.** 527 aguiluchos laguneros contados entrando a un dormidero diferente de Madrigalejo el 25/12/12 (C. Murphy /Naturtrek).
- **Colonización de la cuenca del Alagón.** Primer nido en 2011: una pareja y un joven en la laguna de Galisteo (CC) el 27/07/11 (S. Mayordomo). A partir de 2012 se localizan nuevas parejas en esta comarca, al menos en la gravera de Viñuelas y en el embalse de Portaje.

Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus regional. Reproductor esporádico en la actualidad (un caso en 2009-2014 en La Serena) con tendencia muy negativa. Anteriormente criaba de modo escaso e irregular (0-10 parejas) en La Serena, Las Hurdes, Llanos de Cáceres y La Siberia. Invernante común (¿300-500? ejemplares) con tendencia desconocida. Subespecie *C.c.cyaneus*.

Criterio. Época de cría, fechas extremas, censos en dormideros.

- Últimos registros. Una hembra en Madrigalejo (CC) el 29/03/10 (T. Naturalist). Uno en Badajoz el 18/04/11 (Á. Sánchez y J. Fernández). Uno en Talaván (CC) el 21/04/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Talaván (CC) el 29/04/12 (A. Jiménez). Una hembra en Alange (BA) el 09/04/14. Uno en Medina de las Torres (BA) el 09/04/14 (J. A. Delgado y F. Montaña). Un macho en Cáceres el 26/04/14 (P. de la Nava y M. Moreno).
- Registros en mayo-julio. Un inmaduro en Santa Marta de Magasca (CC) el 05/05/09 (J. Muddeman). Uno en Valverde de Leganés (BA) el 04/05/11 (G. Schreur). Una hembra en Ahigal (CC) el 30/05/12 (A. Pacheco). Una hembra en Guijo de Coria (CC) los días 03/05/13 (S. Mayordomo) y 08/05/13 (J. Prieta). Una hembra en Palomas (BA) el 04/05/13 (J. Guerra). Un macho en Santa Amalia (BA) el 24/05/13 (F. Yuste). Un macho en Almendralejo (BA) el 09/07/14 (J. A. Román)
- Llegadas. Un macho en el valle del Jerte (CC) el 07/09/09 (A. Domínguez). Uno en La Albuera (BA) el 18/09/10 (A. Pacheco). 2 en Llerena (BA) el 18/10/10 y un macho en Granja de Torrehermosa (BA) el 21/10/10 (A. Núñez). Uno en Belén, Trujillo (CC), el 24/09/11 (M. Kelsey). Un macho en Los Canchales (BA) el 20/09/12 y el 30/09/12 (F. Montaña, F. Lopo, F. Castro, E. del Viejo, D. García). Una hembra en Galisteo (CC) el 29/09/12 (S. Mayordomo). Uno en Talaván (CC) el 29/09/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Cáceres (CC) el 01/10/13 (GIA Extremadura). 3 en Gévora (BA) el 07/09/14 (J. C. Paniagua). Una hembra en Galisteo (CC) el 09/09/14 (C. Bradley, D. Bradley y R. Montero). Una hembra en Alange (BA) el 23/09/14 (J. Guerra). Una hembra en Santa Marta de Magasca (CC) el 23/09/14 (M. Kelsey).

Aguilucho papialbo (*Circus macrourus*)

Estatus regional. Accidental. Siete registros en 2000, 2012, 2013 y 2014, entre noviembre y mayo, cinco en paso postnupcial y dos de invernada (una completa). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Un macho adulto en Fuente de Cantos (BA) el 07/04/00 (J. Marchamalo).
- Ejemplar con invernada completa: en Madrigalejo (CC), un macho adulto el 03/12/12 (J. M. Vadillo) y en Acedera (BA) el 26/12/12 (M. Gómez Guarín, M. Gómez Calzado), el 30/12/12 se observa entrando a un dormitorio en Madrigalejo (CC) (P. Tapia y M. Jiménez) y a partir de entonces se controla de modo regular hasta el 23/02/13 (P. Tapia, M.

Jiménez, A. Calvo, Á. Martínez, A. Mirat, C. Villaverde, J. M. Traverso, C. Clemente, E. Palacios, G. García, G. Mayor, J. Prieta, J. G. Aparicio, J. Guerra, J. Morena, J. Tolosa, J. A. Fimia, J. G. Aoiz, J. Martínez, J. Ruiz, J. Portillo, J. A. López, J. Merayo, L. Huerta, M. García del Rey, M. Martínez, M. Gálvez, M. J. Valencia, M. Kelsey, Ó. Llama, J. L. Guisado, P. Goñi, S. Mayordomo, S. Fletcher, V. López).

- Otros registros. Un macho adulto en La Roca de la Sierra (BA) el 26/03/12 (J. M. Casas y J. Mazón). Un macho adulto en Torremejía (BA) el 09/04/13 (P. Dhaluin). Un macho adulto en Alange (BA) el 16/03/14 (M. Gálvez). Un macho adulto en Higuera de Llerena (BA) el 26/03/14 (M. Gálvez, J. Guerra, F. Montaña y C. Moreno). Un macho en Llanos de Cáceres el 12/05/14 (T. Fallet). Un joven en Jaraicejo (CC) el 04/11/14 (B. Small).

Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus regional. Reproductor estival común (494-801 parejas en 2009-2013; 17% de España), con tendencia decreciente (-38% en 2008-2013). Excepcional en invierno. Monotípica.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Población reproductora, 2007-2013. Los resultados de los censos encuadrados en las campañas de conservación realizadas por el Grupo Extremeño de Aguiluchos (GEA, 2007, 2013; Moreno, 2013) son los siguientes: 670 parejas, 596 controladas y 1.436 pollos volados (2007); 675 parejas, 649 controladas y 1.190 pollos (2008); 801 parejas, 741 controladas y 835 pollos (2009); 654 parejas, 654 controladas y 927 pollos (2010); 719 parejas, 719 controladas y 1.236 pollos (2011); 556 parejas, 556 controladas y 280 pollos (2012); 494 parejas, 355 controladas y 583 pollos (2013). La población ha oscilado entre 801 y 494 parejas censadas, con máximo en 2008 y mínimo en 2013. La proporción de parejas controladas mejora durante el periodo de estudio siendo del 100% en 2010, 2011 y 2012; no obstante, a pesar del bajo número de nidos, en 2013 se controlaron muchas menos parejas (355; 72% del total; 54% de la media 2007-2012 que es 652). El número de pollos volados oscila entre 280 en 2012 y 1.436 en 2007. La tendencia en el periodo 2007-2014 es claramente decreciente, con un declive de -38% en esos 5 años. La tendencia a largo plazo es también negativa respecto a las estimas de los años 1990, tras un periodo de cierta estabilidad en la década de 2000 en gran parte debida a las campañas de salvamento de nidos. Por provincias se conocen datos de 2012 y 2013, con valores de 52 y 49 parejas en Cáceres y 504 y 445 en Badajoz. La comarca más destacada es La Serena con 351 y 301 parejas en 2012 y 2013, es decir,

el 60-63% del total regional. La productividad en la serie 2007-2013 ha sido de 2'41 (2007), 1'83 (2008), 1'13 (2009), 1'42 (2010), 1'72 (2011), 0'50 (2012) y 1'64 pollos/nido (2013), con una media de 1'42, con una enorme variación interanual de hasta 5 veces debida a las condiciones agrícolas, meteorológicas y de cobertura de las campañas.

- Llegadas. Una pareja en La Serena (BA) el 18/03/09 (C. Proper). 2 machos y una hembra en Santa Marta de Magasca (CC) el 19/03/09 y 4 el 13/03/10 (M. Kelsey). Una pareja en La Albuera (BA) el 17/03/10 (J. Muddeman). En Magasca (CC), uno el 20/03/11 (M. Kelsey) y 3 machos y una hembra el 22/03/11 (G. Schreur). Un macho en Usagre (BA) el 21/03/11 (Á. Sánchez). Una pareja en Brozas (CC) el 16/02/12 y el 06/03/12 (H. Dalmau). Uno en Torremejía (BA) el 17/02/12 (J. P. Prieto y F. Crystal). Uno en Valdesalor (CC) el 12/03/12 (C. Fernández). Un macho en Lobón (BA) el 07/03/13 (F. Lopo). Uno en Ladrillar (CC) el 08/03/13 (A. Pacheco). Un macho en Morante (BA), el 10/03/14 (F. Lopo). 2 machos en Magasca (CC) el 16/03/14 (A. Davies y R. Miller).
- Últimos registros. Uno oscuro en la Campiña Sur (BA) el 20/09/09 (A. Pacheco y J. Salcedo). Uno en Montijo (BA) el 05/10/10 (Á. Sánchez). Un joven en Riobos (CC) el 20/10/11 (S. Mayordomo). Un macho adulto en El Batán (CC) el 22/10/11 (E. Palacios, F. Martín y M. Á. Muñoz).
- Aves de morfo oscuro (melánicas). En época de cría: En Guijo de Coria (CC), uno el 02/05/12 (A. Pacheco) y el 03/05/13 (S. Mayordomo). Uno en Talaván (CC) el 05/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Llanos de Cáceres el 15/05/14 (N. Renwick) y 2 el 16/05/14 (C. Cemente y S. Mayordomo). En otras fechas: Uno en Tejada del Tiétar (CC) el 20/04/10 (J. Prieta). Uno en Guijo de Coria (CC) el 02/04/12 (A. Pacheco). Uno en Alcántara (CC) el 13/06/12 (J. Mahillo, C. Clemente, C. L. Albar). Uno en Madrigalejo (CC) el 23/08/12 (Á. L. Sánchez). En Piornal (CC), uno el 24/08/12 y uno el 13/09/12 (J. Prieta). Uno en Pínofrankeado (CC) el 07/09/12 (A. Pacheco). Uno en Casatejada (CC) el 04/04/13 (C. Clemente, M. de Gabriel y S. Briones). Uno en Mérida (BA) el 12/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Hinojal (CC) el 20/04/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 21/04/13 (D. Langlois y S. Langlois). Uno en Alange (BA) el 09/04/14 (J. A. Román). En Llanos de Cáceres, uno el 25/04/14 (C. Clemente y S. Mayordomo) y el 21/07/14 (J. Gutiérrez del Sol). Uno en Sierra de Fuentes (CC) el 28/04/14 (S. Mayordomo). Uno en La Serena (BA) el 01/05/14 (F. Bernáldez, M. Gálvez y F. Macías).
- Primer registro invernal: un macho adulto en Navas del Madroño (CC) el 29/12/10 (A. Ceballos).

Azor común (*Accipiter gentilis*)

Estatus regional. Residente común (250-700 parejas en 2010; el 6% de España) con tendencia desconocida. Subespecie *A.g.gentilis*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Población reproductora.** En 2009-2010 tiene lugar un sondeo nacional de siete rapaces diurnas forestales (Palomino y Valls, 2011), entre ellas el azor común. La población calculada es de 700 territorios (rango 650-750), el 6'2% de España (11.350 territorios). La densidad media es de 1'7 territorios/100 km², por debajo de la media nacional (2'2). Por provincias, Cáceres acoge 420 territorios y Badajoz 280. Las densidades (2'1 en Cáceres y 1'3 en Badajoz) están entre las menores de España. Fue detectado en el 14% de las cuadrículas oteadas (18% de Badajoz y 6% de Cáceres) y se distribuye de modo parcheado en Extremadura, lo mismo que en el conjunto de España y en Francia. Es muy escaso en los sectores centrales y occidentales de ambas provincias, salvo en ciertas zonas del Sistema Central y sur de Badajoz. Común en comarcas orientales (La Siberia, Villuercas e Ibores), donde se obtienen las probabilidades más altas de observación de España. Los transectos en vehículo son un método muy poco adecuado para esta rapaz de baja detectabilidad. En Extremadura se vieron 3 aves cada mil kilómetros, igual a la media española. Fue detectado en el 13% de las cuadrículas muestreadas (20% en Badajoz y 5% en Cáceres). La tendencia del azor en España es incierta según el programa SACRE, siendo desconocida en Extremadura. Las cifras obtenidas en España quedan muy por encima de lo esperado, triplicando incluso a la importante población francesa, lo que hace plantear a los propios autores la posibilidad de errores en las estimaciones. Lo mismo puede aplicarse a Extremadura, con cifras que superan en mucho las impresiones previas y con datos quizás sobrevalorados. Otra discrepancia se aprecia entre Cáceres y Badajoz. En esta última los contactos fueron mayores, pero las estimas son inferiores a las de Cáceres. No obstante, esto podría explicarse porque las áreas óptimas de Badajoz fueron mejor muestreadas que las cacereñas.
- **Año 2009.** Uno en Plasencia (CC) el 14/03/09 y uno en Casas del Castañar (CC) el 15/06/09 (J. Prieta). Una hembra en el puerto de Perales (CC) el 22/11/09 y uno en Saucedá, Pinofranqueado (CC), el 27/12/09 (S. Mayordomo). En Monfragüe (CC), uno en el puente del Cardenal el 06/02/09 y uno en La Serrana, Monfragüe (CC) el 19/05/09 (J. Prieta). En Tentudía (BA), 3 el 22/02/09 y uno el 15/08/09 (A. Pacheco, J. Salcedo, J. L. Anguita).
- **Año 2010.** Uno en en Pinofranqueado (CC) el 13/12/10 (A. Pacheco). En Monfragüe (CC): uno en la Tajadilla el 01/03/10 (S. Fletcher), uno en los

Tres Caños el 19/04/10 (R. Montero) y uno en el Salto del Gitano el 10/11/10 (J. L. Rivero).

- Año 2011. Las Hurdes (CC): una pareja en Pinofranqueado (CC) el 30/03/11 (A. Pacheco), en Cambroncino (CC) el 13/09/11, en Riomalo de Abajo (CC) el 28/09/11 y en Arrolobos (CC) el 04/10/11 (A. Pacheco). Uno en El Bronco (CC) el 20/06/11 (A. Pacheco). Una hembra en Pasarón de la Vera (CC) el 19/10/11 (P. Gómez). Uno en el Puerto de Tornavacas (CC) el 23/11/11 (H. Dalmau). En Monfragüe: uno en La Tajadilla el 20/03/11 (L. Martínez); en el Salto del Gitano uno los días 02/04/11 (E. Palacios, J. Porras y S. Mayordomo), 09/04/11 (S. Mayordomo) y 27/04/11 (M. Kelsey); uno el 14/04/11 (J. J. Díaz). Tentudía (BA), uno el 17/09/11 y uno el 03/12/11 (A. Pacheco). Uno en Puebla del Maestre (BA) el 18/02/11 (A. Pacheco).
- Año 2012. Monfragüe (CC), uno el 26/01/12 (A. Pacheco), el 31/01/12 (J. Prieta) y en la Portilla del Tiétar el 13/08/12 (M. García del Rey). Las Hurdes (CC): uno en Cambroncino el 01/02/12, hembra en Riomalo de Abajo el 01/03/12, uno captura un abejaruco en el puerto de Esperabán el 01/09/12 y una hembra en Ladrillar el 25/09/12 (A. Pacheco). En el Canal de las Dehesas (BA), un macho el 05/03/12 y el 09/10/12 (Á. L. Sánchez). Uno en Arrocampo (CC) el 14/03/12 (S. Mayordomo, M. Gómez y J. Prieta). Uno territorial en Mohedas de Granadilla (CC) el 30/03/12 y una hembra en Monesterio (BA) el 28/04/12 (A. Pacheco). Uno en Piornal (CC) el 29/07/12 (L. Alcántara). Uno en Herrerueta (CC) el 10/04/12 (G. Schreur). En Alía (CC), uno en la raña el 07/10/12, el 01/11/12 y el 07/11/12; uno en el castañar el 31/10/12 y 2 el 02/12/12 (N. Baeza, J. Á. Herrera y J. Cerezo). Uno en El Borbollón (CC) el 20/11/12 (Á. Sánchez).
- Año 2013. Las Hurdes (CC): uno en Vegas de Coria el 21/01/13, una hembra en la Sierra de Cabezo el 21/03/13, una hembra en Cambrocino el 01/07/13 y 2 jóvenes en Las Mestas el 05/08/13 (A. Pacheco). Uno en Santibáñez el Bajo (CC), el 30/01/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Gredos (CC): uno en La Garganta el 06/01/13 (R. Vicente), uno en el puerto de Tornavacas el 18/09/13 (J. Prieta), uno en el paseo fluvial de Plasencia (CC) el 17/11/13 (R. Montero) y en Losar de la Vera, uno el 11/05/13 (D. Langlois y S. Langlois) y una pareja en el pinar de Los Poyales el 15/06/13 (C. Clemente, J. Prieta, M. García del Rey y J. L. Guisado). Monfragüe (CC): un macho adulto en la Portilla del Tiétar el 02/03/13 (J. Guerra, M. Gálvez), una hembra en el parque y otra en Toril el 09/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo) y uno en el pinar de Serradilla el 25/05/13 (J. Prieta). Entre el 17 y el 19/03/13 varios en el Tajo Internacional (CC) (J. L. Guisado y P. Goñi). Uno sobre el río Ibor (CC) el 04/08/13 (Á. Sánchez). En Alía (CC), uno el 10/02/13, uno en el arroyo Bargel el

24/03/13, uno en Sierra Palomera el 28/03/13, dos en la Raña el 30/03/13, uno los días 03, 05 y 13/05/13, uno el 08/06/13, uno en sierra de Palomera el 31/08/13, uno el 05/10/13 y el 06/10/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera y N. Baeza). 2 en Guadalupe (CC) el 15/08/13 (J. Á. Herrera). Uno en Montánchez (CC) el 24/09/13 (N. Rodríguez). Una hembra en Campo Lugar (CC) el 13/01/13 (A. Calvo y J. Muddeman). Uno en el embalse del Cubilar (CC) el 27/10/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera, N. Baeza). En Alange (BA) una hembra el 25/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y uno en Palacio Quemado el 02/12/13 (J. A. Román). Una hembra en Campillo de Llerena (BA) el 16/02/13 (F. Montaña, G. Montaña, G. Gahete y M. Corvillo). Un juvenil en Alburquerque (BA) el 21/09/13 (L. Sitges). Uno en Valverde de Mérida (BA) el 20/10/13 (J. Guerra y S. Domínguez). Uno en Vegas Altas (BA) el 01/11/13 (J. P. Prieto y W. Haworth).

- Año 2014. Gata-Hurdes (CC): una hembra en Las Mestas el 26/01/14 (A. Pacheco), uno en Ovejuela el 13/04/14 (J. Prieta) y un macho en Descargamaría el 09/05/14 (C. Clemente). Una hembra en Montehermoso (CC) el 26/01/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Uno sobre el casco urbano de Plasencia (CC) el 22/11/14 (J. Mahillo). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 24/05/14 (D. Langlois). Uno en el Salto del Gitano (CC), el 13/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Valdecañas de Tajo (CC) el 10/01/14 (C. López). Uno en el embalse de Alcántara (CC) el 24/01/14 (S. Mayordomo). Uno en Brozas (CC) el 27/01/14 (M. Iglesias). Uno en el río Ibor, Castañar de Ibor (CC) el 23/06/14 (F. Crystal). Uno en Alía (CC) el 06/05/14 y el 17/05/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera). Uno en el río Gévora, Alburquerque (BA), el 11/01/14 (G. Schreur y P. Schreur). Uno en Oliva de Mérida (BA) el 15/01/14 (J. Guerra). Uno en Alange (BA) el 05/09/14 (M. Gálvez, J. Guerra). Uno en Almendralejo (BA) el 09/11/14 (A. Giraldo y A. M. Sánchez). Uno en Puerto Peña (BA) el 16/02/14 (M. Kelsey y P. Kelsey).

Gavilán común (*Accipiter nisus*)

Estatus regional. Residente común (690 parejas en 2010; el 5% de España) con tendencia creciente. Invernante común (¿2.000? aves) con tendencia desconocida. Subespecie *A.n.nisus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Población reproductora. En 2009-2010 tiene lugar un sondeo nacional de siete rapaces diurnas forestales (Palomino y Valls, 2011), entre ellas el gavilán común. La población calculada es de 690 territorios (rango

630-750), el 5% del total español (13.810 territorios). La densidad media es de 1'7 territorios/100 km², por debajo de la media nacional (2'7). Por provincias, Cáceres acoge 430 territorios y Badajoz 260. Las densidades (2'2 en Cáceres y 1'2 en Badajoz) están entre las menores de España. Fue detectado en el 25% de las cuadrículas oteadas (20% de Badajoz y 30% de Cáceres) y se distribuye de modo irregular ocupando sobre todo sectores forestales y montañosos. La probabilidad de observación es alta en La Siberia, Villuercas-Ibores, Sistema Central, Monfragüe, Montánchez, centro de Badajoz, Tentudía y Vegas Bajas del Guadiana. Los transectos en vehículo son un método muy poco adecuado para esta rapaz de baja detectabilidad. En Extremadura se vieron 3 aves cada mil kilómetros, algo inferior a la media de España (0'4 por 100 km). Fue detectado en el 17% de las cuadrículas muestreadas (19% en Badajoz y 15% en Cáceres). La tendencia del gavilán en España es incierta según el programa SACRE, siendo igualmente desconocida la evolución en Extremadura.

- **Tendencia.** En Europa, origen de las aves migradoras e invernantes, la tendencia es “estable” en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).

Busardo ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus regional. Residente común (2.870 parejas en 2010; el 9% de España) con tendencia al aumento. Invernante común (¿5.000? ejemplares) con tendencia desconocida. Subespecie *B.b.buteo*. *B.b.vulpinus* es una raza citada pero sin registros confirmados.

Criterio. Observaciones de interés. La subespecie *B.b.vulpinus* es rareza en España.

- **Población reproductora.** En 2009-2010 tiene lugar un sondeo nacional de siete rapaces diurnas forestales (Palomino y Valls, 2011), entre ellas el busardo ratonero. La población calculada para Extremadura es de 2.870 territorios (rango 2.790-2.960). Esto supone el 9'3% del total español (31.000 territorios). La densidad media es de 6'9 territorios/100 km², un poco por encima de la media nacional (6'1). Cáceres, con 1.490 territorios, acoge la mayor población provincial, seguida por Badajoz, que alberga 1.380 territorios. Al ser las dos provincias más extensas, la densidad (7'5 y 6'3 respectivamente) es inferior a otras provincias. El busardo ratonero se distribuye por toda Extremadura, siendo más frecuente en la provincia de Cáceres, donde sólo se vuelve algo menos común en Sierra de Gata, Las Hurdes, Las Villuercas y suroeste provincial. En Badajoz, las mejores áreas se sitúan en el tercio norte, cerca del Guadiana, rarificándose hacia el sur. Fue detectado en el 60% de las cuadrículas oteadas. Considerando los transectos en vehículo, en

Extremadura se vieron 6'3 aves de media cada 100 km (6'8 en Badajoz y 5'8 en Cáceres), siendo observada en el 85% de las cuadrículas muestreadas. El IKA medio de España fue de 6'8.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,5% y un aumento poblacional de +37% (SEO/BirdLife, 2013a).

Busardo moro (*Buteo rufinus*)

Estatus regional. Accidental. Una observación homologada y varias dudosas. Identificación compleja, sobre todo tras constatarse en Cádiz la hibridación, que podría ser un fenómeno regular y estable en el sur de España. Subespecie *B.r.cirtensis* del Magreb y posibles híbridos *B.b.buteo* x *B.r.cirtensis* (denominado “Busardo de Gibraltar”).

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Uno en Regina (BA) desde el 6/12/05 (J. J. Ramos Encalado) hasta enero de 2006 (J. Salcedo).
- Aves con caracteres de *Buteo rufinus*. Año 2009. Uno 2º año calendario en Palomas (BA) el 01/05/09 (A. Matador). Año 2010. En Trujillo (CC): un 2º año calendario en Belén el 11/06/10 (E. García) y otro el 22/06/10 en Los Cerralbos (M. Kelsey). Año 2011. Un 2º año calendario en Belén, Trujillo (CC), el 26/03/11 (D. Allen, C. Mellon y D. Wir) y el 03/04/11 (S. Daly). 2 adultos en Magasca (CC) el 24/04/11 (J. Esteban). Año 2012. Un probable juvenil de morfo claro en el Almonte, Santiago del Campo (CC), el 15/01/12 (J. J. Ramos). Uno en Campo Lugar (CC) el 15/04/12 (M. Kelsey). Año 2014. Un 2º año calendario en Puebla de la Reina (BA) el 21/05/14 (J. Guerra).

Águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus regional. Residente escasa (36-53 parejas en 2009-2014; el 11% del mundo) con tendencia reciente estable y positiva a largo plazo (+55% entre 1989 y 2014). Monotípica.

Criterio. Observaciones de interés.

- Población reproductora, 2009-2014. Hay numerosos datos por la Junta de Extremadura que ofrecen valores diferentes según las fuentes, incluso cuatro para un mismo año y que varían hasta un 25%. Las horquillas de valores conocidos son: 36-47 parejas (2009), 38-46 (2010), 43-48 (2011),

50-53 (2012), 50-53 (2013) y 48 (2014). Considerando como oficiales los datos publicados por el Ministerio, las cifras son de 41, 46, 48, 53, 50 y 48 en el periodo 2009-2014, oscilando entre 41 y 53 parejas censadas y máximo en 2012. El número de pollos volados en el mismo periodo, según datos de la Junta de Extremadura, es de 28, 46, 60, 56, 37 y 48 (respecto a censos de 36, 38, 43, 50, 52 y 48 parejas). A pesar de la imprecisión de los datos publicados, la tendencia en el periodo 2009-2014 es aparentemente estable, siendo positiva a más largo plazo en el periodo 1989-2014 (+55% de aumento; muy por debajo del resto del área de distribución). Por provincias, Badajoz aumenta de 12 parejas en 2006 a 20 en 2014 y Cáceres sufre un declive sin equivalente en otras provincias pasando de 35 parejas en 2006 a 28 en 2014. La productividad reproductora en la región fue de 1,29 pollos/pareja controlada (2009), 1,09 (2010), 1,4 (2010), 1,12 (2011), 0,71 (2012) y 1,0 (2014). La media del periodo 1992-2006 es de 1,06, con una fase inicial por debajo de la media (1992-2003), seguida de un periodo donde mejora la productividad (2003-2012) y con un claro empeoramiento en 2013 y 2014, quizás debido a nuevas epidemias en conejo. En 2014 el 68% de las parejas criaron con éxito, siendo la tasa de vuelo de 1,80 pollos/nido con éxito. En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 91 plataformas todas estaban en árbol (38% en pino resinero, 27% en alcornoque, 17% en encina, 13% en eucalipto, 4% en pino piñonero y un nido en pino laricio) excepto una en tendido eléctrico (posiblemente abandonada).

- Nuevas localidades. Una reclamando en Villanueva de la Vera (CC) el 28/01/12; primera observación en diez años (D. Langlois).

Águila real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus regional. Residente escasa (103-116 parejas en 2009-2014, el 7% de España) con tendencia estable. Sedentaria con dispersión juvenil. Subespecie *A.c.homeyeri*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Población reproductora, 2009-2014. Los resultados publicados por la Junta de Extremadura son de 112 parejas y 68 pollos volados (2009), 102 parejas y 72 pollos (2010), 116 parejas y 92 pollos (2011), 103 parejas y 85 pollos (2012), 114 parejas y 78 pollos (2013) y 104 parejas y 77 pollos (2014). La población ha oscilado entre 103 y 116 parejas censadas, con altibajos seguramente debidos a la diferente cobertura. La tendencia en el periodo 2009-2014 es aparentemente estable, lo mismo que se aprecia a más largo plazo en el periodo 1988-2014, que tuvo máximos de 124 y 123 parejas en 2002 y 2008 (únicas ocasiones que

supera las 120 parejas). En Extremadura se estima una población real de unas 120-130 parejas reproductoras. Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 46 parejas y 41 pollos en Cáceres y 58 parejas y 36 pollos en Badajoz. En 2014 los parámetros reproductores en la región fueron de 78% parejas con éxito, tasa de vuelo de 1,38 pollos/nido con éxito y productividad de 0,74 pollos/nido controlado. En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 249 plataformas el 28% estaban en árbol (40% encina, 38% alcornoque, 12% eucalipto, 6% en pino resinero, 4% en pino piñonero y uno en roble melojo), el 72% en roca (24% cortado fluvial y 76% cantil serrano) y un nido en otro sustrato diferente sin especificar.

Águila calzada (*Aquila pennata*)

Estatus regional. Reproductor estival común (2.210 parejas en 2010; el 12% de España) con tendencia creciente. Invernante muy escasa (10-25 ejemplares). Monotípica.

Criterio. Observaciones de interés, invernales y fenología.

- **Población reproductora, 2009-2010.** En 2009-2010 tiene lugar un sondeo nacional de siete rapaces diurnas forestales (Palomino y Valls, 2011), entre ellas el águila calzada. La población calculada es de 2.210 territorios (rango 2.150-2.270), el 12% del total español (18.500 territorios). La densidad media es de 5'3 territorios/100 km², la mayor del país y por encima de la media nacional (3'7). Badajoz, con 1.200 territorios estimados, acoge la mayor población provincial, seguida por Cáceres, que alberga 1.010 territorios. Más frecuente en la mitad norte de Cáceres y más escasa en el centro-oeste de Badajoz. En conjunto, fue detectada en el 57% de las cuadrículas oteadas (65% en Cáceres y 52% en Badajoz). Considerando los transectos en vehículo, se vieron 4'4 aves de media cada 100 km, siendo observada en el 77% de las cuadrículas muestreadas (83% en Cáceres y 71% en Badajoz). El IKA medio de España fue de 2'3. La tendencia en España es de incremento muy marcado según el programa SACRE, cifrado en un 43% entre 1998 y 2010. En la zona centro, donde se encuentra Extremadura, el aumento es aún mayor, del 53%. Asimismo, los recuentos en el Estrecho de Gibraltar se han multiplicado por cuatro desde los años 1990, alcanzando en 2010 cifras de casi 30.000. En el trabajo citado hay algunas discrepancias, pues las estimas destacan la importancia de Extremadura y Andalucía occidental, pero la abundancia estimada es mayor en Cáceres y el sur de la meseta norte. Algo que también se aprecia en los transectos en vehículo. En ambos casos, Cáceres cobra importancia y Badajoz la pierde.

- Registros en noviembre-enero. Montehermoso (CC), una el 13/11/10, una oscura el 25/11/11 (J. Mahillo) y una el 20/12/14 (J. C. López). Galisteo (CC): una el 29/11/12 (R. Montero) y otra el 05/12/14 (S. Mayordomo). Plasencia (CC): una clara el 03/11/10 (J. Mahillo), el 02/11/12, una el 06/12/12 (J. Prieta) y el 16/01/13 (A. Salvador). Una en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 29/12/14 (J. M. Jiménez) y el 30/12/14 (J. Prieta). Arrocampo (CC), una el 26/11/14 (J. Porras), el 06/12/14 (V. de Alba y otros) y el 10/12/14 (I. Solana). Una en Casas de Belvís (CC) el 10/01/14 (C. López). Una en Navalморal de la Mata (CC) el 06/11/14 (J. Briz). Una en Sierra de Fuentes (CC) el 10/11/12 (J. Zalba y F. Holgado). Una en el Pico Villuercas (CC) el 09/11/14 (F. Montaña y otros). Una en sierra de San Pedro (BA/CC) el 06/12/09 (A. Cama, J. Guerra, J. Merayo y otros). Una en Alburquerque (BA) el 20/12/14 (M. Rodríguez y J. C. Salgado). En Badajoz (BA), una el 01/11/12, el 13/11/12 (A. Fernández), el 29/12/12 (J. Guerra) y el 31/01/14 (J. Sánchez). Una clara en el río Gévora (BA) el 01/01/14 (J. A. Molina y otros). Una clara en Talavera la Real (BA) el 24/01/11 (A. Cangas, E. del Viejo). Montijo (BA); una el 03/01/13, 2 el 14/11/14 y una el 24/12/14 (J. L. Bautista). Mérida (BA), una el 28/11/10 (Á. Sánchez), 1-2 durante noviembre de 2012 (S. Pérez, F. Lopo), una los días 02 y 20/12/12 (F. Bernáldez), una clara el 20/01/13 (J. Solana), una el 07/11/14 (J. L. Bautista). 2 entre La Zarza y Villagonzalo (BA) el 26/01/13 (J. Guerra y otros). Una clara en Medellín (BA) el 15/01/13 (J. Conejero). Gargáligas (BA), una oscura el 20/11/11 (L. Alcántara) y una el 24/11/11 (J. Hernández y J. P. Prieto). Una clara en Moheda Alta (BA) el 10/11/11 (M. Kelsey). Una clara en Lobón (BA) el 24/11/13 (P. Herrador). Una oscura en El Almendral (BA) el 06/01/14 (J. C. Delgado). Una clara en Hinojosa del Valle (BA) el 01/11/11 (J. Sánchez).
- Llegadas. *Dada la presencia de invernantes, es difícil determinar si se trata de los primeros estivales, que por el seguimiento satelital llegan en marzo y sobre todo abril.* Una en San Pedro de Mérida (BA) el 15/02/09 (J. Gómez). Una en Valdesalor (CC) el 25/02/09 (A. Domínguez). Una en Robledillo de Trujillo (CC) el 23/02/10 (S. Fletcher). Una en Mérida (BA) el 24/02/10 (A. Domínguez) y el 6/02/11 (Á. Sánchez). Una en Casas de Hitos (CC/BA) el 12/02/11 (A. Ortega, R. Urquiaga). Una en Monfragüe (CC) el 25/02/11 (G. Schreur, M. Kelsey). Una en Cáceres (CC) el 11/02/12 (J. Caballero). Una en Monfragüe (CC) el 25/02/12 (J. C. López). 2 claras en Lobón (BA) el 20/02/13 y otra clara en Mérida (BA) el 21/02/13 (F. Lopo). Una en Gadiana del Caudillo (BA) el 02/02/14 (J. L. Bautista). Una en Casatejada (CC) el 08/02/14 (M. Á. Muñoz, E. Palacios).
- Últimos registros. Una clara en Alagón del Río (CC) el 09/10/09 (S. Mayordomo). Una clara en Moraleja (CC) el 05/10/10 (C. Clemente). Una oscura en Mérida (BA) el 18/10/10 (Á. Sánchez). Una en Arrocampo (CC) el 11/10/12 (R. Vicente). Una en Quintana de la Serena

(BA) el 15/10/12 (A. Sanabria). Una clara en Montehermoso (CC) el 20/10/12. Una en El Batán (CC) el 23/10/12 y el 12/10/13 (R. Montero). Una clara en Talavera la Real (BA) el 31/10/13 (J. Guerra).

Águila perdicera (*Aquila fasciata*)

Estatus regional. Residente escasa (82-95 parejas en 2009-2014; 12% de España) con tendencia estable. Sedentario, con dispersión juvenil. Subespecie *H.f.fasciatus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Población reproductora, 2009-2014. Los resultados publicados por la Junta de Extremadura son de 82 parejas y 68 pollos volados (2009), 91 parejas y 59 pollos (2010), 93 parejas y 67 pollos (2011), 87 parejas y 70 pollos (2012), 92 parejas y 63 pollos (2013) y 95 parejas y 92 pollos (2014). La población ha oscilado entre 82 y 95 parejas censadas, con altibajos seguramente debidos a la diferente cobertura y máximos en 2011 y 2014. El número de pollos volados detectado aumenta con los años, posiblemente porque el número de nidos controlados sea superior, aunque este dato nunca se indica. La tendencia en el periodo 2009-2014 es aparentemente estable, lo mismo que a largo plazo en el periodo 1990-2014, con máximos de 103 y 101 parejas en 1994 y 2006 (únicas que superan las 100 parejas). En Extremadura se estiman 100-110 parejas reproductoras. Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 42 parejas y 35 pollos en Cáceres y 53 parejas y 57 pollos en Badajoz. En 2013 y 2014 los parámetros reproductores fueron de 47 y 81% parejas con éxito, tasa de vuelo de 1,88 y 1,46 pollos/nido con éxito y productividad de 0,88 y 0,97 pollos/nido controlado. En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 192 plataformas el 12% estaban en árbol (18 eucalipto, 3 pino resinero, 2 pino piñonero y uno alcornoque), el 83% en roca (31% cortado fluvial y 69% cantil serrano) y el 5% (9 nidos) en tendido eléctrico.
- Registros de interés. Un ave de 2º año captura un cormorán grande juvenil en Casatejada (CC) el 02/10/10 (S. Mayordomo).

Águila pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus regional. Primer caso de reproducción en 2015 en el embalse del Alqueva. Migrante escasa. Invernante muy escasa (10-25 ejemplares). Presencia estival esporádica. Tendencia creciente en todas las épocas. Subespecie *P.h.haliaetus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos no son representativos para esta especie, no obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron una en 2009, 2 en 2010, cero en 2011, 11 en 2012 (5 en Alqueva), 1 en 2013 y 3 en 2014 en 0-7 localidades cada año, en todos los casos embalses grandes o medianos.
- Registros estivales (junio-julio). Una en el Camacho, Talaván (CC), el 20/06/11 (J. L. Caballero). Una en Los Canchales (BA) el 09/07/11 (A. Cangas, E. del Viejo). Una en el Tiétar, Monfragüe (CC), el 16/07/11 (Vigilantes Monfragüe). En el embalse de Alange (BA), una el 12/07/12 (J. M. Castaño, J. M. Rama), el 26/06/14 (F. Bernáldez) y el 23/07/14 (P. Elías). Una en Salorino (CC) el 15/07/13 (H. Dalmau).
- **Invernada**

2008-2009. 2 localidades. Una en Arrocampo (CC) el 09/01/09 (M. García del Rey). Una en Gabriel y Galán (CC) el 31/01/09 (R. Montero).

2009-2010. 3 localidades. Monfragüe (CC): una en Las Cansinas el 08/12/09 y en la Portilla del Tiétar el 22/12/09 (S. Mayordomo, J. Guerra). Una en Portaje (CC) el 13/12/09 (E. Palacios y M. Á. Muñoz). Una en Gabriel y Galán (CC) el 14/12/09 (R. Montero).

2010-2011. 6 localidades. Gabriel y Galán (CC), una del 25/11/10 al 15/02/11 (A. Pacheco). Una en el embalse de Ahigal (CC) el 17/12/10 (S. Mayordomo). Arrocampo (CC), una del 01/11/10 al 4/01/11 (J. Collado, J. Briz). Una en La Nava de Santiago (BA) el 08/12/10 (Á. Sánchez). Una en Roca de la Sierra (BA), el 15/12/10 (Á. L. Sánchez). Una en Mérida (BA) el 21/11/10 (Á. Sánchez).

2011-2012. 8 localidades. Arrocampo (CC): una en Dehesa Nueva el 15/01/12 (V. Risco y J. Briz), una el 21/01/12 (J. Julián), una del 08 al 27/02/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y otros). Gabriel y Galán (CC), una del 01/11/11 al 16/01/12 (A. Pacheco, J. Prieta, J. Montero). Una en Viñuelas, Galisteo (CC), el 13/12/11, (J. Prieta). Una en el embalse de Torrejoncillo (CC) el 20/01/12 (A. Pacheco). Embalse del Cubilar (CC), una los días 14/01/12 y 29/01/12 (J. Mahillo, C. Clemente S. Mayordomo, P. Goñi, J. L. Guisado). 5 en Alqueva (BA) el 11/01/12 (Á. Sánchez). Una en Los Canchales (BA) el 29/01/12 (J. A. Molina). Una en el embalse de Llerena (BA) el 22/01/12 (V. de Alba y A. Núñez).

2012-2013. 10 localidades. Una en El Borbollón (CC) el 13/12/12 (H. Sánchez). Gabriel y Galán (CC), un juvenil anillado en Escocia visto el 09/11/12 (J. A. Manzanedo) que se desplaza luego al embalse de Alcántara y la hembra habitual entre septiembre y marzo (J. Prieta). En Arrocampo y Cerro Alto, Saucedilla (CC), una del 20/01/13 al 27/02/13 (D. Langlois, J. Briz, M. García del Rey, S. Langlois y otros). Una en el Azud del Rucas, Logrosán (CC), el 11/11/12 (Y. Muñoz, T. Laguna y

otros). 2 en el embalse de Cubilar, Logrosán (CC), el 18/11/12 (SEO-Badajoz). El 09/11/12, una en el embalse de Gargáligas (BA) (S. Mayordomo). Una en el Azud de Badajoz el 12/02/13 (I. Sánchez). Embalse de Montijo (BA), una el 25/11/12 y el 28/02/13 (Á. L. Sánchez). Una en el embalse de Tentudía (BA) el 19/12/12 (A. Pacheco).

2013-2014. 7 localidades. Una en Borbollón (CC) el 13/11/13 (K. Sánchez y R. Montero). Una en Portaje (CC) el 01/11/13 (E. Palacios y J. G. Aparicio). Una en la Rivera de Fresnedosa, Ceclavín (CC), el 07/12/13 (M. Rodríguez). Gabriel y Galán (CC), una del 28/10/13 al 08/01/14 (C. Clemente, J. Montero, J. Prieta, S. Mayordomo, A. Pacheco). Arrocampo (CC), una del 10/01/14 al 23/02/14 (C. López, C. Clemente, S. Mayordomo, J. M. Herranz). Embalse del Cubilar (CC), una del 18/10/13 al 30/11/13 (J. A. Román, J. Cerezo, J. P. Prieto, M. Kelsey y otros). Los Canchales (BA), una del 01/11/13 al 24/01/14 (T. Álvarez, J. L. Bautista, F. Lopo, E. del Viejo y otros).

2014-2015. 6 localidades. Una en El Borbollón (CC) el 11/12/14 (H. Sánchez). Una en Gabriel y Galán (CC) de septiembre a marzo (R. Dennis) y quizás la misma en Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), el 04/11/14 (M. Viskens). En Arrocampo (CC), una el 02/12/14 (J. L. Bautista y S. Mayordomo) y el 10/12/14 (I. Solana). Una en el embalse de Cubilar, Logrosán (CC), el 20/12/14 (J. Porras). Una en Los Canchales (BA) el 10/12/14 (J. L. Bautista).

- **Paso prenupcial. 2009**. Entre el 21/02/09 y el 24/03/09 (1 registro en febrero, 3 en marzo y 1 en abril), en 4 localidades: Portaje (CC), Cerro Alto (CC), Arrocampo (CC) y Casas de Hitos (BA-CC). **2010**. Entre el 16/03/10 y el 22/05/10 (4 registros en marzo, 1 en abril y 2 en mayo), en 4 localidades: río Alagón en Valdeobispo (CC), Arrocampo (CC), Alqueva (BA) y embalse de Alange (BA). **2011**. Entre el 01/03/11 y el 11/05/11 (4 registros en marzo, 7 en abril y 3 en mayo), en 7 localidades: El Borbollón (CC), Monfragüe (CC), Río Tiétar en La Bazagona y Valdeñigos (CC), Arrocampo (CC), Casas de Belvís (CC) y Campo Lugar (CC). **2012**. Entre el 11/03/12 y el 28/04/12 (17 registros en marzo y 2 en abril), en 10 localidades: Gabriel y Galán (CC), Puerto de Piornal (CC), Arrocampo (CC), Monfragüe (CC), Miravete (CC), Belén, Trujillo (CC), Zorita (CC), Azud del Guadiana, Badajoz (BA), embalse de Montijo, Mérida (BA), y Los Canchales (BA). **2013**. Entre el 03/03/13 y el 20/04/13 (7 registros en marzo y 8 en abril), en 10 localidades: embalse de Ahigal (CC), embalse de Guijo de Granadilla (CC), Arrocampo (CC), Malpartida de Plasencia (CC), embalse de Talaván (CC), embalse de Torremenga (CC), embalse del Cubilar (CC), Los Canchales (BA), embalse de Alange (BA) y embalse de Arroyoconejos o Llerena (BA). **2014**. Entre el 13/03/14 y el 10/04/14 (8 registros en marzo y 3 en abril),

en 9 localidades: embalse de Alange (BA), embalse de Ahigal (CC), embalse del Jerte o de Plasencia (CC), Portilla del Tiétar, Monfragüe (CC), Arrocampo (CC), embalse del Salor (CC), Valverde de Mérida (BA) y Los Canchales (BA).

- **Paso postnupcial. 2009.** Entre el 07/09/09 y el 25/09/09 (5 registros en septiembre), en 6 localidades: El Borbollón (CC), embalse de Ahigal (CC), río Tiétar en Casatejada (CC), Arrocampo (CC), Los Canchales (BA) y río Aljucén en Mérida (BA). **2010.** Entre el 15/10/10 y el 20/10/10 (2 registros en octubre), en 2 localidades: embalses de Los Canchales (BA) y de Valuengo (BA). **2011.** Entre el 23/08/11 y el 19/10/11 (2 registros en agosto, 8 en septiembre y 1 en octubre), en 6 localidades: Portaje (CC), Torrejoncillo (CC), embalse de Ahigal (CC), Gabriel y Galán (CC), río Tiétar (CC), Arrocampo (CC) y Los Canchales (BA). **2012.** Entre el 15/08/12 y el 23/10/12 (3 registros en agosto, 20 en septiembre y 4 en octubre), en 9 localidades: Sierra del Ladrillar (CC), Portaje (CC), embalse de Ahigal (CC), embalse del Jerte (CC), embalse del Cubilar (CC), Azud del Gadiana, Badajoz (BA), Talavera la Real (BA), Los Canchales (BA) y embalse de Montijo (BA). **2013.** Entre el 03/08/13 y el 19/10/13 (6 registros en agosto, 17 en septiembre y 7 en octubre), en 15 localidades: El Borbollón (CC), Portaje (CC), Guijo de Coria (CC), La Pesga (CC), embalse del Jerte (CC), Plasencia (CC), embalse de Membrío (CC), Zorita (CC), Sierra Brava (CC), embalse del Cubilar (CC), río Gadiana en Badajoz (BA), Los Canchales (BA), embalse de Montijo (BA), embalse de Alange (BA) y embalse de Llerena (BA). **2014.** Entre el 03/08/14 y el 22/09/14 (4 registros en agosto y 24 en septiembre), en 14 localidades: río Tiétar, Talayuela (CC), Torrejón el Rubio (CC), embalse de Talaván (CC), Sierra de Fuentes (CC), Valencia de Alcántara (CC), embalse del Cubilar (CC), Los Canchales (BA), Esparragalejo (BA), embalse de Montijo (BA), río Gadiana en Villagonzalo (BA), embalse de Alange (BA), embalse de Villalba de los Barros (BA) y embalse de Arroyoconejos-Llerena (BA).
- **Observadores:** D. Langlois, I. Gallardo, M. García del Rey, S. Langlois, S. Mayordomo, R. Montero, M. Kelsey, A. Ceballos, F. Yuste, T. Naturalist, C. Clemente, G. Schreur, J. Mahillo, J. Prieta, J. C. Salgado, M. Rodríguez, J. Guerra, M. Gálvez, J. L. Guisado, P. Goñi, J. Esteban, R. Vicente, J. L. Bautista, J. C. López, E. Palacios, R. Abuín, P. Herrador, F. Montaña, L. Rivas, A. Redondo, J. Briz, A. Pacheco, J. Hawkins, V. Risco, A. Cama, A. Núñez, J. Solana, J. Vázquez, M. Pauli, R. Solé, F. Bernáldez, V. de Alba, M. Á. Justo, J. C. Paniagua, S. Pérez, M. Á. Muñoz, F. Ramírez, J. Montero, J. Muddeman, Á. T. Mejías, F. Lopo, J. L. Valiña, J. P. Resino, A. Matador, R. Guzmán, J. M. Cano, E. Costillo, I. Sánchez, E. del Viejo, F. Castro, D. García, M. Llorente, Á.

Díaz, A. Cangas, A. Fernández, E. Peña, W. Haworth, L. Alcántara, G. Naharro, I. Parsons, F. Díez, J. A. Román, F. Macías, J. C. Albero, S. Fernández, J. P. Prieto, H. Zweers, A. Kouri, C. González, D. Huerta, M. Martínez, J. Mazón, J. M. Jiménez, J. Tarrío, M. Corvillo, J. Arias, J. Torfs, M. Viskens.

Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)

Estatus regional. Reproductor estival común (2.250-3.000 parejas estimadas en 2014) con tendencia negativa (-42% 2004-2014). Invernante escaso (<100? ejemplares). Forma dormideros estivales, con dos conocidos de 3.000-5.000 y 350-900 aves. Monotípica.

Criterio. Fechas extremas, observaciones de invernada y de interés.

- **Población reproductora 2014.** En 2014 SEO-Extremadura realizó un censo dentro de la Red Natura 2000 de Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014). El resultado fue 344 colonias ocupadas por 1.017-1.240 parejas. El número de ZEPA con presencia fue de 30, las 18 urbanas albergaban 575-692 parejas (56% del total). La tendencia es claramente negativa comparando con el anterior censo de 2004, con un declive del 42% y desaparición del 31% de las colonias. Aplicando este valor al total, se estiman 2.250-3.000 parejas en Extremadura en 2014. Las principales ZEPA fueron (parejas): La Serena (165-200), Cáceres ciudad (131-162), Trujillo (126-137), Llanos de Cáceres (79-106), Orellana-Sierra de Pela (85-99), Almendralejo (52-56), Plasencia (44-55), Acedera (42-45) y Brozas (36-45). El resto de ZEPA no superan las 40 parejas.
- **Dormideros postnupciales.** En agosto de 2009 se localiza el primero en la provincia de Cáceres, en un tendido de alta tensión de La Vera, con unos 600 ejemplares (P. Gómez, J. Prieta y S. Mayordomo); se censan 524 aves el 24/08/10 (J. Prieta); 368 aves el 03/08/11 y 483 el 24/08/11 (J. Prieta) y se estiman 1.000 ejemplares a mediados de agosto/11 (P. Gómez); se censan 529 el 09/08/12 (J. Prieta), 397 el 13/08/13 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo) y 907 el 22/08/14 (J. Prieta). En el dormidero de La Albuera se censa un mínimo de 2.950 ejemplares y se estiman 3.500-4.000 el 30/08/11 (DEMA y Junta de Extremadura) y hay unos 1.000 el 05/08/14 (J. Antolín, A. García, F. Martínez y A. Sánchez). Nuevo dormidero postnupcial en Llerena (BA) con 33 ejemplares el 07/09/14 (M. Corvillo y F. Montaña).
- **Registros de interés.** Nueva colonia de cría en Tejada del Tiétar (CC), al menos 2 parejas en junio de 2010; pero vacía en 2014 (J. Prieta). Nueva colonia en Guijo de Coria (CC) con 8 machos y 6 hembras el 11/04/12 (J. Prieta). En alta montaña presente todo agosto de 2012 en Piornal (CC) con máximo de 20 el 30/08/12 (J. Prieta), 20 en el Collado de las Yeguas,

Jerte (CC) el 21/08/12 (B. Molina) y presente en el Pitolero, Cabezabellosa (CC), el 18/08/12 (H. Sánchez). Visto todo agosto de 2012 en Guijo de Coria (CC) con máximo de 30 el 08/08/12 (J. Prieta, C. Clemente, J. Mahillo y H. Sánchez).

- Dormideros prenupciales. En Trujillo (CC) en un pino dentro del pueblo con 50 aves (M. Cardalliaguet). 15 en tendido de Malpartida de Plasencia (CC) el 24/03/09 (J. Prieta).
- Llegadas. 20 en Plasencia (CC) el 18/02/09 (J. Prieta) y 10 en Trujillo (CC) (S. Fletcher). Varios en Badajoz el 19/02/09 (J. C. Paniagua). 4 en Trujillo (CC) el 17/02/10 (S. Fletcher). Varios en Navalmoral de la Mata (CC) el 23/02/10 (J. Briz). Uno en Trujillo (CC) el 04/02/11 (R. Cabo) y 2 el 07/02/11 (M. Kelsey). En Trujillo (CC), 2 el 17/02/12 (G. Schreur) y 5 el 18/02/12 (M. Kelsey). Un macho de 2º año en Guijo de Coria (CC) el 18/02/12 (S. Mayordomo). Pareja en Badajoz el 20/02/12 (J. C. Paniagua) y en Plasencia (CC) el 22/02/12 (J. Prieta). Un macho en Plasencia (CC) el 10/01/13 (S. Z. E.). Uno en Madrigalejo (CC) el 14/01/13 (Á. L. Sánchez, B. Cienfuegos, D. Rivera). Un macho en Palomas (BA) el 27/01/13 y otro en Mérida el 31/01/13 (Á. Sánchez). 2 en Almendralejo (BA) el 29/01/14 (J. A. Román).
- Últimos registros. Uno en Plasencia (CC) el 16/09/09 (S. Mayordomo). Uno en El Gordo (CC) el 17/10/10 (J. Briz, V. Risco). Uno en Torre de Miguel Sesmero (BA) el 22/09/11 (J. Guerra, M. Gálvez). 6 en Las Canteras, Trujillo (CC), el 02/10/11 (J. Muddeman). Uno en Los Canchales (BA) el 20/09/12 (F. Montaña, F. Lopo, F. Castro, E. del Viejo, D. García). Uno en Badajoz (BA) los días 21/09/12 (A. Fernández) y 30/09/12 (J. Solana). 12 en Santa Marta de Magasca (CC) el 04/10/13 (M. Kelsey). Un macho en Don Álvaro (BA) el 12/10/13 (F. Crystal). Uno en Coria (CC) el 17/10/13 (J. J. Chaparro). Uno en Almendralejo (BA) el 24/10/13 (J. A. Román). En Badajoz (BA), 3 el 19/10/14 (J. Mazón y J. C. Paniagua) y uno el 25/10/14 (J. C. Paniagua). Un macho adulto en Campo Lugar (CC) el 28/10/14 (M. Kelsey).
- Invernada. 5 durante diciembre de 2010 en Acedera (BA) (M. Gómez Calzado). Uno en Mérida (BA) el 25/12/10 (Á. Sánchez). Uno en Jaraíz de la Vera (CC) el 26/12/10 (J. Collado). Uno en Navalmoral de la Mata (CC) el 06/11/12 (J. Briz). Un macho en Trujillo (CC) el 29/11/12 (G. Sánchez). Un macho en Los Canchales (BA) el 06/12/12 y en Montijo (BA) el 08/12/12 (J. Fernández). 4 machos en Valdivia (BA) el 08/11/13 (J. P. Prieto). Uno en Campo Lugar (CC) el 09/11/13 (A. Calvo). 4 en La Albuera (BA) el 05/11/14 (S. Molina, A. Pérez, Á. Sánchez).

Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus regional. Residente común (¿1.500-2.000? parejas) con tendencia estable. Más frecuente en invernada, con tendencia decreciente. Subespecie *F.t.tinnunculus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable” y fluctuante, con un porcentaje medio de cambio anual de $-0,7\%$ y total de -30% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de $-8,4\%$ y total de -44% (SEO/BirdLife, 2013b).

Cernícalo patirrojo (*Falco vespertinus*)

Estatus regional. Accidental. Trece registros de 15 ejemplares en 1989, 1992, 1994, 1998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012 y 2013; en abril, mayo (la mayoría), junio, septiembre y diciembre; y en Llanos de Brozas-Cáceres-Trujillo (mayoría), Arrocampo y La Serena. Irrupción en mayo de 2015 (29 ejemplares, 16 machos y 13 hembras). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Uno en el río Ayuela (CC) en mayo de 1989 (A. Acha y J. Acha). Un macho inmaduro en Brozas en mayo de 1992 (A. Acha y T. Velasco). Una hembra en Trujillo en mayo de 1994 (E. de Juana y J. M. Varela). Un joven el 09/05/94 en el río Salor, Cáceres (J. Hellmich y J.C. Núñez). Un macho en Trujillo en mayo de 1998 (Marcos). Un inmaduro en Cabeza del Buey el 04/12/02. Un macho en Sierra de Fuentes el 9/04/04 (A. Álvarez, I. Fabregat, J. Gil y J. Lorenzo). Uno en la carretera Trujillo-Monroy en junio de 2005 (Retamatour). Una pareja el 22/04/06 en los Llanos de Cáceres (S. Villa). Una hembra en Arrocampo el 21/05/07 (C. Jensen y N. Johnston).
- Seis nuevos registros (2012 y 2013). Un macho en Los Cerralbos, Trujillo (CC), el 17/05/12 (M. Kelsey). Una hembra en los llanos de Cáceres el 19/04/13 (J. Porras). Una hembra en Casatejada (CC) los días 01/05/13 (G. Gorospe; E. Pérez-Balsalobre, E. Palacios, I. Gallardo, M.García del Rey y S. Mayordomo), 02/05/13 (J. Briz), 03/05/13 (M. Á. Muñoz y V. Risco) y 04/05/13 (E. del Viejo, F. Montaña y G. Montaña). Otra hembra en Madrigalejo (CC) el 11/05/13 (M. Kelsey). 3 en el Parque Natural de Cornalvo (BA) el 23/09/13 (D. Recio). Un macho en Palazuelo (BA) el 17/11/13 (J. L. Pérez Chiscano).

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus regional. Invernante común (¿300-500? ejemplares) con fluctuaciones y tendencia incierta. Subespecies *F.c.aesalon* (Europa continental, Gran Bretaña) y *F.c.subaesalon* (Islandia).

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- **Tendencia.** En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4% y total de -34% (SEO/BirdLife, 2013b).
- **Llegadas.** Una hembra en Guijo de Coria (CC) el 28/09/09 (J. Mahillo). Una hembra/joven en Galisteo (CC) el 04/10/10 (S. Mayordomo). Una hembra/joven en Guijo de Coria (CC) el 13/10/10 (J. Prieta). Uno en Belén, Trujillo (CC), el 19/09/11 (M. Kelsey). Uno en Trujillo (CC) el 8/10/11 (J. Muddeman). Uno en La Haba (BA) el 13/10/12 (F. J. Morcillo). Uno en Galisteo (CC) el 16/10/12 (S. Mayordomo). El 11/10/13, uno en Malpartida de Plasencia (CC) (A. Rodríguez), otro en Torrefresneda (BA) (J. G. Aparicio) y una hembra en Campo Lugar (CC) y otra en Vegas Altas (BA) (J. Porras). Un macho y una hembra en Los Canchales (BA) el 15/10/13 (F. Crystal). Uno en Guijo de Coria (CC) el 27/09/14 (J. Prieta). Uno en Galisteo (CC) el 28/09/14 (J. Mahillo).
- **Últimos registros.** Una hembra/joven en Saucedilla (CC) el 06/03/09 (S. Mayordomo). Uno en San Vicente de Alcántara (BA) el 05/04/10 (J. Gordillo). Un joven en Guijo de Coria (CC) el 07/04/10 (J. Prieta). Un macho en Trujillo (CC) el 29/03/11 (M. Kelsey). Una hembra en Zorita (CC) el 08/04/12 (M. Kelsey). Una hembra/joven en Valdesalor (CC) el 09/04/12 (S. Mayordomo). Uno en Madrigalejo (CC) el 22/03/13 (M. Kelsey). Uno en Llerena (BA) el 24/03/13 (A. Cama, M. Pauli, M. Gálvez y J. Guerra). Uno en Sierra de Fuentes (CC) el 12/04/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Una hembra en Zafra (BA) el 19/04/14 (A. Giraldo y A. M. Sánchez). Una hembra en La Serena (BA) el 01/05/14 (F. Bernáldez, M. Gálvez y F. Macías).

Alcotán europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (50-170 parejas en 2010; el 4% de España) con tendencia desconocida, quizás negativa. Migrante común. Subespecie *F.s.subbuteo*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Población reproductora.** En 2009-2010 tiene lugar un sondeo nacional de siete rapaces diurnas forestales (Palomino y Valls, 2011), entre ellas el alcotán europeo. La población estimada es de 170 territorios (rango

140-200), el 3'9% del total español (4.410 territorios). La densidad media fue de 0'4 territorios/100 km², por debajo de la media nacional (0'9). Badajoz acoge 120 territorios y Cáceres 50. Las densidades (0'55 en Badajoz y 0'26 en Cáceres) están entre las menores de España. Detectado en el 7% de las cuadrículas oteadas (6% de Badajoz y 10% de Cáceres). Se distribuye de modo irregular, con mayores probabilidades de observación en la mitad oriental de Badajoz y sureste de Cáceres. Hay núcleos menores en las vegas del Guadiana y el centro de Badajoz. Presencia en pinares del Sistema Central, donde parece estar en declive, y en pinares del Tiétar y de Monfragüe, con una densidad localmente elevada. Los transectos en vehículo no son adecuados para estudiar esta rapaz de hábitos discretos. Sólo se vieron 2 alcotanes de media cada mil kilómetros, idéntico a la media de España. Detectado en el 7% de las cuadrículas muestreadas (3% en Badajoz y 11% en Cáceres). La tendencia en España es desconocida, aunque el programa SACRE, poco adecuado para esta especie, señala un declive de -56% entre 1998 y 2010.

- Época de cría. En Las Hurdes (CC), cazando libélulas: uno en Nuñomoral (CC) el 21/06/11 y 3 en el frente de un incendio el 12/08/13 (A. Pacheco). En Gabriel y Galán (CC), uno el 17/06/09 (R. Montero) y con comportamiento reproductivo el 01/07/09 (J. Montero). Uno en Montehermoso (CC) el 11/06/14 (C. Clemente y J. Mahillo). En La Garganta (CC), uno el 24/07/11 (R. Montero) y el 21/06/14 (V. de Alba y A. Núñez). En Villanueva de la Vera (CC), uno captura un abejaruco el 07/07/09; uno el 28/05/11 y el 02/06/11; uno el 15/05/13 y 27/05/13; y uno el 01/09/14 (D. Langlois). 2 en La Vera Alta (CC) el 25/05/14 (P. Gómez). En Monfragüe (CC): en el pinar de Serradilla (CC) un adulto el 27/05/09 y el 25/05/13 y varias citas entre 2009 y 2014 de al menos 2 territorios (J. Prieta); en la Portilla del Tiétar uno el 22/06/09 (J. Guerra y M. Gálvez); y 2 en el Parque el 31/05/13 (M. Kelsey). En pinares del Tiétar (CC): un adulto en pinar de Malpartida de Plasencia el 11/06/09; una pareja en el pinar de Mirabel, Toril, en mayo-julio de 2009 (J. Prieta); en el pinar de Majadas, un adulto el 12/05/13 y el 29/05/13 (J. Prieta), 3 el 23/06/13 (C. Clemente y S. Mayordomo), uno el 30/06/13 (E. Palacios y S. Mayordomo) y uno el 12/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios); el 22/05/11, 3 en el pinar de Talayuela (CC) (J. Calle), en este pinar hay numerosas observaciones de quizás 3 territorios; para el conjunto de los pinares del Tiétar se estiman 6-12 parejas (J. Prieta). En las vegas del Alagón (CC): una pareja en el arrozal de Riobobos el 29/05/13 (S. Mayordomo) y un adulto herido en Torrejoncillo (CC) el 08/05/13 (R. Granados). Uno sobre el Pico Villuercas (CC) el 16/06/13 (M. Kelsey). En la provincia de Badajoz: uno en Valverde de Mérida (BA) el 14/06/12 (F. Montaña), uno en Alange (BA) el 20/05/13 (M.

Gálvez) y uno en Valencia de las Torres (BA) el 19/05/13 (L. Alcántara y M. Gálvez).

- Llegadas. Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 04/05/09 (D. Langlois). Uno el 04/05/10 en Arrocampo (G. Schreur). Uno en la presa del embalse de Valdecañas (CC) el 14/05/11 (G. Schreur). Uno en Alange el 18/05/11 y otro en Santa Marta de Magasca el 19/05/11 (Martin Kelsey). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 24/03/12 (D. Langlois). Uno en Toril (CC) el 08/04/12 (H. Sánchez). Uno en Plasencia (CC) el 26/04/12 (R. Montero). El 28/04/12 uno en Gabriel y Galán (CC), otro en La Granja (CC) y otro en Talaván (CC) (R. Montero). El 29/04/12 uno en Naval Moral de la Mata (CC) (J. Briz) y 2 en el pinar de Majadas (CC) (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Zorita (CC) el 05/05/12 (J. Muddeman). Uno en Plasencia (CC) el 08/05/12 (S. Mayordomo). Uno en Llanos de Cáceres el 27/05/12 (J. Julián e I. Solana). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 17/04/13 (D. Langlois). 2 en el puerto de Tornavacas (CC) el 25/04/13 (J. Muddeman). 2 en Alange (BA) el 30/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Medina de las Torres (BA) el 02/04/14 (F. Montaña y J. A. Román). Uno en Caminomorisco (CC) el 09/04/14 (A. Pacheco). Uno en San Vicente de Alcántara (BA) el 29/04/14 (H. Dalmau y J. Gordillo).
- Últimos registros. Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 26/08/10 (J. Gayo). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 27/08/10 (M. Kelsey). Uno en El Gordo (CC) el 17/10/10 (J. Briz y V. Risco). Uno en Majadas (CC) el 14/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). 3 en el puerto de Esperabán, Pinofranqueado (CC), el 05/10/11 (A. Pacheco). Uno en Palazuelo (BA) el 07/10/11 (S. Fletcher). Uno cazando con éxito golondrinas en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 23/08/12 (J. Prieta). Uno en el puerto de Esperabán (CC), el 01/09/12 (A. Pacheco). Uno en Guijo de Granadilla (CC) el 04/09/12 (R. Montero). Un adulto y un joven en Villanueva de la Vera (CC) el 27/09/12 (D. Langlois) y dos jóvenes el 07/10/12 (P. Gómez). Un adulto y un joven en el puerto de Esperabán (CC), el 08/10/12 (A. Pacheco). Un joven en Orellana (BA) el 17/10/12 (F. Rodríguez y Á. L. Sánchez). Uno en el puerto de Esperabán (CC) el 16/09/13 (A. Pacheco). 2 adultos y un joven en Villanueva de La Vera (CC) el 24/09/13, 3 el 05/10/13 y uno el 10/10/13 (D. Langlois). Uno en Alía (CC) el 06/10/13 (J. Á. Herrera y N. Baeza). Uno en Jerez de los Caballeros (BA) el 07/10/13 (F. Montaña). Uno en Monfragüe (CC) el 08/10/13 (J. Muddeman). Uno en Los Canchales (BA) el 12/10/13 (F. Lopo, J. G. Aparicio, J. Guerra, L. Gómez y M. Gálvez). Uno en Montehermoso (CC) el 13/10/13 (C. Clemente y J. C. López). Uno en Navezuelas (CC) el 17/10/13 (Á. Sánchez). Un joven ingresa herido en AMUS, Villafranca de los Barros (BA), el 07/10/14 (AMUS). Un adulto

en la sierra del Castellar, Zafra (BA), el 12/10/14 (F. Montaña y G. Montaña). Uno entre La Roca de la Sierra y Villar del Rey (BA) el 13/10/14 (J. Tarrío). Uno en el campus universitario de Cáceres el 14/10/14 (P. Herrador). 2 en Berzocana (CC) el 31/10/14 (H. Zweers).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros: septiembre de 1992 en Navalvillar de Pela y junio 2002 en Valverde de La Vera. Una cita de cinco aves en julio de 2015 en La Serena. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Uno oscuro en Navalvillar de Pela en septiembre de 1992 (E. Sánchez y B. Zofo). Uno claro el 30/06/02 en Valverde de la Vera (D. Langlois).

Halcón borní (*Falco biarmicus*)

Estatus regional. Accidental. Seis registros de inmaduros, el primero en 1992 y tres en 2013. Posible dispersión juvenil regular de la subespecie *F. b. erlangeri* (norte de África) a zonas esteparias extremeñas.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos. Uno en mayo-junio 1992 en La Serena (M. Calderón, R. Munheim). Uno el 08/05/97 en Cabeza de Buey (J.E. Capilla). Un juvenil *erlangeri* en Cáceres el 24/08/07 (R. Tonel).
- Revisión. Reproducción en España con datos seguros (puestas, nidos) en Doñana hasta finales del siglo XIX y citas en el siglo XX en Doñana (1954), Almería y Baleares (intento de cría en 1971). Decenas de citas en el Estrecho de Gibraltar, sobre todo en fechas de paso (marzo-mayo y agosto-octubre), que confirman el movimiento regular hacia y desde África. Seis registros en Extremadura, cinco en zonas esteparias (La Serena, Cáceres-Trujillo, Cuatro Lugares) y uno en Plasencia. Por meses enero, mayo (3), junio (2) y agosto (8). Las aves datadas son siempre inmaduros. Este patrón sugiere la dispersión de aves no adultas desde el norte de África.
- Tres nuevos registros (2013). Un 1º invierno en Plasencia (CC) el 03/01/13 (S. Mayordomo y R. Montero). Un 2º año en Monroy (CC) el 04/05/13 (J. D. Andersen). Un subadulto *erlangeri* en Los Cerralbos, Trujillo (CC), el 10/06/13 (M. Kelsey, J. Walton y D. Walton).

Halcón sacre (*Falco cherrug*)

Estatus regional. Accidental. Un registro de un escape en La Serena en abril de 2007 y de un joven .

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primeros registros para Extremadura. Un ave con pihuelas, por tanto de origen cautivo, en La Serena (BA) el 22/04/07 (J. Ballegaard y A. Sand Kirk). Una hembra juvenil (“Piros”) marcada con GPS el 03/06/09 en Hungría pasa por Extremadura: el 14/09/09 entra por Puerto de Béjar (CC) y pernocta en el centro de badajoz; el 15/09/09 continúa hacia el sur para dormir en Doñana. Se encontró muerto por causas desconocidas en Mauritania el 24/09/09 (Comité de Rarezas de SEO/BirdLife).

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus regional. La subespecie *brookei* es residente escaso (55-65 parejas en 2008, 1'6% de España). Invernada escasa de las subespecies *F.p.peregrinus* y *F.p.calidus*. Tendencia desconocida, aunque aparentemente estable.

Criterio. Época de cría y todas las observaciones en Badajoz.

- Registros de interés. Una pareja en Monesterio (BA) el 12/07/10 y una pareja y 2 pollos el 02/08/10; es el primer territorio conocido en el extremo sur de Badajoz y en toda Sierra Morena Occidental. Una pareja en Tentudía (BA) del 15/07/11 al 17/09/11 (A. Pacheco). Uno transportando una paloma o una perdiz en Badajoz el 18/04/11 (Á. Sánchez y J. Fernández).

Rascón europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus regional. Residente común (¿1.000? parejas), con tendencia desconocida, quizás estable. Llegada de invernantes. Subespecie *R.a.aquaticus*.

Criterio. Citas de interés.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta discreta especie, quedando muy infravalorada. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 5 en 2009, 28 en 2010, 16 en 2011, 7 en 2012, 8 en 2013 y 25 en 2014 en 3-9 localidades cada año.

Polluela pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus regional. Escasa en migración. 27 registros en 1979, 1981, 1997, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013 y 2014; entre febrero y junio, excepto uno en septiembre; en Arrocampo y entorno (11), Talaván (3), Galisteo (2), Mérida (2), Badajoz (2), Guareña (1), río Zújar (1), Casas de Hitos (1), Los Canchales (1), El Millar-Cáceres (1), Malpartida de Cáceres (1) y Casas de Belvís (1). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Una en Botoa en febrero 1979 y una en Gévora-Guadiana en junio 1981 (F. de Lope). Una en Mérida del 27 al 31/03/97 (J.M. Benítez). Una del 22/03 al 02/04/98 en Los Canchales (E. Costillo). Una en Talaván en 1998 (J. Arias). Una en la presa del Zújar el 22/03/00 (D. Rees). Una el 1/04/00 en Malpartida de Cáceres (S. Villa). Una el 19/03/03 en Arrocampo (J. Briz y E. Fernández-Larreta). Una en El Millar, Cáceres, el 26/02/05 (C. Fernández). Una en Talaván el 20/03/05 (M. Gálvez). En Arrocampo una el 24/03/05 (J. Calle), otra diferente el 25/03/05 (SWT), una el 2/04/05 (J. Muddeman) y una el 20/04/05 (Audouin BT). En Casas de Hitos una el 23/09/07 (M. Kelsey). Una en Talaván el 15/02/08 (M. Kelsey). Una en Cerro Alto, Saucedilla, el 17/02/08 (D. Langlois y S. Langlois). Una en Casas de Belvís del 7 al 12/05/08 (J. Briz).
- Nueve registros, en febrero-abril de 2012-2014. En Arrocampo (CC), una el 13/03/09 (S. Fletcher), una el 22/03/09 (D. Langlois y S. Langlois), 2 el 05/04/09 y una el 08/04/09 (R. Montero). 2 oídas en la Gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 18/02/12 y una en Arrocampo (CC) el 24/02/12 (S. Mayordomo). Una en la laguna de Galisteo (CC) los días 06/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 07/04/12 (C. Clemente). Una en Guareña (BA) el 25/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en el embalse de Montijo, Mérida (BA), el 10/04/14 (J. Guerra).

Polluela bastarda (*Porzana parva*)

Estatus regional. Esporádica en migración. Nueve registros; en 2002 (3), 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 y 2014; en marzo (3), abril (4), octubre (1) y diciembre (1); en Vegas Altas (3), Arrocampo (3), Herguijuela (1), Talaván (1) y Valverde de Mérida (1). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. En Arrocampo un macho el 30/03/02 (Travelling N.); una hembra en abril 2002 (J. Porras); y una pareja en abril 2002 (J. Muddeman). Un macho del 4 al 6/04/04 en Herguijuela (J. Muddeman). Una en Madrigalejo el 3/12/05 (J. Andersen). Un macho en Talaván el 19/04/07 (J. Pérez), el 18/10/08. Una oído en Casas de Hitos y 3 en Moheda Alta (Pardillos de El Pardo).

- Dos nuevos registros. Una oída en Yelbes (BA) el 19/03/10 (Á. Díaz, B. Vigalondo, J. Fernández y M. Llorente). Un macho en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA) el 27/03/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y el 28/03/14 (E. Amengual, V. de Alba, M. Gálvez, F. Lopo, F. Montaña, A. Núñez y J. Solana).

Polluela chica (*Porzana pusilla*)

Estatus regional. Esporádica en migración. Siete registros; en 1973, 2002 (2), 2005 (2), 2008, 2010 y 2011; en febrero (1), marzo (1), abril (2), mayo (1) y agosto (2); en Arrocampo (3), Vegas Altas (2) y Badajoz (2). Subespecie *P.p.intermedia*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Uno en La Guarda, agosto 1973 (L. F. Basanta). En Arrocampo, un macho el 8/03/02 (J. Muddeman y R. Bradbury) y el 23/03/02 (J.M. Traverso). Uno en el embalse de Nogales el 08/02/05 (F. Montaña y J. Vázquez). Uno en Arrocampo el 5/05/08 (J. Ortas).
- Dos nuevos registros. Una en Moheda Alta (BA) el 31/08/10 (X. Piñeiro). Una en el río Gargáligas, Acedera (BA), el 8/04/11 (J. Muddeman) y junto a *otra dudosa entre chica y bastarda* el 13/04/11 (S. Fletcher). *Una dudosa con polluela bastarda en arrozales de Palazuelo* (BA) el 26/05/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano).

Guión de codornices (*Crex crex*)

Estatus regional. Accidental, quizás muy escasa en paso. Cinco registros, uno en 1998 y cuatro en 2012-2014, todas aves cazadas o accidentadas en la provincia de Badajoz entre octubre y enero. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro anterior. El 16/01/98 uno accidentado en Bienvenida (F. Montaña).
- Nuevos registros. Uno cazado en Villagonzalo (BA) el 02/12/12 (com. T. Montalvo). Uno cazado en rastrojo de maíz en Badajoz (BA) en noviembre de 2013 (com. J. M. Benítez). Uno cazado en Torremayor (BA) el 26/10/14 (com. A. Fernández). Uno cazado en un cultivo de alfalfa en Los Alisares, Mérida (BA), el 30/11/14 (com. A. Fernández).

Gallineta común (*Gallinula chloropus*)

Estatus regional. Residente abundante (10.000 individuos y 3.000 parejas en 2007) con tendencia desconocida. Subespecie *G.c.chloropus*.

Criterio. Cifras destacables (>50).

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta discreta especie, quedando muy infravalorada. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y SEO/BirdLife (2012-2014) se vieron 38 en 2009, 28 en 2010, 781 en 2011, 543 en 2012, 469 en 2013 y 442 en 2014 en un máximo de 38 localidades por año. El aumento observado se debe a la diferente calidad de los censos, siendo en todo caso las cifras una fracción no determinada de la población total.

Calamón común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus regional. Residente escaso (250 individuos y 50-100 parejas en 2007, 5% de España) con tendencia creciente. Subespecie *P.p.porphyrus*.

Criterio. Todas las observaciones fuera de Arrocampo, Mérida y Badajoz.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta discreta especie, quedando muy infravalorada. No obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) no fue detectada y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se anotaron 32 en 2012, 56 en 2013 y 82 en 2014 en 4-5 localidades por año. El aumento observado se debe a la diferente calidad de los censos. Las localidades principales son el embalse de Arrocampo y humedales de su entorno, el embalse de Montijo y el azud de Badajoz.
- Nuevas localidades. En Galisteo (CC): en la gravera Valdefuentes uno el 08/08/10, el 12/11/10 y el 02/12/10; uno el 30/05/12 (S. Mayordomo) y uno el 18/01/14 (C. Clemente); en la laguna de Galisteo uno el 05/10/11 (J. Briz y V. Risco), uno el 26/04/13 (S. Mayordomo) y uno entre el 24/06/14 y el 28/07/14 (J. Prieta y S. Mayordomo); en la gravera de Viñuelas dos el 05/04/14 (S. Mayordomo), el 10/04/14 (J. Prieta) y el 20/07/14 (S. Mayordomo). En Charco Salado, Casatejada (CC), 2 adultos y 2 pollos grandes el 26/07/11 (S. Mayordomo) y uno el 02/08/11 (E. Palacios, J. Briz, S. Mayordomo y V. Risco). Uno en el embalse de Talaván (CC) el 30/04/11 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en las balsas de Sierra de Fuentes (CC) el 14/01/13 (A. Maestre y J. J. Espinegoita). Uno en Miñajadas (CC) el 18/01/12 (J. Caldera y Á. Sánchez). Uno en el río Guadiana, Talavera la Real (BA), el 04/05/11 (G. Schreur). Uno en el embalse de Morantes (BA) el 7/02/11 (Á. L. Sánchez).
- Arrocampo. Fechas de interés: un adulto y un pollo el 14/11/10 (J. Briz) y un adulto y 3 pollos pequeños el 25/02/14 (M. Viskens).

Focha común (*Fulica atra*)

Estatus regional. Residente común (3.000 individuos y 1.000 parejas en 2007) con tendencia desconocida. Invernante común (4.400 aves en 2009-2014), con fluctuaciones y tendencia decreciente a largo plazo (-30%, 1990-214) y estable a corto plazo. Subespecie *F.a.atra*.

Criterio. Cifras destacables (>100 ejemplares).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife arrojan valores para Extremadura de 5.399 individuos en 2009, 3.193 en 2010, 1.269 en 2011, 4.998 en 2012, 5.527 en 2013 y 5.876 en 2014 (media 4.377 aves). Las localidades que superan el millar de aves son los embalses de Orellana (2.155 en 2013), Alange (1.195 en 2009; 1.357 en 2010), La Serena (1.303 en 2009) y Sierra Brava (1.250 en 2014). Y superan 500 fochas los embalses de Villalba de los Barros, García Sola y Alqueva. La tendencia es estable o levemente negativa en la región, pasando de 4.900 aves de media y máximo de 7.700 en el periodo 2005-2008 a 4.400 aves de media en 2009-2013 (-10%); aunque es posible que las diferencias se deban al diferente esfuerzo de censo. A más largo plazo, se aprecia un mayor declive, pues la media en 1990-1995 fue de 6.200 aves, en 2005-2008 de 4.900 aves y en 2009-2014 de 4.380 (-30%).

Focha moruna (*Fulica cristata*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Talaván en marzo de 2008. A partir de 2012 se ve en todos los meses del año, con citas en 11 localidades de 15 aves diferentes, seis de ellas marcadas con collar y nacidas en La Cañada de los Pájaros (Sevilla). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Una con collar W[00T] en el embalse de Talaván el 19/03/08 (M. Curiel y M. Pérez Visus).
- Registros 2012-2014. Embalse de Llerena (BA), una con collar el 05/06/12 (J. Vázquez y F. Montaña). Embalse de Valdecañas (CC), una los días 23 (S. Mayordomo) y 24/11/12 (V. Risco, J. Briz, E. Palacios, M. Á. Muñoz). Lagunas de La Albuera (BA): una con collar del 06/07/13 (J. M. Mirasierra, M. Mirasierra, J. C. Paniagua) al 09/09/13 (S. Pérez Gil, A. Núñez, V. de Alba, F. Montaña, J. A. Román, F. Bernáldez, F. Macías); otra sin collar el 05/09/13 (J. Guerra); dos, una con collar, el 08/03/14 (P. Mangas, C. Montaña, A. Núñez), el ejemplar sin marcar sigue el 03/04/14 (G. Gahete, F. Montaña, V. de Alba, M. Gálvez, J. Guerra, L. Alcántara). Balsas de Sierra de Fuentes (CC), una los días 06

y 17/04/14 (C. de Andrés). Charca de Zorita (CC), una pareja territorial el 23/04/14, una de las aves con collar (B. Dijks); el ave sin marcar se ve hasta el 04/05/14 y el ejemplar con collar hasta el 14/06/14 (M. Kelsey, E. Owen, S. Mayordomo, C. Clemente, M. Á. Muñoz, E. Palacios). Charca de Torrealba, Torremocha (CC), una el 31/05/14 (S. Mayordomo y C. Clemente). Charca del Pueblo, Malpartida de Cáceres (CC), una del 15/10/14 al 31/03/15 (G. Schreur, J. Tarrío, J. L. Bautista, I. Jerez, R. Montero, J. Wiskens, Wiskens, A. Galán, J. M. Jiménez, P. Herrador, J. Porras, S. Molano, A. Cebrián, F. Martín, J. Prieta, E. Palacios, N. Renwick, J. Gutiérrez, M. Kelsey). Charca de Esparragalejo, una el 14/04/14 y días previos (A. Gil).

Grulla común (*Grus grus*)

Estatus regional. Invernante abundante (133.000 ejemplares en 2014/2015; el 55-65% de España y el 35% de la ruta europea occidental) con tendencia creciente (+62% en 2007-2015). Presencia esporádica de aves estivales. Subespecie *G.g.grus*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Censos de población invernante, 2012-2015. Tras varios años sin realizarlos (desde 2007), se han retomado los censos coordinados en Extremadura (Román *et al.*, 2014a, 2014b, Román, 2015). La metodología empleada es el recuento en dormideros a excepción de la Zona Centro (CC-BA) donde se hacen censos diurnos desde vehículos. Los resultados son los siguientes: 101.300 grullas en diciembre de 2012, 128.850 en diciembre de 2013, 107.925 en enero de 2014, 121.341 en diciembre de 2014 y 132.902 en enero de 2015. Este último es el máximo histórico. La Zona Centro acoge la mayor parte de la población extremeña (65%), con cifras para las mismas fechas de 63.207, 83.132, 63.745, 83.982 y 86.109. En la cuenca del Tajo el máximo es de 29.525 grullas en diciembre de 2013 y en el resto de la cuenca del Guadiana de 23.030 en enero de 2015. La tendencia es claramente positiva, con un fuerte aumento desde diciembre de 2007 (+62% en 7 años; +50.000 grullas), aunque hay que tener en cuenta la diferente metodología en Zona Centro y el mayor esfuerzo en los muestreos recientes. El aumento es de +125% en la Zona Centro y de +60% en el norte de la cuenca del Tajo, en contraste, la población disminuyó en la mitad sur de las cuencas del Tajo (-22%) y del Guadiana (-55%) entre 2007 y 2015. Asimismo se han llevado a cabo censos a escala nacional, aunque con cobertura variable. Máximo en diciembre de 2013, 223.639 grullas. La población extremeña supone un 55-65% en los censos de 2012-2015.

- Tendencia. En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4% y total de +21% (SEO/BirdLife, 2013b).
- Llegadas. Varias en Arroyo de la Luz (CC) el 13/09/09 (F. Carrero). Varias en Valdecañas (CC) el 13/10/09 (C. González). 13 sobre Trujillo (CC) el 09/10/10 (M. Kelsey). El 29/10/10 en la Zona Centro (BA/CC) se estiman 17.822 (M. Gómez Calzado). 2 en la Zona Centro (BA) el 06/10/11, 24 al día siguiente y 8.805 el 21/10/11 (M. Gómez Calzado y M. Gómez Guarín). 5 en Palazuelo (BA) el 07/10/11 (J. Muddeman y S. Fletcher). 9 en el embalse de Gabriel y Galán (CC) el 08/10/11 (Ch. Casado y M. Arcas). 10 en El Borbollón (CC) el 09/10/11 (G. Naharro). El 15/10/12 una en Los Canchales (BA) (J. Solana) y 4 en Vegas Altas (M. Gómez Calzado). 2 en el embalse de El Borbollón (CC) el 17/10/12 (G. Naharro y D. J. Cordobilla). El 31/10/12 se censan 18.065 en la Zona Centro (CC-BA) (M. Gómez Calzado y J. A. Román). 20 sobre Plasencia (CC) el 29/09/13 (J. Parra). 10 sobre Cáceres el 02/10/13 (A. Domínguez). Una en el Tietar, Malpartida de Plasencia (CC), el 03/10/13 (J. Manzano y J. Ó. Carretero). 2 adultos en Gabriel y Galán (CC) y una en Jarilla (CC) el 05/10/14 (J. Prieta). 35 en Los Canchales (BA) el 10/10/14 (J. L. Bautista).
- Registros estivales (mayo a agosto). Una en Oliva de Plasencia (CC) desde el 12/06/10 (R. Montero) al 28/08/10 (J. C. Paniagua, R. Montero, E. Palacios, J. L. Rivero y otros). Una en Madrigalejo (CC) el 04/06/11 (P. Tapia). Una adulta en Gabriel y Galán (CC) el 09/06/11, el 01/08/11 y el 02/09/11 (A. Pacheco). Una en Casas de Hitos (BA-CC) el 03/07/11 (M. Kelsey). 2 adultos en Monroy (CC) el 30/07/11 (M. de Hauwae) y el 14/09/11. 2 en El Borbollón (CC) el 30/09/11 (G. Naharro), una lleva desde abril y la otra fue liberada por un centro de recuperación. En Moheda Alta (BA) 6 desde abril que siguen el 11/05/13 (M. Kelsey), 4 el 09/06/13 y 2 el 23/06/13 (M. Kelsey). 2 todo el verano de 2014 en Membrío (CC) (com. H. Dalmau). Una con problemas para volar en la Isla del embalse de El Borbollón (CC) el 12/04/11 (J. Prieta, S. Mayordomo y J. Montero).
- Últimos registros. 20 sobre Monfragüe (CC) el 08/03/09 (S. Mayordomo). 9 en Madrigalejo (CC) el 02/04/10 (M. Kelsey). 3 en Campo Arañuelo (CC) el 04/04/10 (J. P. Resino). Una en Mohedas de Granadilla (CC) el 01/04/11 (A. Pacheco). Una en Arrocampo (CC) el 08/04/11 (M. Kelsey). En Talaván, un juvenil el 21/04/11 (E. Palacios y S. Mayordomo) y 24/04/11 (J. Esteban). 2 adultos y 2 jóvenes en Los Canchales el 28/03/12 (E. del Viejo). 2, una coja y otra con la garganta hinchada, en Malpartida de Plasencia (CC) el 02/04/12 (M. Á. Muñoz y

D. González). En Moheda Alta (BA): 2 adultos y 2 juveniles el 21/04/13; una familia de 4 más 2 jóvenes, uno sin una pata, el 27/04/13; y la familia con 3 miembros y los 2 jóvenes el 02/05/13; un juvenil el 10/04/14 (M. Kelsey). Una en Sierra Brava (CC) el 16/04/14 (J. P. Prieto). 5 sobre Plasencia (CC) el 17/04/14 (E. Palacios).

Grulla canadiense (*Grus canadensis*)

Estatus regional. Accidental. Un registro entre noviembre de 2011 y enero de 2012 en Don Benito.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primer registro en España y Extremadura. Una entre Palazuelo y El Torviscal, Don Benito (BA), el 04/11/11 (M. Gómez Calzado) y nuevamente en Hernán Cortés, Don Benito (BA), el 02/01/12 (J. A. Román). Presuntamente este ejemplar se observa en paso prenupcial en Gallocanta en febrero de 2013 y 2014, por lo que es probable que siga pasando los inviernos en Extremadura (Rare Birds in Spain).

Grulla damisela (*Grus virgo*)

Estatus regional. Extinguida como reproductora (último dato de 1924). Accidental, origen desconocido. Un registro en febrero de 1996 en Logrosán (CC). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Una el 16/02/96 y días anteriores en Logrosán (M. Gómez Calzado y L. Lozano).

Sisón común (*Tetrax tetrax*)

Estatus regional. Reprodutor común (8.000-13.700 ejemplares en 2014) con tendencia decreciente (-37% en 2005-2014). Común en invierno (4.000 ejemplares en 2014) con tendencia muy negativa (- 45-65% en 2005-2014). Efectúa movimiento complejos, una pequeña parte de la población es sedentaria, otra parte efectúa desplazamientos estivales, otra ocupa tres zonas anuales con movimientos estivales e invernales y las hay que crían fuera e invernán en Extremadura. Monotípica.

Criterio. Citas en localidades donde es escasa, cifras destacables (>25 ejemplares).

- Población en 2014. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014).

En el censo invernal se contabilizaron 815 ejemplares con una estima de 1.877-2.000 dentro de Red Natura y 3.800-4.000 en toda la región. Por ZEPA (primera cifra, censo y segunda, estima) los resultados fueron: La Serena (186-315), Alcántara-Brozás (72-280), Campiña Sur (31-250), Llanos de Cáceres (108-205), Dehesas de Jerez (91-153), Palazuelo (69-125), Magasca (51-118), Trujillo (36-114), La Albuera (40-62), Zorita (60-173), Orellana-Sierra de Pela (42-53) y Talaván (29-29). La tendencia invernal es muy negativa, con un declive del 43-65% si se compara con el censo de 2005. En el censo primaveral se contabilizaron 278 ejemplares, de ellos 240 eran machos, con una estima de 3.957 machos y 6.784 individuos dentro de Red Natura y 8.000 machos y 13.720 ejemplares en toda la región. Por ZEPA, las estimas de población son las siguientes: La Serena (2.025), Llanos de Cáceres (1.850), Campiña Sur (770), Alcántara-Brozás (680), Magasca (330), La Albuera (300), Zorita (300), Orellana-Sierra de Pela (250), Talaván (150), Trujillo (100) y Dehesas de Jerez (45). La tendencia en época de reproducción es negativa, con un declive del 37% en relación al censo de 2005.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de $-2,7\%$ y una reducción poblacional de -41% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros de interés. Año 2009. 170 en Belén, Trujillo (CC), en enero 2009 (A. Howes). 29 en Guijo de Coria (CC) el 31/10/09 (S. Mayordomo). Año 2010. 67 en Vegas Altas (BA) el 06/12/10 (J. Porras). 60 en Campo Lugar (CC) el 19/12/10 (Á. Díaz). Año 2011. El 09/03/11, 10 en arrozales de El Batán (J. Prieta) y 8 entre Calzadilla y Huélagá (C. Clemente). 250 en alfalfa en Santa Amalia (BA) el 06/10/11 (F. Yuste). 120 en Zorita (CC) el 31/10/11 (M. Kelsey). 11 en Guijo de Coria (CC) el 08/11/11 (J. Prieta y S. Mayordomo). 300 en Belén, Trujillo (CC), el 25/11/11 (S. Fletcher). Año 2012. Bando de 700 en La Serena (BA) el 29/01/12 (S. Villa). En Guijo de Coria (CC), donde la especie dejó de criar hace una década, 2 machos territoriales el 02/04/12 (A. Pacheco), 2 machos y una hembra el 11/04/12 y un macho en cortejo y 2 hembras el 02/05/12 (J. Prieta). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 17/07/12 (S. Mayordomo y M. García del Rey) y 2 el 28/08/12 (S. Mayordomo). 16 en Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), el 18/11/12 (S. Langlois y D. Langlois). El 06/12/12 un bando de 420 en Cabeza del Buey (BA) y otro de 210 junto a 330 gangas ibéricas entre Cabeza del Buey y Castuera (BA) (J. M. Vadillo). Año 2013. Uno en vuelo sobre Casas del Castañar (CC) con rumbo norte hacia Ávila el 22/02/13 (J. Prieta). 17 en Valdecañas (CC) el 09/12/13 (J. Torfs y M. Viskens). 114 en Trujillo (CC) el 10/12/13 (M. Kelsey).

Avutarda común (*Otis tarda*)

Estatus regional. Residente común (3.300-3.600 en invierno y 2.100-2.200 en primavera de 2014; el 12% de España). Tendencia en declive (-25 a -36%). Varios patrones migratorios, desde aves sedentarias a otras que cambian de lugar en verano, otoño y/o invierno. Subespecie *O.t.tarda*.

Criterio. Cifras importantes (>25 ejemplares) y observaciones de interés.

- **Población en 2014.** En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014). En el censo invernal se contabilizaron 1.501 ejemplares, estimando 2.000 dentro de la Red Natura y 3.300-3.600 en toda la región. En primavera se censaron 1.776 aves en la Red Natura 2000 y se estimaron 2.100-2.200 a nivel regional. La tendencia es negativa: declive de 26-30% en época reproductora y de 30-36% en invierno. Ello supone pasar del 20-25% de España a la mitad, el 10-12%. Las mejores ZEPA en 2014 fueron (primeras cifras primavera y segunda invierno): Llanos de Cáceres (484-544 y 330), La Serena (397-417 y 182), Campiña Sur (156-165 y 269), La Albuera (224-251 y 220), Zorita (96-114 y 182) y Palazuelo (0 y 105), otras seis ZEPA acogían menos de 100 aves en ambas estaciones.
- **Población en Badajoz, 2011** (Sánchez y García-Baquero, 2012). En el censo realizado del 21 al 23 de marzo de 2011 se anotaron 1.653 ejemplares (677 machos, 691 hembras y 285 indeterminados). Es el cuarto censo efectuado en Badajoz (1988, 1993, 2002 y 2011). Aunque los valores de 1993 y 2002 fueron un 25% inferiores a los de 2011, se considera estable con tendencia a concentrarse en las mejores áreas en detrimento de los núcleos periféricos. De los seis núcleos descritos, los tres principales acogen el 90%, con tendencia al aumento en La Serena (501 individuos, +10%) y Badajoz sur (533 ind.; +12%) y a disminuir en La Campiña Sur (491 ind.; -14%). Igualmente, decrecen mucho los tres núcleos menores (Badajoz norte, Retamal y Villanueva del Fresno), que pasan de 283 aves a sólo 128 (-55%).
- **Cifras de interés.** En Santa Marta de Magasca (CC), 100 el 19/03/09 (M. Kelsey), 90 machos el 14/03/10 (R. Montero). En Llanos de Cáceres (CC): en Sierra de Fuentes 93 el 21/01/11 y 135 el 30/04/11 (M. Gálvez y J. Guerra), en La Pulgosa más de 100 el 05/11/12 (M. Kelsey), en los Llanos 113 el 20/12/13 (S. Mayordomo), en Torrequemada 134 el 16/11/13 (J-M. Breider y J. Rydström) y 50 en Torreorgaz el 02/04/10 (F. Carrero, J. Jaén y R. Parra). En Vegas Altas (CC-BA): en Madrigalejo 70 el 04/01/10 (J. M. Tapia y M. Jiménez) y 90 el 14/01/13 (J. Muddeman); en Palazuelo 52 el 24/01/10; en Vegas Altas (BA) 110 el 05/02/11 y 50 el 10/11/11 (M. Kelsey). En Valverde de Leganés (BA) 190 el 23/11/13 (G. Schreur y P. Schreur) y 153 el 10/03/14 (A. Cama, J.

Guerra, M. Gálvez y M. Pauly). En Granja de Torrehermosa (BA) 155 el 19/12/13 (M. Corvillo).

- Movimientos. 3 en Cerezo (CC) el 20/06/11 y uno en El Gasco (CC) el 26/06/11 (com. A. Pacheco). Una en vuelo al norte sobre el castillo de Monfragüe (CC) el 16/06/12 (S. Langlois). Un macho en Mohedas de Granadilla (CC) el 21/06/12 (A. Pacheco).
- Otros registros. 9 hembras y un pollo en Guijo de Coria (CC) el 21/06/12 (C. Clemente).

Ostrero euroasiático (*Haematopus ostralegus*)

Estatus regional. Accidental. Trece registros; en 1964, 1975, 1982 (2), 1984, 1994, 1999, 2004, 2008, 2011 y 2014 (3); en abril (1), julio (2), agosto (5), septiembre (3) y octubre (1); en Llanos de Cáceres (5), Arrocampo (1), Vegas Altas (3) y embalses del centro de Badajoz (3); individuos aislados excepto tres grupos de 2, 3 y 9 aves. Subespecie *H.o.ostralegus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros anteriores. Uno en el Guadina en agosto 1964 (J. L. Pérez Chiscano). Uno en Villanueva de la Serena en 1975 (J. L. Pérez Chiscano). 3 en el embalse del Salor y 9 en Malpartida de Cáceres en julio de 1982 (D. Navarro). Dos en Navalvillar de Pela en septiembre 1984 (J. J. Ferrero). Uno en el embalse del Salor el 22/09/94 (S. Lozano). Uno en Alcollarín el 25/08/99 (R. Martín y S. Ramiro). Uno en Los Canchales los días 9/08/04 y 11/08/04 (F. Prieto). Uno en Talaván el 22/09/08 (J. M. Benítez).
- Nuevos registros. Uno en vuelo sobre Arrocampo (CC) y posteriormente posado en Charco Salado, Casatejada (CC), el 12/10/11 (J. L. Guisado, M. García del Rey, P. Goñi y S. Mayordomo). 2 en el embalse de Villalba de los Barros (BA) el 05/04/14 (J. M. Álvarez). Uno en el embalse de Alange (BA) el 03/08/14 (F. Bernáldez y F. Macías). Uno en el embalse de Brovaes (BA) el 05/08/14 (V. de Alba, D. García y J. Vázquez).

Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*)

Estatus regional. Reproductor estival común (2.000 individuos y 700 parejas en 2007) con fluctuaciones y tendencia creciente. Frecuente en migración. Invernante regular común (1.800 ejemplares) con tendencia muy positiva. Subespecie *H.h.himantopus*.

Criterio. Fechas extremas, cifras de interés, invernada.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2011) arrojan valores para Extremadura de 311 individuos en

2009, 913 en 2010 y cero en 2011. Los censos de SEO/BirdLife (2012-2014) de 1.721 en 2012, 1.989 en 2013 y 1.810 en 2014 (media 1.840 aves). La principal localidad la conforman los arrozales de Vegas Altas, que concentran el 90-95% del total censado. Debido a la diferente metodología y esfuerzo de censo no es posible comparar censos en los distintos periodos. Las cifras de 2009-2011 son deficientes (en 2011 ni siquiera se anota la especie), y las anteriores a 2009 también (media de 108 aves en 1993-1995 y de 131 en 2005-2008). En cualquier caso, la tendencia es muy positiva, aunque quizás no tanto como las cifras indican (multiplica por 12 en 10 años). Aunque es posible que haya habido algunas aves invernantes con anterioridad, el fenómeno es relativamente reciente y guarda relación con el desarrollo de arrozales en las últimas décadas.

- Cifras de interés. En Valdecañas (CC) 274 el 20/06/11 (ECV11). 300 en el embalse del Cubilar (CC) el 28/07/11 (S. Mayordomo). En Santa Amalia (BA) 300 el 24/01/10, 250 el 11/03/10 (F. Yuste) y >1.000 el 30/12/10 (Á. Sánchez), 325 el 08/09/11, 350 el 28/07/12 (F. Yuste), 729 el 23/12/12 (Á. Sánchez) y >700 el 16/04/13 y el 30/10/13 (F. Yuste). En Casas de Hitos (BA-CC) 700 el 16/07/09 y 350 el 20/07/10 (M. Kelsey).

Avoceta común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus regional. Reproductora esporádica (un caso confirmado en 2006). Escasa en paso e invernada (15-162 ejemplares en 2009-2014), con tendencia estable. Monotípica.

Criterio. Censos en lek, agrupaciones (>25), citas en zonas marginales.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 89 individuos en 2009, 162 en 2010, 67 en 2011, 90 en 2012, 15 en 2013 y 28 en 2014 (media 75 aves). Las principales localidades son los arrozales de Vegas Altas y el embalse de Sierra Brava, que concentran el 90-100% del total censado. A pesar de que el esfuerzo de censo ha sido mayor en los últimos años, se aprecia una reducción muy apreciable en 2013 y 2014, que podría ser sólo una fluctuación temporal. A más largo plazo, la tendencia parece ser estable, pasando de una media de 24 aves en 1993-1995 a las 84 de 2005-2008 y las 75 de 2009-2014.
- **Invernada**.
2008/2009. En la laguna de Galisteo (CC) 1-6 entre el 17/01/09 y el 03/04/09 (J. Prieta y S. Mayordomo). En Dehesa Nueva, Saucedilla (CC), una el 16/01/09 (S. Mayordomo). En Charco Salado (CC) una el 16 y 20/01/09 (S. Mayordomo, J. Prieta). En Talaván (CC) 2-3 del 09 al

25/01/09 (C. Fernández y S. Mayordomo). En el embalse del Salor (CC) 9 el 25/01/09 (C. Fernández).

2009/2010. En la laguna de Galisteo (CC) 3 del 10/02/10 al 11/03/10 (J. Prieta, R. Montero y S. Mayordomo). Una en Brozas (CC) el 19/12/09 (S. Mayordomo). Una en Talaván (CC) el 04/12/09 (S. Mayordomo). En Arroyo de la Luz (CC) 7 el 11/12/09 (C. Fernández). En el embalse del Salor (CC) 17 el 11/12/09 (F. Carrero) y 6 el 20/12/09 (C. Fernández). En Sierra Brava (CC) 2 el 06/12/09 (A. Cama, J. Guerra, J. Merayo y otros). En Casas de Hitos (BA-CC) una el 25 y 28/01/10 (M. Kelsey). En Moheda Alta (BA) una el 05/12/09 (C. Clemente y S. Mayordomo). En Palazuelo (BA) **70** el 24/01/10 (M. Kelsey). En Santa Amalia (BA) 5 el 24/01/10 (F. Yuste). En el embalse de Tentudía (BA) 3 el 21/12/09 (A. Pacheco).

2010/2011. En el Alagón, Riomalo de Abajo (CC), 10 el 23/11/10 (A. Pacheco). En la laguna de Galisteo (CC) 3 el 02/12/10 (S. Mayordomo). En Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), 2 el 11/12/10 (D. Langlois, J. Briz y S. Langlois). El 22/01/11, **55** en Sierra Brava (CC) y 12 en Casas de Hitos (BA-CC) (SEO-Cáceres). En Palazuelo (BA) 6 el 14/11/10 (M. Kelsey). En Santa Amalia (BA) una el 30/12/10 (Á. Sánchez). En La Albuera (BA), 9 el 07/11/10 (J. C. Paniagua), 9 el 26/11/10 (J. P. Prieto) y 11 el 04/12/10 (J. C. Paniagua).

2011/2012. En Portaje (CC) una el 22/11/11 (J. Prieta y S. Mayordomo). En Gabriel y Galán (CC) 15 el 20/11/11 (C. Mills) y 8 el 19/12/11 (J. M. Diu y R. Montero). En Galisteo (CC), 2, una anillada en Francia y otra con una gran tumoración, el 25 y 26/11/11, y 1-3 del 21/12/11 al 26/02/12 (E. Palacios, S. Mayordomo, J. Prieta, C. Clemente y otros). En Moheda Alta (BA) 3 el 23/02/12 (M. Kelsey). En arrozales de Vegas Altas: en Puebla de Alcollarín (BA) 1-89 del 05/11/11 al 18/01/12 con máximos de **70** el 26/12/11 y **89** el 18/01/12 (J. P. Prieto, S. Mayordomo, J. Hernández, J. L. Barriga, J. L. Pérez Chiscano, E. del Viejo, J. C. Núñez, M. Cardalliaguet); en Palazuelo (BA) 1-37 del 13/11/11 al 14/01/12, con máximo de **37** el 14/01/12 (S. Mayordomo, J. Mahillo, E. Palacios y otros); y en El Torviscal (BA) 4 el 09/12/11 (J. P. Prieto). En Santa Amalia (BA) una el 28/12/11 (J. A. Román), 2 el 12 y 14/02/12 (F. Yuste) y 3 el 13/02/12 (E. del Viejo). En La Albuera (BA) **33** el 18/12/11 (A. Núñez, J. Solana y V. de Alba).

2012/2013. En Gabriel y Galán (CC) 8 el 30/11/12 (A. Maestre). En Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) 4 el 18/11/12 (C. Clemente) y 11 el 14/01/13 (J. P. Prieto y M. Cardalliaguet). En Los Canchales (BA) 9 el 01/12/12 (P. Herrador). El 18/11/12 se observan 2 en Santa Amalia (BA) (SEO-Badajoz). En La Albuera (BA) 4 el 22/01/13 (F. Montaña y J. Vázquez) y el 02/02/13 (SEO-Badajoz). En la laguna del Hueco, Azuaga

(BA), una el 16/02/13 (F. Montaña, G. Montaña, G. Gahete, M. Corvillo).

2013/2014. En Sierra Brava (CC), 14 el 22/11/13 (M. Kelsey). En La Albuera (BA), 2 el 23/11/13 (G. Schreur). En Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), **1-25** del 22/11/13 al 05/01/14, con máximo el 21/12/13 (M. Kelsey, J. P. Prieto, C. Clemente, S. Mayordomo, A. Calvo y otros). En Puebla de Alcollarín (BA), 3 el 08 y 12/01/14 (A. Gil y L. Alcántara). En Medellín (BA), una el 21/01/14 (F. Yuste). En Lugar Nuevo, Peraleda de la Mata (CC), una el 01/02/14 (S. Mayordomo).

2014/2015. En Villalba de los Barros (BA) una el 20/11/14 (J. M. Álvarez). En Peraleda de la Mata (CC) una el 24/11/14 (S. Mayordomo). En Sierra Brava (CC) 7 el 29/12/14 (M. Kelsey). En Gadiana del Caudillo (BA) 2 el 30/11/14 (J. L. Bautista). En Santa Amalia (BA) 8 el 20/11/14 (F. Yuste) y 5 el 04/12/14 (N. Renwick). En Brovales (BA) 9 el 15/12/14 (F. Montaña).

- **Paso prenupcial. 2009-2010.** En Casas de Hitos (BA-CC) 6 el 17/03/09 y 6 el 13/03/10 (M. Kelsey). En Los Arenales (CC) 4 el 17/04/10 (M. Cardalliaguet). **2011.** En la laguna de Galisteo (CC) 1-2 del 12/02/11 al 12/03/11 (J. Gayo, J. Prieta, S. Mayordomo y otros). En el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), 4 el 18/03/11 (R. Montero). En Casas de Hitos (BA-CC) 1-14 aves del 04/02/11 al 30/03/11 (S. Fletcher, M. Kelsey). **2012.** En Portaje (CC) una el 16/03/12 (S. Mayordomo). En Los Arenales (CC) una el 11/04/12 y el 27/05/12 (S. Mayordomo, J. Julián e I. Solana). En Moheda Alta (BA) 2 el 12/03/12 (G. Schreur). En Orellana (BA) 4 el 05/03/12 (Á. L. Sánchez). En El Paredón, Campanario (BA), una el 14/03/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano). En Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), 2-5 del 04/05/12 al 26/05/12 (M. Kelsey, J. Muddeman, J. P. Prieto). **2013.** En El Batán (CC) 2-3 del 21/03/13 al 02/04/13 (C. Clemente, E. Palacios, S. Mayordomo, J. Prieta). En Palazuelo (BA) 2 el 28/03/13 (M. Kelsey). En Santa Amalia (BA) 2-3 del 29/03/13 al 11/04/13 (F. Yuste). En Guareña (BA) 2 del 14 al 19/04/13 (A. Núñez, F. Castro, F. Lopo y otros). En Granja de Torrehermosa (BA) 3 el 01/06/13 (G. Gahete). **2014.** En Alcollarín (CC) 2-7 del 18/04/14 al 25/05/14 (F. Yuste, M. Kelsey, J. Muddeman, C. Clemente). En Casas de Hitos (BA-CC) **30** el 05/04/14 y 11 el 21/04/14 (M. Kelsey). En Palazuelo (BA) **62** el 26/02/14 y 26 el 06/03/14 (J. P. Prieto). En Medellín (BA) una el 15/02/14 (F. Yuste). En Torviscal (BA) una el 17/03/14 (M. Gálvez). En La Albuera (BA) 2 el 09/03/14 (F. Montaña). En Alange (BA) 2 el 16/04/14 (M. Gálvez, J. Guerra).
- **Paso postnupcial. 2009.** En la laguna de Galisteo (CC) 9 el 12/09/09 (S. Mayordomo). En La Anguila, Serrejón (CC), 3 el 13/09/09 (J. Briz, M. García del Rey y V. Risco). En el embalse del Salor (CC) una el

13/09/09 (C. Fernández). **2010**. En Portaje (CC) **28** el 26/09/10 (S. Mayordomo). En Talaván (CC) una el 07/10/10 (R. Montero). En La Albuera (BA) 8-11 del 23 al 28/10/10 (J. C. Paniagua). En el embalse de Llerena (BA) una el 18/10/10 (A. Núñez). **2011**. En Portaje (CC) 13 el 02/09/11 (S. Mayordomo). En Valdecañas (CC) una el 28/07/11 y el 23/08/11 (J. Prieta). En el embalse del Salor (CC) 1-10 del 12 al 25/08/11; en el embalse de Ayuela (CC) 18 el 19/08/11 (C. Fernández). En Campo Lugar-Palazuelo (CC/BA) una el 28/09/11 y el 07/10/11 (M. Kelsey, J. Muddeman, S. Fletcher). En Esparragalejo (BA) 7 el 08/08/11 (Á. L. Sánchez). **2012**. En Portaje (CC) 16 el 23/08/12 y 17 el 20/09/12 (S. Mayordomo). En el embalse del Salor (CC) una el 08/09/12 (C. Fernández). En el embalse de Casas de Don Antonio (CC) una el 23/10/12 (M. Iglesias). En Los Canchales (BA) 1-12 del 01/09/12 al 30/10/12 con máximo el 05/09/12 (V. de Alba, F. Montaña, A. Núñez y otros). En Alange (BA) una el 05/08/12 (L. Alcántara). En Villalba de los Barros (BA) 3 el 01/09/12 (J. A. Román). **2013**. En Charco Salado (CC) 1-2 del 01 al 12/09/13 (J. Briz, V. Risco y otros). En La Atalaya (CC) 9 el 26/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez). En Esparragalejo (BA) una el 05/08/13 (J. Solana). En La Albuera (BA) una el 23/08/13 (F. Montaña) y 8 el 28/10/13 (G. Schreur). En Morantes (BA) una el 09/09/13 (J. L. Bautista). En Alange (BA) 2 el 03/09/13 (J. Guerra) y una el 01/10/13 (J. A. Román). En Valuengo (BA) una el 28/08/13 (J. A. Román). En Brovales (BA) una el 02/10/13 (F. Montaña). **2014**. En Talaván (CC) una el 22/09/14 y el 25/09/14 (R. Montero). En Guadiloba (CC) una el 16/09/14 (J. Jiménez). En Los Canchales (BA) 1-11 del 01/08/14 al 15/09/14 (F. Bernáldez, J. G. Aparicio, F. Montaña y otros). En Villalba de los Barros (BA) 3 el 07/09/14 (J. M. Álvarez).

Alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*)

Estatus regional. Residente común (3.600 ejemplares en 2004-2006, <1% de España; 1.100-2.100 en Red Natura 2000 en 2014) con tendencia negativa. Migración e invernada de aves foráneas (5.000-10.000 ejemplares) con tendencia desconocida. Subespecie *B.o.oedicnemus*.

Criterio. Cifras destacadas, censos en dormideros.

- **Población en 2014.** En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014). En el censo específico el resultado fue muy pobre, tan sólo seis contactos durante el invierno en tres de las once ZEPA visitadas, que sumaron un total de 96 aves. En primavera se localizaron 64 aves en nueve de las once ZEPA visitadas y se estimó un mínimo de 1.100 individuos dentro de la Red Natura 2000, que podrían ser más de 2.100 aves aplicando la corrección por detectabilidad. Las mejores ZEPA fueron La Serena (>620

ejemplares; declive 40-60%), Llanos de Alcántara-Brozás (>160), Magasca (>95) y Orellana (>50). Se obtuvieron datos de 25 dormideros, 14 de ellos utilizados durante 2013 y 2014 cuya suma asciende a 745 aves, el mayor con 150. Cinco de ellos, con un total de 279 ejemplares, se sitúan en Red Natura 2000.

- **Tendencia.** Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual del -6,2% y una reducción poblacional de -41% (SEO/BirdLife, 2014). La tendencia en invierno es desconocida.
- **Cifras de interés en dormideros.** En regadío de Montehermoso (CC) >40 el 26/01/13 (C. Clemente y J. Mahillo). En Arrocampo (CC) 31 el 18/01/09 (J. Briz). En Campo Lugar (CC), 60 el 09/12/12 y >80 el 22/12/13 (A. Calvo). En Madrigalejo (CC) 71 el 03/01/10 (J. M. Tapia y M. Jiménez) y el 14/01/13 (J. Muddeman). En La Nava de Santiago (BA) 175 el 8/12/10 y >300 el 17/12/11 (Á. Sánchez). En Montijo (BA) >40 el 25/12/11 y 150 el 21/10/13 (P. Herrador). En Mirandilla (BA) >100 el 27/10/13 (Á. Sánchez). En Santa Amalia (BA) 40 el 31/01/11, 43 el 04/09/11 y 40 el 07/02/13 (F. Yuste).

Corredor sahariano (*Cursorius cursor*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en septiembre de 1991 en La Serena y en septiembre de 2011 en Trujillo. Subespecie *C.c.cursor*.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- **Registro previo.** Uno el 25/09/91 en Esparragosa de Lares (M. Gómez Calzado).
- **Nuevo registro.** Uno en Belén, Trujillo (CC), el 22/09/11 (R. De Smet y S. Gaston).

Canastera común (*Glareola pratincola*)

Estatus regional. Reproductora estival común (700-1.000 parejas en 2007) con tendencia desconocida, aparentemente estable con fluctuaciones. Subespecie *G.p.pratincola*.

Criterio. Censos de colonias, fechas extremas, agrupaciones.

- **Población reproductora.** En 2014 SEO-Extremadura llevó a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Cardalliguat *et al.* 2014). Durante 2013 y 2014 se localizaron 12 colonias con 377 parejas. Las localidades más importantes fueron los arrozales de Santa Amalia y entorno (>100 parejas), el embalse de La Serena (75 parejas) y la central termosolar de Olivenza (80 parejas); las otras 9 colonias albergaban menos de 25 parejas. Una revisión de datos muestra 13

espacios de la Red Natura 2000 con reproducción confirmada y cinco con presencia pero sin cría segura. No fue posible calcular la población regional de canastera.

- Nuevas colonias de cría. Colonia en el embalse de Valdecañas (CC), la más septentrional de la región: al menos 43 adultos y 22 pollos el 20/06/11 (S. Mayordomo, J. Prieta) y más de 25 parejas el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. Prieta, C. Clemente). Colonia con unas 200 parejas en el embalse de La Serena (BA) el 12/06/12 (S. Pérez, F. Sierra, D. Rivera y otros). Colonia en la central termosolar de Olivenza (BA) con unas 80 parejas el 03/06/13 (Á. Sánchez).
- Registros de interés. En Galisteo (CC) una el 19/05/09 y 3 el 11/04/10 (E. Palacios, S. Mayordomo). En la laguna del Gañán, Guijo de Coria (CC), una el 28/08/09 (S. Mayordomo). En Santa Amalia (BA), 164 el 04/09/11, 270 el 08/09/11 (F. Yuste), 230 el 11/09/11 (E. Palacios, F. Yuste, J. C. Paniagua y S. Mayordomo), 132 el 14/09/11 (F. Yuste) y 170 el 16/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). En Palazuelo (BA)-Campo Lugar (CC) 262 contados y >300 estimados el 26/07/12 (M. Kelsey). Entre Montijo y Guadiana del Caudillo (BA) >200 la primera mitad de agosto de 2012 (J. L. Bautista).
- Llegadas. Una en La Albuera (BA) el 11/04/09 (J. C. Paniagua). 20 en Vegas Altas (BA) el 29/03/10 (T. Naturalist). 40 en Palazuelo (BA) el 31/03/10 (M. Kelsey). 14 en Valverde de Mérida (BA) el 22/03/11 (J. Solana) y 2 en Palazuelo (BA) el 30/03/11 (M. Kelsey). Una en de Los Canchales (BA) el 26/03/12 (F. Montaña). 8 en Puebla de la Calzada (BA) el 28/03/12 (F. Lopo). 12 en la gravera el Soto, Valverde de Mérida (BA), el 26/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez). El 28/03/13, 7 en las lagunas de Torremejía (BA) (M. Gálvez), 20 en Campo Lugar (CC) (A. Calvo), 10 en Santa Amalia (BA) (A. Maestre, A. Núñez, C. Luengo, F. Yuste, F. Montaña, J. Solana y V. de Alba) y una en Madrigalejo (CC) (M. Kelsey). 12 en Villalba de los Barros (BA) el 20/03/14 (J. M. Álvarez). Una en Campo Lugar (CC) el 22/03/14 (A. Calvo).
- Últimos registros. Una en Santa Amalia (BA) el 06/10/11 (F. Yuste). 9 en Moheda Alta (BA) el 07/09/13 (M. Gálvez, J. Guerra).

Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)

Estatus regional. Reproductor estival común (5.000 individuos y 2.000 parejas en 2007) con tendencia desconocida. Migrante abundante, sobre todo en paso postnupcial. Invernada escasa (100-200 ejemplares) con tendencia al aumento. Subespecie *Ch.d.curonicus*.

Criterio. Observaciones de invernada, fechas extremas.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 52 individuos en 2009, 7 en 2010, cero en 2011, 82 en 2012, 95 en 2013 y 67 en 2014 (media 81 aves 2012-2014). Las principales localidades son los arrozales de Vegas Altas y Galisteo-El Batán, aunque en algunas ocasiones se detectan grupos de más de 20 aves en pequeños embalses. Estas cifras son valores mínimos, pues se trata de una especie difícil de censar, al distribuirse en pequeños grupos por todo tipo de humedales, que en parte no son objeto de censo. Seguramente por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, con tendencia aparentemente positiva (media de 38 aves en 1993-1995, de 30 en 2005-2008 y de 81 en 2012-2014).

Chorlito grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus regional. Migrante común. Invernante muy escaso (50-150 ejemplares) con tendencia creciente sujeta a fluctuaciones. Subespecie *Ch.h.hiaticula*.

Criterio. Fenología, cifras destacadas (>10).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de un individuo en 2009, 31 en 2010, cero en 2011, 69 en 2012, 51 en 2013 y 88 en 2014 (media 69 aves en 2012-2014). Casi toda la población se concentra en arrozales de Vegas Altas. Seguramente por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas y aparentemente la tendencia es positiva (media de 13 aves en 2005-2008 y de 69 en 2012-2014).
- Invernada. En Palazuelo (BA) >20 el 25/01/10 y 3 el 28/01/11 (M. Kelsey). 15 en el embalse del Salor (CC) el 01/01/13 (M. Cardalliaguet).
- Paso prenupcial. 30 en Casas de Hitos (BA-CC) el 20/06/09 (T. Gullick y M. Kelsey). En El Batán (CC) 1-2 del 08 al 11/03/11 (S. Mayordomo). Uno en Valverde de Mérida (BA) el 22/03/11 (J. Solana). 4 en Torremejía (BA) el 11 y 18/05/11 y 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 14/05/11 (M. Kelsey). 14 en Galisteo (CC) el 18/05/11 (S. Mayordomo). En Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), 125 el 21/05/12 (M. Kelsey) y 15 el 23/05/12 (J. P. Prieto). 7 en Riobos (CC) el 23/02/13 (S. Mayordomo). 20 en Puebla de Alcollarín (BA) el 01/02/14 (M. Kelsey) y 23 el 26/02/14 (U. Bühlmann, J. P. Prieto y K. Walker). 130 en el embalse de Valdecañas (CC) el 17/05/14 (J. Muddeman).
- Paso postnupcial. Uno en Portaje (CC) el 07/08/09 (S. Mayordomo). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 20/07/10 (M. Kelsey). Uno en el

embalse del Salor (CC) el 23/07/11, otro en Talaván (CC) el 25/07/11 (S. Mayordomo) y otro en Valdecañas (CC) el 28/07/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). 2 en Esparragalejo (BA) el 14/07/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 28/07/13 (S. Mayordomo). Uno en Villalba de los Barros (BA) el 04/07/14 (F. Montaña). 4 en Las Merinillas (BA) el 12/07/14 (A. Fernández).

Chorlito de culirrojo (*Charadrius vociferus*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en mayo de 1995 en el embalse de Cornalvo.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro anterior. Un ejemplar el 13/05/95 en el embalse de Cornalvo (E. Costillo y otros).

Chorlito patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso (25-100 parejas), reciente y muy localizado (Valdecañas y arrozales de Vegas Altas). Invernante muy escaso (50-200 aves). Tendencia creciente en todas las épocas. Subespecie *Ch.a.alexandrinus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de cero individuos en 2009, 10 en 2010, cero en 2011, 110 en 2012, 73 en 2013 y 75 en 2014 (media 86 aves en 2012-2014). Se concentra en arrozales de Vegas Altas, aunque algún año aparecen grupos en el embalse de Valdecañas que es posible pasen habitualmente inadvertidos. Estas cifras son valores mínimos, pues se trata de una especie difícil de censar. Seguramente por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, aunque la tendencia a largo plazo es positiva (media de cero aves en 1993-1995, de 34 en 2005-2008 y de 86 en 2012-2014).
- Reproducción en Valdecañas. Localidad más importante de Extremadura que quizá llevé ocupada varios años. 2011. Parejas con pollos el 14/06/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado y M. Flores); se censa un mínimo de **47 parejas** el 20/06/11 (EV2011); 30 aves con 2 pollos pequeños el 28/07/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). 2012. **72** el 19/04/12, 20 parejas el 15/05/12 (Á. Sánchez), 11 aves, incluida una hembra incubando tres huevos, el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y C. Clemente). 2013. Más de 20 el 15/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Prieta, J. L. Guisado y S.

Mayordomo), al menos 7 y un par de nidos el 31/05/13 (S. Mayordomo) y >50 el 30/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo). 2014. 31 con pollos el 15/05/14 (Á. Sánchez); 4 el 23/05/14 (S. Mayordomo); 2 parejas el 05/06/14 (J. M. Abad, M. Flores y Á. Sánchez) y 9 adultos y 2 pollos el 12/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios).

- Reproducción en otras localidades. En Casas de Hitos, Navalvillar de Pela (BA), **3 parejas** con al menos **3 pollos** entre el 17/03/09 y el 16/09/09 (M. Kelsey, S. Fletcher, J. Hawkins, T. Gullick); 10 el 02/05/11 (E. Palacios, S. Mayordomo, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz,); 3 el 05/04/14, 2 el 11/05/14, 2 el 12/05/14 y uno el 17/05/14 (M. Kelsey). En Palazuelo (BA) 11 adultos, uno con **3 pollos**, el 02/05/13 (M. Kelsey); 12 el 01/04/14, 3 el 05/04/14 (M. Kelsey); 2 adultos con **2 pollos** el 09/04/14 (J. P. Prieto, G. Russell y P. Russell); 8 adultos más **pollos** el 16/04/14 (J. P. Prieto); 6 adultos con **2 pollos** el 21/04/14, 6 el 24/04/14 (M. Kelsey) y 2 adultos con 2 jóvenes el 27/04/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). En arrozales de Santa Amalia (BA), más de 50 el 05/04/13, entre ellos una hembra echada en un **posible nido** que continúa echada el 11/04/13; varios los días 16/05/13 y 24/05/13 (F. Yuste). (F. Yuste). En la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), una **pareja copulando** el 15/06/13 (J. Solana) y una hembra el 15/04/14 (M. Gálvez, P. Goñi y J. L. Guisado).
- Registros en época de cría. En el embalse de Alcollarín (CC) 2-6 del 24/04/14 al 14/06/14 (M. Kelsey, C. Clemente, S. Mayordomo y E. Palacios). En arrozales de Puebla de Alcollarín (BA), 4 el 10/05/12 (J. P. Prieto) y una pareja el 12/05/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano). En Guareña (BA) entre 3 y 34 del 03 al 12/05/13 (A. Cangas, A. Núñez, E. del Viejo, E. Palacios y otros). En el embalse de Alange (BA), 2 parejas el 27/04/12 (Á. Sánchez), 2 aves el 29/06/14 (J. A. Román) y el 13/06/13 (Á. Sánchez y J. M. Abad).
- Otros registros.
Año 2009. 2 localidades. En Miajadas (CC) 3 el 17/03/09 (S. Fletcher). En Charco Salado (CC) 3 el 08/09/09 (C. González y S. Langlois).
Año 2010. 5 localidades. En el embalse del Salor (CC) uno el 22 y 29/09/10 (S. Mayordomo). En Santa Amalia (BA) 40 el 07/03/10 y 25 el 30/12/10 (F. Yuste). En Casas de Hitos (BA-CC) uno el 21/03/10 (D. Langlois y S. Langlois) y 2-4 del 20/07/10 al 11/09/10 (M. Kelsey). En Moheda Alta (BA) uno el 05/09/10 (E. Palacios y S. Mayordomo). En Palazuelo (BA) 12 el 13/03/10 y 3 el 14/11/10 (M. Kelsey).
Año 2011. 5 localidades. En Casas de Hitos (CC/BA), 2-15 del 04/02/11 al 21/04/11 (S. Fletcher, E. Palacios, S. Mayordomo, J. Muddeman, M.

Kelsey). En Campo Lugar-Palazuelo (CC/BA) 15 el 22/01/11 (SEO-Cáceres), 25 el 28/01/11, 3 el 28/09/11 (M. Kelsey), **62** el 07/10/11 (S. Fletcher), 6 el 28/10/11, 15 el 31/10/11 (M. Kelsey) y 5 el 24/11/11 (J. Hernández y J. P. Prieto). En Puebla de Alcollarín (CC) 2 el 13/02/11 (J. P. Prieto), 14 el 29/10/11, 21 el 05/11/11, **28** el 08/11/11 y 8 el 09/11/11 (J. P. Prieto). En Santa Amalia (BA) 1-3 del 28/08/11 al 08/11/11 y **25** el 29/12/11 (F. Yuste). En Los Canchales (BA) 2 el 24/09/11 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo).

Año 2012. 16 localidades. En Portaje (CC) 3 el 28/03/12 y 1-2 entre el 04 y el 20/09/12 (S. Mayordomo). En La Anguila, Serrejón (CC), uno el 02/09/12 (M. Carregal y G. Fernández). En Valdecañas (CC) **75** el 24/01/12 (Á. Sánchez), 4 el 07/07/12, 9 el 22/09/12 (S. Mayordomo), 20 el 11/11/12 (J. Prieta), 12 el 13/11/12 (S. Mayordomo) y **35** el 16/12/12 (F. Salas y A. Torrijo). En el embalse del Ayuela (CC) 2 el 23/09/12 (C. Fernández). En arrozales de Miajadas (CC) **23** el 02/02/12 (S. Fletcher). En el embalse del Cubilar (CC) 4 el 28/07/12 (S. Mayordomo). En Palazuelo (BA) 10 el 14/01/12 (S. Mayordomo, J. Mahillo, E. Palacio y C. Clemente) y **24** el 24/12/12 (J. P. Prieto). En Puebla de Alcollarín (BA) 1-4 del 04/10/12 al 17/11/12 (J. P. Prieto, M. Kelsey). En Santa Amalia (BA) máximo 25 del 26/01/12 al 26/02/12 (F. Yuste) y 5 del 18 al 20/11/12 (W. Haworth y J. P. Prieto). En Los Canchales (BA) 6 el 26/03/12 (F. Montaña) y 1-3 del 16 al 30/09/12 (V. de Alba, I. Sánchez, F. Montaña y otros). En Alqueva, Olivenza (BA), uno el 21/01/12 (S. Mayordomo). En Esparragalejo (BA) uno el 01/09/12 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). En el embalse de Alange (BA) uno el 04/08/12 (L. Alcántara). En El Paredón, Campanario (BA), uno el 29/03/12 (J. P. Prieto). En Valuengo (BA) 3 el 26/07/12 (F. Montaña y Damián).

Año 2013. 9 localidades. En Portaje (CC) uno el 11/09/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). En Charco Salado (CC) uno el 26/07/13 (S. Mayordomo). En Valdecañas (CC) **33** el 15/01/13, 2 el 26/07/13 (S. Mayordomo), 7 el 01/08/13 y **47** el 08/11/13 (S. Mayordomo, J. Prieta, C. Clemente, J. Mahillo). En Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC) 4 el 10/02/13 (A. Calvo), 2 el 08/04/13, 6 el 27/04/13 y 1-56 del 27/09/13 al 01/12/13 con máximo el 17/10/13 (M. Kelsey, J. Muddeman, A. Núñez, J. P. Prieto, C. Clemente y S. Mayordomo). En Santa Amalia (BA) 30 el 22/01/13 (M. Kelsey), 24 el 17/03/13 (F. Yuste) y 3-11 del 09/11/13 al 22/12/13 con máximo el 06/12/13 (F. Montaña, J. P. Prieto, R. Serra). En Gadiana del Caudillo (BA) 3 el 22/12/13 (P. Herrador). En Guareña (BA) 2-6 del 11/04/13 al 25/04/13 (J. Guerra, M. Gálvez, E. Charles y otros). En Los Canchales (BA) 4 el 08/01/13 (F. Montaña, J. Vázquez y J. Delgado) y 2 el 18/01/13 (S. Pérez). En Alange (BA) 1-2 del 09 al 28/09/13 (J. A. Román).

Año 2014. 11 localidades. En Valdecañas (CC) 5 el 02/08/14 (S. Mayordomo). En Hitos de Abajo, Campo Lugar (CC), 3 el 01/01/14 (A. Calvo). En arrozales de Puebla de Alcollarín (BA) 4-34 del 01/01/14 al 26/02/14 con máximo el 21/01/14 (A. Calvo, J. P. Prieto, L. Alcántara, M. Cardalliaguet y otros) y 10 el 11/11/14 (M. Gálvez). En arrozales de Palazuelo (BA), 2 el 06/03/14 (J. P. Prieto y G. Schreur) y 4-80 del 10/10/14 al 12/12/14 con máximo esta última fecha (M. Kelsey, C. Clemente, S. Mayordomo, E. Palacios, M. Gálvez). En Moheda Alta 3 el 21/03/14 y en Casas de Hitos (BA-CC) 8 el 28/03/14 (M. Kelsey). En Santa Amalia (BA) 3-41 del 11/01/14 al 07/03/14 con máximo, el 21/01/14 (F. Montaña, G. Montaña, J. Prieta y otros). En arrozales de Gadiana del Caudillo (BA) 3 el 13/11/14 (M. Gálvez). En Los Canchales (BA) 2 el 15 y 21/09/14 (F. Montaña, J. Mazón, J. Tarrío y otros). En el embalse de Alange (BA) uno el 16/09/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y 4 el 22/09/14 (J. A. Román). En Brovales (BA) 2 el 23/09/14 (F. Montaña).

Chorlito carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus regional. Invernada muy escasa confirmada en 2013-2015 (20-150 ejemplares) en La Serena e Hinojal con tendencia desconocida. Migrante muy escaso que pasa inadvertido. 17 registros en 1991-2012 y regular en 2013-2015. Citas en La Serena, Cuatro Lugares, Llanos de Cáceres-Trujillo, Arrocampo, Guijo de Coria, Campiña Sur, Valverde de Mérida y Villanueva del Fresno. De agosto a abril. Grupos mayores de 34, 50 y 75 individuos. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- 13 registros previos. 3 el 25/09/91 en Esparragosa de Lares (M. Gómez Calzado). 4 en Villanueva del Fresno en febrero de 1993 (L. Reino). 75 el 21/04/99 en Almorchón (G. Schreur). 5 en Cabeza del Buey el 21 y 22/04/00 (Craft). 34 el 27/11/01 en Castuera- Cabeza del Buey (B. López, J. Fregenal y otros). 10 en Cáceres en agosto de 2002 (J.C. Núñez). Uno en Torreorgaz el 13/11/04 (A. Moga, J. C. Núñez). Uno en Arrocampo el 16/04/05 (Ch. Casado, M. Arcas). 9 el 21/04/05 y 6 el 22/04/05 en La Serena (Audouin BT). 50 en Castuera el 4/04/06 (M. Hirschler). 4 en Torrecillas de la Tiesa en septiembre (Retamatour) y el 7/10/06 (J. L. Delgado y P. Holgado). 2 en Llanos de Cáceres el 28/09/06 (J. Muddeman). Uno el 7/03/08 en Santa Marta de Magasca (com. por M. Kelsey).
- Nuevos registros.
 - 2009-2010. Dos registros: 15 en La Serena (BA) el 22/11/09 (I. Waschies) y 3 en Llanos de Cáceres 3 el 13/04/10 (S. Daly).
 - 2010-2011. Un registro en Guijo de Coria (CC), un juvenil el 02/11/10

(J. Prieta) y el 03/11/10 (S. Mayordomo).

2011-2012. Sin observaciones.

2012-2013. Un registro en Campanario (BA), 3 el 09/09/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano).

2013-2014. Invernada confirmada por primera vez en Extremadura en La Serena y en Cuatro Lugares (Hinojal), siendo posible en Campiña Sur (Granja de Torrehermosa) y Valverde de Mérida. Hinojal (CC): se localizan 4 el 09/11/13 (C. Mills y R. Montero), grupo de 7 del 10/12/13 al 12/01/14 (C. Clemente, E. Palacios, S. Mayordomo, M. Viskens, J. Prieta y otros), grupo de 6 del 12/01/14 al 01/02/14 (J. Porras) y el 07/02/14 se ven 15 en dos grupos de 6 y de 9 aves (A. Gil); 3 meses después, el 09/04/14, se ve un ejemplar, quizás un ave diferente en migración (C. Mills y R. Montero). La Serena (BA). Se confirma la invernada en 3 zonas: Cabeza del Buey, Castuera y Puerto Mejorada (Cabeza del Buey), cuyos máximos suman 43 aves. En Castuera se localizan 5 el 06/12/13 (J. Guerra), 8 el 08/12/13 (W. Haworth), 3 el 24/01/14 (J. Guerra y M. Gálvez) y 19 el 23/02/14 (J. Guerra, F. Macías y F. Bernáldez); en Puerto Mejorada se cuentan 11 el 11/12/13 (J. Guerra y M. Gálvez), 18 el 24/01/13 (M. Gálvez y J. Guerra), 9 el 25/01/13 (E. del Viejo, F. Cristal) y 3 el 23/02/14 (J. Guerra, F. Macías y F. Bernáldez); y por último, en Cabeza del Buey se ven 2 el 24/01/14 (J. Guerra y M. Gálvez) y 6 el 08/02/14 (J. Pérez, J. Portillo y A. Sanmartí); dos meses después se citan 14 en La Serena el 19/04/14, quizás un grupo de migrantes (J. Porras). En Granja de Torrehermosa (BA) uno el 26/01/14 (M. Corvillo). En Valverde de Mérida (BA) uno el 03/02/14 (J. Guerra) y el 04/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra).

2014-2015. En La Aldea del Obispo (CC) dos el 17/08/14 (N. Renwick). A principio de 2015 vuelve a confirmarse la invernada en La Serena, pero no así en Hinojal ni en las otras localidades.

Chorlito dorado europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus regional. Invernante abundante (>100.000 ejemplares), con tendencia estable sujeta a fuertes fluctuaciones. Subespecie *P.a.altifrons*.

Criterio. Fechas extremas, cifras destacadas (>500).

- Censos de enero 2009-2014. Los censos de acuáticas no son representativos para esta especie, no obstante, las cifras obtenidas en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se anotaron 183 ejemplares en 2009, 1.276 en 2010, cero en 2011, 1.082 en 2012, 1.460 en 2013 y 2.713 en 2014. Las mayores cifras

se obtienen en arrozales de Vegas Altas con un máximo de 2.055 ejemplares el 20/01/14.

- Tendencia. En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “estable” en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Cifras de interés. Más de 1.500 en La Trebolosa, Logrosán (CC) el 24/01/09 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo). Más de 2.500 en Casas de Hitos, Madrigalejo (CC) el 24/01/10 (SEO Cáceres). Más de 1.500 en Montemolín (BA) el 19/02/10 y más de 1.000 el 10/12/10 (A. Pacheco). Más de 1.000 en arrozales de Miajadas (CC) el 02/02/12 (S. Fletcher)
- Llegadas. Uno en Guijo de Coria (CC) el 14/10/09 (J. Prieta). 4 en Aldea del Cano (CC) el 27/10/10 (G. Schreur). 6 en Valdeñigos (CC) el 30/10/10 (R. Guzmán). Uno en El Batán el 21/10/11 (E. Palacios y M. Á. Muñoz). 3 en Los Canchales (BA) los días 20/10/12 (J. Solana, F. Lopo, F. Castro y otros) y 27/10/12 (E. del Viejo y A. Cangas). Uno en Oliva de Plasencia (CC) el 26/10/13 (S. Mayordomo). Uno en Los Canchales (BA) el 19/10/14 (J. L. Bautista). 2 en Campo Lugar (CC) el 28/10/14 (M. Kelsey).
- Últimos registros. Uno nupcial en Brozas (CC) el 25/04/09 (J. Prieta y G. Naharro). Uno el 11/05/10 en Campo Lugar (CC) (E. Barnes y P. Barnes). 3 nupciales en Santa Amalia (BA) el 02/05/11 (F. Yuste). En Valdecañas (CC), una pareja el 16/06/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado y M. Flores) y un ejemplar el 20/06/11 (EV2011). Uno en Los Canchales (BA) el 01/05/12 (F. Lopo, F. Castro e I. Sánchez). Uno con un ala rota en Palazuelo (BA) el 26/05/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano). Uno en Belén, Trujillo (CC), el 21/04/13 (J. Olsson, P. Wohlin, S. Carlström y T. Magnusson). Uno en Navalvillar de Pela (BA) el 11/05/14, 12/05/14 y 17/05/14 (M. Kelsey).

Chorlito gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus regional. Migrante muy escaso e invernante ocasional. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2009. 6 en Palazuelo (BA) el 08/05/09 (M. Kelsey). 2 en el embalse del Salor (CC) el 09/05/09 (C. Fernández).
- Año 2010. 4 en Portaje (CC) el 07/05/10 y uno el 16/05/10 (S. Mayordomo). Uno en La Albuera (BA) entre el 23/10/10 y el 28/10/10 (J. C. Paniagua y A. Núñez). 3 en Santa Amalia (BA) el 02/12/10 (F. Yuste).
- Año 2011. Uno en Esparragalejo (BA) el 23/08/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). Uno en La Albuera (BA) el 31/08/11 (J. C. Paniagua). Uno en El Paredón, Campanario (BA), el 11/10/11 (J. L. Pérez Chiscano y J. P. Prieto).

- Año 2012. Uno en Brozas (CC) el 15/01/12 (C. Fernández). Uno en Portaje (CC) el 17/02/12 y el 07/03/12 (S. Mayordomo). Uno en Los Barruecos (CC) el 27/04/12 (M. Kelsey). 2 en El Paredón, Campanario (BA), el 29/04/12 (J. P. Prieto). En Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC), 3 el 04/05/12 (M. Kelsey), 13 el 05/05/12 (M. Kelsey y J. Muddeman), 9 el 08/05/12 (J. Muddeman) y uno el 10/05/12 (J. P. Prieto). Uno en el embalse de Llerena (BA) los días 08/05/12 y 09/05/12 (F. Montaña). 4 en Puebla de Alcollarín (BA) el 10/05/12 (J. P. Prieto). Uno en Los Canchales (BA) los días 27/10/12 (E. del Viejo y A. Cangas) y 30/10/12 (J. Vázquez, J. Solana, F. Montaña y A. Núñez).
- Año 2013. Uno en Palazuelo (BA) el 22/01/13 (M. Kelsey). 2 en Santa Amalia (BA) el 11/04/13 (F. Yuste). En Guareña (BA), uno los días 01/05/13 (A. Calvo, J. Guerra y M. Gálvez) y 02/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y 2 entre el 03/05/13 y el 11/05/13 (A. Cangas, A. Núñez, E. del Viejo, E. Palacios, F. Montaña, J. Solana, J. Guerra, S. Mayordomo y V. de Alba). 2 en el embalse de Guadiloba (CC) el 02/05/13 (A. Gil). En Palazuelo (BA), 7 el 02/05/13 y 3 el 11/05/13 (M. Kelsey). 2 en Moheda Alta (BA) el 02/05/13. 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 15/05/13 (M. Kelsey). El 28/05/13, 2 en Riobos (CC) y 2 en El Batán (CC) (J. Prieta). El 29/05/13, otro diferente en El Batán (S. Mayordomo). 2 jóvenes en Valdecañas (CC) el 08/11/13 (C. Mills y R. Montero).
- Año 2014. 2 en Logrosán (CC) el 12/01/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera). Uno en Palazuelo (BA) el 21/04/14 (M. Kelsey) y el 26/04/14 (C. Clemente). 7 en Casas de Hitos (BA-CC) el 21/04/14 (M. Kelsey), 2 el 24/04/14 (M. Kelsey y E. Owen) y uno el 11/05/14 y el 12/05/14 (M. Kelsey). 14 en Palazuelo (BA) el 19/05/14 (J. Muddeman). 5 en Galisteo (CC) el 23/05/14 (J. Prieta). Uno en el embalse de Alcollarín (CC) el 25/05/14 y 4 en Valdecañas (CC) el 26/05/14 (C. Clemente). Uno en Los Canchales (BA) el 20/10/14 (J. A. Román). 3 en Gadiana del Caudillo (BA) el 13/11/14 (M. Gálvez). 3 en Santa Amalia (BA) el 29/11/14 (V. de Alba y A. Núñez) y uno el 04/12/14 (N. Renwick).

Avefría sociable (*Vanellus gregarius*)

Estatus regional. Accidental. Cuatro registros en Mirandilla (febrero-marzo 2004), Los Canchales (noviembre 2009) y Castuera (marzo 2011 y diciembre 2011).

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Una entre el 19/02/04 y el 4/03/04 en Mirandilla (F. Prieto, J. Ledo y J. M. Benítez).
- Tres nuevos registros. Una en Los Canchales (BA) el 03/11/09 (J. M.

Salazar y M. Rial). Una hembra adulta en Castuera (BA) el 13/03/11 (R. Smith). Una en Castuera (BA) el 11/12/11 (J. Hill y L. Battle).

Avefría europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus regional. Reproductora muy escasa (5-25 parejas) con tendencia negativa. Invernante muy abundante (>500.000 ejemplares) con tendencia negativa y grandes fluctuaciones. Monotípica.

Criterio. Reproducción, fechas estivales y extremas, cifras destacadas (>1.000).

- Censos de enero 2009-2014. Los censos de aves acuáticas no son representativos para esta especie, no obstante, las cifras obtenidas en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se anotaron 2.008 ejemplares en 2009, 7.676 en 2010, 12.974 en 2011, 10.201 en 2012, 19.081 en 2013 y 28.976 en 2014. Las mayores cifras se obtienen en arrozales de Vegas Altas con un máximo de 15.700 el 20/01/14.
- Tendencia. En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “declive moderado” en España, con un porcentaje medio de cambio anual de -10% y total de -14% (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “declive moderado”, disminuyendo el -60% en el periodo 1980-2012, aunque con menor intensidad después de 1995 (PECBMS, 2015).
- Reproducción segura. 6 parejas cebando pollos en la laguna del Grano de Oro, Valencia de las Torres (BA), el 24/04/10 (F. Montaño). 3 adultos y 2 pollos en el arroyo de la Gallinera, Valencia de las Torres (BA), el 19/05/13 (M. Gálvez). Reproducción en La Albuera (BA): 5 y entre ellas un juvenil el 07/06/14 (J. C. Paniagua).
- Registros primaverales (abril y mayo). En la laguna y arrozal de Galisteo (CC), una el 11 y el 13/04/10; 2 parejas el 05/04/11, 3 el 12/04/11, una el 15/04/11 y 3 el 22/05/11; grupo de 1-5 entre el 11/04/12 y el 21/05/12, un macho el 09/05/14 y el 13/05/14 (S. Mayordomo, J. Prieta E. Palacios, C. Clemente, J. Mahillo, M. Á Muñoz). En el arrozal de El Batán (CC) un macho el 13/05/14 (S. Mayordomo). En el arrozal de Riolobos (CC) 3 machos el 28/05/13 (J. Prieta) y uno el 29/05/13 (S. Mayordomo). Una en Oliva de Plasencia (CC) el 29/04/09 (S. Mayordomo). En Brozas (CC) una el 25/04/09 (J. Prieta y G. Naharro) y 2 el 6/04/11 (Á. Sánchez). En Los Arenales (CC) 2 el 11 y el 20/04/12 (S. Mayordomo). En la laguna Torrealba, Torremocha (CC), 6 el 18/04/12, 7 el 20/04/12 y 2 los días 09 y 11/05/12 (S. Mayordomo). Una en Santa Marta de Magasca (CC) el

22/04/10 (M. Kelsey). Una en Campo Lugar (CC) el 14/05/11 (M. Kelsey). En Casas de Hitos (BA-CC), 18 el 24/05/09; una los días 07 y 12/04/11; una hembra el 25/05/13 (M. Gálvez); 6-25 del 24/04/14 al 17/05/14 (M. Kelsey y J. Muddeman). 6 en Moheda Alta (BA) el 15/04/12 (M. Kelsey). En Palazuelo (BA) 3 el 02/05/13 (M. Kelsey), más de 50 el 19/05/14 (J. Muddeman) y más de 20 el 25/05/14 (M. Kelsey). En Vegas Altas (BA) más de 40 el 25/04/14 (M. Kelsey). En Santa Amalia (BA) 16 el 16/04/13, 20 el 23/04/13, 28 el 16/05/13 y 40 el 24/05/13 (F. Yuste). En La Albuera (BA) varias parejas el 11/04/09 (J. C. Paniagua), más de 10 el 04/04/10 (J. Guerra, M. Gálvez); 10 parejas el 18/04/11 (J. Fernández), más de 10 el 01/05/11 (J. Guerra, M. Gálvez), 7 con comportamiento reproductor el 04/05/11 (G. Schreur); una el 17/04/13 (M. Gálvez, J. Guerra), 2 el 18/04/13 (A. García, A. Núñez, P. Bernárdez), 2 el 17/05/13 (A. Núñez); y una el 26/04/14 (J. C. Paniagua). Una en Guareña (BA) el 25/04/13 (M. Gálvez). Una en la laguna de Torremejía (BA) el 02/05/11 (A. Núñez). En Los Canchales (BA) 3 el 06/05/12 (F. Lopo, E. del Viejo y A. Cangas). Una en el embalse de Villalba de los Barros (BA) el 10/05/14 (J. M. Álvarez). Una en Usagre (BA) el 09/04/13 (F. Lopo). 2 en Ahillones (BA) el 20/04/13 (F. Montaña) y 2 con comportamiento territorial el 03/05/14 (F. Montaña). 2 en la laguna del Hueco, Granja de Torrehermosa (BA), el 26/04/14 (M. Corvillo).

- Llegadas (registros en junio). En Galisteo (CC), 11 el 03/06/09 y 17 el 19/06/09 (S. Mayordomo). En Navalvillar de Pela (BA), presente el 05/06/09, 30 el 15/06/09 (M. Kelsey) y más de 100 el 20/06/09 (T. Gullick y M. Kelsey). En Galisteo (CC), 3 el 15/06/11 (S. Mayordomo). 2 en Los Arenales (CC) el 01/06/12 (S. Mayordomo). 200 en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 12/06/12 (A. Calvo). 50 en Galisteo (CC) el 13/06/12 (S. Mayordomo). 18 en Granja de Torrehermosa (BA) el 01/06/13 (G. Gahete). Una en Gadiana del Caudillo (BA) el 02/06/13 (J. L. Bautista). El 03/06/13, una Riolobos y 6 en El Batán (CC) (S. Mayordomo). En Galisteo (CC), 9 el 06/06/13 (E. Palacios, J. Mahillo) y más de 65 el 22/06/13 (S. Mayordomo). En Palazuelo, 170 el 09/06/13 (M. Kelsey) y 54 el 30/06/13 (J. L. Pérez Chiscano y J. P. Prieto). 10 en las Lagunas de Torremejía (BA) el 15/06/13 (F. Castro y J. Solana). En Valdecañas, 21 el 23/06/13 (C. Clemente y S. Mayordomo) y 15 el 30/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo). 200 en Navalvillar de Pela (BA) el 23/06/13 (M. Kelsey). 280 en Rucas (BA) el 27/06/13 (F. Yuste).
- Últimos registros. Un macho en Galisteo (CC) el 24/03/09 (J. Prieta). 2 en El Batán (CC) el 30/03/10 (J. Prieta). 11 en Galisteo (CC) (S. Mayordomo) y uno en Casas de Hitos (BA-CC) (M. Kelsey) el día 30/03/11. 2 en La Atalaya, Aldea del Cano (CC), el 09/04/12 (S.

Mayordomo). El 30/03/13, 2 en Riobos (CC) y una en El Batán (CC) (S. Mayordomo y E. Palacios), 5 en La Albuera (BA) (A. Núñez, E. del Viejo, F. Yuste y V. de Alba) y 8 en la laguna Torrealba, Torremocha (CC) (J. P. Prieto y W Haworth). 4 en Palazuelo (BA) y 8 en Casas de Hitos (BA-CC) el 01/04/14 (M. Kelsey).

Correlimos gordo (*Calidris canutus*)

Estatus regional. Migrante muy escaso. 22 registros; en abril-junio (9 registros, 10 aves) y agosto-octubre (11 registros, 34 aves; un grupo con 14). Invernante excepcional (2 registros en noviembre-diciembre, 8 aves). Subespecie *C.c.canutus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros, incluyendo los dos primeros casos de invernada. En el embalse de Portaje (CC) un juvenil al 03/12/10 (S. Mayordomo). En Guareña (BA) uno del 01 al 11/05/13 (A. Calvo, A. Cangas, A. Núñez, E. del Viejo, E. Palacios, F. Montaña, J. Solana, J. Guerra, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Mayordomo y V. de Alba). Uno en La Albuera (BA) del 14/09/13 (J. C. Paniagua) al 03/01/13/13 (E. del viejo, F. Bernáldez, F. Macías, F. Montaña, J. Mazón, J. Guerra, J. C. Paniagua, M. Gálvez), 4 el 13/10/13 (F. Macías) y 2 el 21/10/13 (F. Montaña, J. Vázquez, J. C. Paniagua). En Los Canchales (BA), 3 el 22/08/14 (J. G. Aparicio) y uno del 03 al 19/09/14 (F. Bernáldez, F. Montaña, J. Vázquez, J. Guerra, M. Gálvez). En Moheda Alta (BA), uno el 02/09/14 (M. Kelsey). En Esparragalejo (BA), uno el 06/09/14 y el 18/09/14 (J. A. Román). En Palazuelo (BA), 7 el 26/11/14 (H. Zweers) y 3 el 28/11/14 (R. Montero, J. Torfs y M. Viskens).

Correlimos tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus regional. Migrante muy escaso pero regular. Invernantes excepcionales. Más de 50 registros en todos los meses del año excepto enero y julio. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2009. 3 registros. Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 20/05/09 (com. por M. Kelsey), 3 el 03/06/09 (S. Fletcher) y uno el 05/06/09 (M. Kelsey y J. Hawkins).
- Año 2010. Un registro. Uno en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela (BA), el 11/09/10 (M. Kelsey).
- Año 2011. Dos registros. Uno en la Lagunas de Torremejía (BA) el 11/05/11

(M. Kelsey). Uno en Santa Amalia (BA) el 08/09/11 (F. Yuste).

- Año 2012. 10 registros. En arrozales de Miajadas (CC), 10 el 02/02/12 (S. Fletcher). En Santa Amalia (BA), uno el 26/02/12 (F. Montaña). En la laguna de Galisteo (CC), uno el 19/04/12 (M. Alonso). Uno en la charca de La Haba (BA) el 24/04/12 (J. P. Prieto). En Portaje (CC), 4 el 27/04/12 (S. Mayordomo) y uno el 01/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). En Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC), 2 el 01/05/12 (M. Kelsey) y uno del 13 al 23/05/12 (M. Kelsey, J. P. Prieto). En Valdecañas (CC) un juvenil el 01/09/12 (S. Mayordomo) y, en invernada, uno el 16/12/12 (F. Salas y A. Torrijo). Uno en Esparragalejo (BA) el 16/09/12 (V. de Alba, I. Sánchez, F. Montaña, F. Lopo, E. del Viejo, A. Núñez). Uno en Los Canchales (BA) el 30/10/12 (J. Vázquez, J. Solana, F. Montaña y A. Núñez).
- Año 2013. 11 registros. En Palazuelo (BA) uno el 17/05/13 (M. Kelsey). En Casas de Hitos (BA-CC), 3 el 17/05/13 (M. Kelsey) y 7 el 20/05/13 (J. Muddeman). En Santa Amalia (BA), uno el 24/05/13 (F. Yuste). En el embalse de Valdecañas (CC) 8 el 31/05/13 (S. Mayordomo) y un adulto nupcial el 23/06/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). En las lagunas de Torremejía (BA) 3 el 06/06/13 (F. Bernáldez). En Esparragalejo (BA) uno el 08/08/13 (C. González) y el 17/08/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). En La Albuera (BA) 2 el 25/08/13 (F. Montaña y J. Vázquez) y uno el 23/11/13 (G. Schreur y P. Schreur). En el embalse de Alange (BA) 2 el 25/08/13 (F. Bernáldez). En el embalse de Alqueva (BA) uno el 13/10/13 (A. López).
- Año 2014. 8 registros. En El Batán (CC) uno el 18/05/14 (C. Clemente, S. Mayordomo y E. Palacios). En Sierra Brava (CC) 2 el 19/05/14 (J. Muddeman). En arrozales de Galisteo (CC) 3 el 21/05/14 (S. Mayordomo), uno el 23/05/14 (J. Prieta) y uno el 24/05/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). En Valdecañas (CC) 25 el 22/05/14 (J. Muddeman) y 11 el 26/05/14 (C. Clemente). En Esparragalejo (BA) uno del 18 al 20/09/14 (J. A. Román, V. de Alba, T. Cordero, M. Gálvez, J. Guerra, F. Montaña, A. Núñez, A. Cangas, E. del Viejo), 3 el 24/09/14 y 4 el 26/09/14 (J. A. Román). En Brovales (BA) uno el 21 y 22/09/14 (F. Montaña). En el embalse de Alange (BA) 2 el 22/09/14 (J. A. Román). En Morantes (BA) uno el 03/10/14 (F. Lopo) y el 05/10/14 (E. del Viejo).

Correlimos menudo (*Calidris minuta*)

Estatus regional. Migrante común, sobre todo en paso postnupcial (agosto-octubre). Invernante escaso y fluctuante (100-500 ejemplares) con tendencia positiva. Monotípica.

Criterio. Fenología, invernada y cifras de interés (>50).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 30 individuos en 2009, 3 en 2010, cero en 2011, 234 en 2012, 65 en 2013 y 446 en 2014 (media 248 aves en 2012-2014). Casi toda la población regional se concentra en los arrozales de Vegas Altas, aunque algún año aparecen grupos en el embalse de Valdecañas que es posible pasen habitualmente inadvertidos. Estas cifras son valores mínimos, pues se trata de una especie difícil de censar. Seguramente por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas con una tendencia aparentemente positiva (media de cero aves en 1993-1995, de 34 en 2005-2008 y de 248 en 2012-2014).
- Paso prenupcial. 50 en Santa Amalia (BA) el 13/03/10 (F. Yuste). 4 en Torremejía (BA) del 02 al 11/05/11 (A. Núñez, M. Kelsey). 100 en Navalvillar de Pela (BA) el 05/03/12 (Á. L. Sánchez). Uno en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 19/03/14 (S. Mayordomo).
- Paso postnupcial. Uno en Charco Salado (CC) el 04/08/09 y 3 en Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), el 05/08/09 (S. Mayordomo). En Casas de Hitos (BA-CC) 20 el 12/08/09 y uno el 12/08/10 (M. Kelsey). Uno en el embalse de Talaván (CC) el 20/08/10 (S. Mayordomo). Varios en Mérida el 31/07/11 (Á. Sánchez). 2 en la laguna de Galisteo (CC) el 26/07/12 (S. Mayordomo). El 28/07/12, 4 en la charca de Morantes (BA) (J. L. Bautista) y 3 en Moheda Alta (BA) (S. Mayordomo). En la charca de Esparragalejo (BA), 8 el 31/07/12 (F. Montaña), 2 el 21/07/13 (C. Clemente, M. García del Rey y S. Mayordomo) y 5 el 30/07/13 (E. del Viejo). En Valdecañas (CC) 5 el 26/07/13 y 4 el 02/08/14 (S. Mayordomo). Uno en el embalse del Salor (CC) el 01/08/14 (S. Mayordomo). Uno en Los Canchales (BA) el 02/08/14 (J. G. Aparicio).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus regional. Muy escasa pero regular en ambos pasos. Invernada regular hasta finales de los 1990 en el sur de Cáceres (unos 10 ind.), pero sin registros en 1998-2008 y a partir de 2009 sólo citas esporádicas. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2010. Un registro postnupcial. En Casas de Hitos (BA-CC) uno los días 05/09/10 (E. Palacios, S. Fletcher y S. Mayordomo) y 11/09/10 (M. Kelsey).
- Año 2011. Un registro prenupcial y 6 postnupciales. En la laguna de Galisteo (CC) uno el 22/04/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en el embalse de Portaje (CC) el 31/07/11 (S. Mayordomo). Uno en el embalse del Salor (CC) el 28/08/11 (S. Fletcher). Uno en el embalse de Talaván

(CC) los días 06/09/11 (S. Mayordomo) y 8/09/11 (M. Kelsey). En Los Canchales (BA) 3 el 11/09/11 (E. Palacios, J. C. Paniagua y S. Mayordomo). Uno en Casar de Cáceres (CC) el 23/09/11 (A. Ceballos). Uno en Esparragalejo (BA) del 22 al 29/10/11 (A. Cangas, E. del Viejo, J. C. Paniagua, L. Alcántara).

- Año 2012. Tres registros invernales, 4 prenupciales y 4 postnupciales. En el embalse de Alqueva, Olivenza (BA), uno el 20/01/12 (S. Mayordomo). En el embalse de Montijo (BA) 3 el 21/02/12 (F. Prieto). En Esparragalejo (BA), uno del 21 al 26/02/12 (F. Prieto, S. Mayordomo, F. Montaña, A. Sánchez); uno del 06 al 11/04/12 (F. Montaña, J. P. Prieto, C. Crisóstomo) y 3 el 31/07/12 (F. Montaña). En Los Canchales (BA), 2 el 12/03/12 (F. Montaña, J. A. Delgado y J. Vázquez); 3 el 26/03/12 (F. Montaña) y uno el 25/09/12 (J. Vázquez). En arrozales de Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC) uno el 01/05/12 (M. Kelsey) y otro en Puebla de Alcollarín (BA) el 10/05/12 (J. P. Prieto). En el embalse de Morantes (BA), 2 el 23/09/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente).
- Año 2013. Un registro invernal, uno prenupcial y 5 postnupciales. Uno en el embalse de Portaje (CC) el 17/01/13 (S. Mayordomo). En Guareña (BA), 2 el 11/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez), uno el 27/04/13 (E. Charles, E. Palacios, F. Montaña y otros), 2 el 06/05/13 (M. Gálvez) y uno el 10 y 11/05/13 (M. Gálvez, A. Núñez, S. Mayordomo y otros). En Los Canchales (BA) 2 el 21/07/13, 2 el 17/08/13 (C. Clemente y S. Mayordomo), uno el 25/08/13 (J. G. Aparicio), 2 el 31/08/13 (A. Núñez, J. Solana, V. de Alba) y 3 el 29/09/13 (E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez y S. Mayordomo). Uno en el embalse de Alange (BA) el 06/09/13 (J. Guerra, J. A. Román y M. Gálvez). Uno en La Albuera (BA) el 13/09/13 (F. Montaña). Uno en el embalse del Salor, Cáceres, el 27/10/13 (A. Ceballos).
- Año 2014. Un registro invernal, 4 prenupciales y 5 postnupciales. Uno en Puebla de Alcollarín (BA) el 21/01/14 (M. Cardalliaguet y J. P. Prieto). Uno en El Torviscal (BA) el 17/03/14 (M. Gálvez). Uno en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 18/03/14 (J. Guerra). En Palazuelo (BA) uno el 21/03/14 y el 01/04/14 (M. Kelsey). Uno en la gravera del Soto (BA) el 15/04/14 (M. Gálvez, P. Goñi y J. L. Guisado). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 03/05/14 (J. Muddeman). Uno en Los Canchales (BA) el 12/08/14 (F. Montaña y J. Vázquez), el 31/08/14 (F. Bernáldez), el 03 y el 06/09/14 (M. Gálvez, J. Guerra, M. Infantes y M. Oro), 2 el 15 y el 17/09/14 (J. Guerra, F. Montaña, J. Vázquez, M. Gálvez) y uno el 21/09/14 (F. Bernáldez y F. Macías). 4 en Esparragalejo (BA) el 09/09/14 (J. L. Bautista). 2 en el embalse de Morantes (BA) el 13/09/14 (J. L. Bautista). Uno en el embalse del Salor, Cáceres, el 18/09/14 (M. Kelsey).

Correlimos culiblanco (*Calidris fuscicollis*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Esparragalejo en octubre de 2011.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primer registro para Extremadura. Uno en la charca de Esparragalejo (BA) el 19/10/11 (F. Prieto), el 20/10/11 (Á. Sánchez, Á. L. Sánchez y F. Prieto) y el 22/10/11 (A. Cangas, Á. Sánchez, E. del Viejo y J. C. Paniagua).

Correlimos pectoral (*Calidris melanotos*)

Estatus regional. Accidental. 9 registros de 10 aves; todos juveniles excepto uno; en 2002, 2006, 2008 (3), 2010, 2011, 2012 y 2014; en julio (1), septiembre (6) y octubre (2); en Galisteo, Talaván, Valdesalor (2), Casar de Cáceres, Los Canchales y Esparragalejo (3). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros anteriores. Uno en Los Canchales el 14/09/02 (F. Prieto). Uno el 05 y 06/09/06 en el embalse de Valdesalor (S. Molano). Uno en el embalse de Talaván el 12/09/08 (S. Mayordomo). Uno en el embalse del Casar de Cáceres el 16/09/08 y otro en el embalse de Valdesalor el 14/10/08 (C. Fernández).
- Nuevos registros. En la laguna de Galisteo (CC) 2 del 17 al 19/09/10 (R. Montero, J. Prieta, S. Mayordomo, C. Clemente, E. Palacios, M. Á. Muñoz y J. R. Martín). Un joven en la charca de Esparragalejo (BA) los días 21/10/11 (M. Rouco y S. Mayordomo), 22/10/11 (A. Cangas, Á. Sánchez, E. del Viejo y F. Prieto) y 29/10/11 (L. Alcántara). Un adulto en Esparragalejo el 13/07/12 (Á. L. Sánchez y Á. Sánchez) y el 14/07/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente). Un juvenil en Esparragalejo los días 19/09/14 (V. de Alba, M. Gálvez, J. Guerra, F. Montaña y A. Núñez), 20/09/14 (A. Cangas, T. Cordero y E. del Viejo), 21/09/14 (L. Alcántara, J. L. Bautista, F. Bernáldez y F. Macías), 22/09/14 (J. Vázquez) y 24/09/14 (J. A. Román).

Correlimos zarapitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus regional. Escasa en paso postnupcial (agosto-octubre) y paso prenupcial (abril-mayo) y accidental en invernada (5 registros). Monotípica.

Criterio. Invernada, fechas extremas, agrupaciones (>10).

- Registros invernales. 2 en Santa Amalia (BA) el 23/12/12 (Á. Sánchez). Uno en Guadiana del Caudillo (BA) el 22/12/13 (P. Herrador).

- **Año 2009.** Prenupcial: En Miajadas (CC), 2 el 17/03/09 (S. Fletcher). Uno en Palazuelo (BA) el 08/05/09 (M. Kelsey). Postnupcial: Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 12/08/09 (M. Kelsey). Uno Los Canchales (BA) el 07/09/09 (J. L. Valiña).
- **Año 2010.** Prenupcial: En la laguna de Galisteo (CC), 2 el 07/04/10 (J. Prieta). Postnupcial: Un adulto el 27/08/10 en Talaván (CC) (S. Mayordomo). 2 adultos y un joven en el embalse del Salor (CC) el 04/09/10 (C. Fernández y J. Jaén). Un joven en Portaje (CC) el 26/09/10 (S. Mayordomo). Uno en Valdecañas (CC) el 17/10/10 (J. Briz y V. Risco).
- **Año 2011.** Prenupcial: 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 8/04/11 (J. Muddeman). Uno en La Albuera (BA) el 01/05/11 (J. Guerra y M. Galvez). En Torremejía (BA) uno el 11/05/11 (M. Kelsey). Postnupcial: 15 en Valdecañas (CC) el 28/07/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). 2 en el embalse del Salor (CC) el 29/07/11 (S. Mayordomo). 2 en La Albuera (BA) el 02/08/11 (A. Núñez). 4 en Puebla de Alcollarín (BA) el 29/10/11 (J. P. Prieto). 2 en Esparragalejo (BA) el 30/10/11. Uno en Campo Lugar-Palazuelo (CC/BA) el 31/10/11 (M. Kelsey).
- **Año 2012.** Prenupcial: En Santa Amalia, 2 el 11/02/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente) y 4 el 14/02/12 (F. Montaña). Uno en Valdecañas (CC) el 19/04/12 y 3 nupciales el 15/05/12 (Á. Sánchez). 2 en Esparragalejo (BA) el 25/04/12 (E. del Viejo y A. Cangas). En Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC), 5 el 05/05/12, **25** el 13/05/12 y uno el 21/05/12 (M. Kelsey). El 06/05/12, **10** en el embalse de Alange (BA) (L. Alcántara). Uno en Los Canchales (BA) 06/05/12 (F. Lopo, E. del Viejo y A. Cangas). 9 en Puebla de Alcollarín (BA) el 12/05/12 (J. P. Prieto). Postnupcial: 2 en Portaje (CC) el 26/07/12 (S. Mayordomo). El 31/07/12, uno en Villalba de los Barros (BA) (V. de Alba y A. Núñez). 5 en Esparragalejo (BA) el 31/07/12 (F. Montaña). 3 en La Haba (BA) el 04/08/12 (J. P. Prieto). Un juvenil en la laguna de Galisteo (CC) el 24/09/12 (S. Mayordomo) y 26/09/12 (J. Prieta). Un joven en Portaje (CC) el 02/10/12 (S. Mayordomo). 2 en El Borbollón (CC) el 12/10/12 (S. Mayordomo).
- **Año 2013.** Prenupcial: 2 en Santa Amalia (BA) el 11/04/13 (F. Yuste). En Guareña (BA) 2 el 12/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y uno el 08, 10 y 11/05/13 (A. Núñez, E. Palacios, F. Montaña, J. Solana, M. Gálvez, S. Mayordomo, V. de Alba). Postnupcial: En Valdecañas (CC), 12 el 26/07/13 (S. Mayordomo). Uno en la charca de Esparragalejo (BA) el 30/07/13 (E. del Viejo). Uno en Moheda Alta (BA) el 31/07/13 (M. Kelsey). Uno en el embalse del Moral (BA) el 08/11/13 (A. Núñez y V. de Alba). 2 en Santa Amalia (BA) el 09/11/13 (F. Montaña y G. Montaña). Uno en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 17/11/13 (M. Kelsey).

- **Registros 2014. Prenupcial:** En Casas de Hitos (BA-CC) 3 el 24/04/14 (M. Kelsey y E. Owen) y el 03/05/14 (J. Muddeman). Uno en Palazuelo (BA) el 14/05/14 (J. P. Prieto). Uno en Valdecañas (CC) el 17/05/14 (M. Kelsey). Uno en Alcollarín (CC) el 11/06/14 (M. Kelsey). **Postnupcial:** 4 en La Albuera (BA) el 19/07/14 (F. Bernáldez) y 3 el 27/07/14 (A. Cangas, E. del Viejo, M. del Viejo y F. Montaña). 6 en Valdecañas (CC) el 02/08/14 (S. Mayordomo). Uno en Los Canchales (BA) el 02/08/14 (J. G. Aparicio). En Esparragalejo (BA) 3 el 21 y 24/09/14 (L. Alcántara, M. Kelsey, J. A. Román) y uno el 26/09/14 (J. A. Román). Uno en Palazuelo (BA) el 11/11/14 (M. Gálvez).

Correlimos común (*Calidris alpina*)

Estatus regional. Migrante común, sobre todo en paso prenupcial. Invernada común (3.000-5.000 ejemplares), con tendencia creciente sujeta a fluctuaciones. Subespecie *C.a.alpina*, en menor número *C.a.schinzii* y en paso *C.a.arctica*.

Criterio. Fenología, cifras de interés (>50, en Vegas Altas >250).

- **Censos de enero 2009-2014.** Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 1.120 individuos en 2009, 2.502 en 2010, cero en 2011, 4.026 en 2012, 3.121 en 2013 y 4.304 en 2014 (media 3.817 aves en 2012-2014). Casi toda la población regional se concentra en los arrozales de Vegas Altas, donde el máximo es de 4.217 aves en enero de 2014. En parte por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, pero aparentemente la tendencia es positiva (media de 10 aves en 1993-1995, de 1.132 en 2005-2008 y de 3.817 en 2012-2014).
- **Cifras de interés.** 600 en Santa Amalia (BA) el 08/11/11 (F. Yuste). 180 en Puebla de Alcollarín (BA) el 09/11/11 (J. P. Prieto y S. Mayordomo). Más de 1.000 en Santa Amalia (BA) el 06/01/12 (F. Yuste).
- **Primeros en paso postnupcial.** 6 en Portaje (CC) el 20/07/09 (S. Mayordomo). 4 en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela (BA), el 20/07/10 (M. Kelsey). 2 en el embalse del Salor, Cáceres, el 24/07/10 (C. Fernández). Uno en Portaje (CC) el 22/07/11 y 2 en el embalse del Salor (CC) el 23/07/11 (S. Mayordomo). Uno en Portaje (CC) el 12/07/12 (S. Mayordomo). En la charca de Esparragalejo (BA), 2 el 13/07/12 (Á. L. Sánchez y Á. Sánchez) y uno el 14/07/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente). Uno en La Albuera (BA) el 13/07/13 (J. C. Paniagua). Uno en Valdecañas (CC) el 26/07/13 (S. Mayordomo). 2 en La Albuera (BA) el 19/07/14 (F. Bernáldez). Un joven en el embalse del Salor, Cáceres, y un adulto en el embalse del Sotillo, Monroy (CC), el 01/08/14

(S. Mayordomo). 2 en Valdecañas (CC) (S. Mayordomo) y uno en Los Canchales (BA) el 02/08/14 (J. G. Aparicio).

- Últimos en paso prenupcial. En Portaje (CC), uno el 22/05/09, 2 el 07/05/10 y 3 el 16/05/10 (S. Mayordomo). El 02/05/11, uno nupcial en Casas de Hitos (BA-CC) (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo) y 7 en Torremejía (BA) (A. Núñez). 2 en Torremejía (BA) el 11/05/11 y uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 14/05/11 (M. Kelsey). 12 en Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC) el 21/05/12 (M. Kelsey). Uno en el embalse del Salor (CC) el 22/05/12 (S. Mayordomo).
- Registros en junio. 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 05/06/09 (M. Kelsey y J. Hawkins). Uno en Valdecañas el 14/06/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado y M. Flores), 2 el 16 y 17/06/11 y uno el 20/06/11 (S. Mayordomo, J. Briz, J. Prieta, V. Risco). Uno en el embalse de Llerena (BA) el 05/06/12 (J. Vázquez y F. Montaña).

Correlimos canelo (*Tryngites subruficollis*)

Estatus regional. Accidental. Cuatro registros en Valdecañas (octubre 2010), Galisteo (octubre 2011) y Portaje y Los Canchales (septiembre 2012).

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primeros registros para Extremadura: Uno en Valdecañas (CC) el 15/10/10 (Á. Sánchez). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 05/10/11 (J. Prieta). Uno en Portaje (CC) los días 13/09/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz y E. Palacios), 20/09/12 (S. Mayordomo) y 22/09/12 (J. Ceballos y A. Ceballos). Uno en Los Canchales (BA) el 25/09/12 (J. Vázquez, J. Solana y A. Núñez).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus regional. Migrante común, sobre todo en paso prenupcial. Invernante común (300-1.000 ejemplares) con tendencia creciente sujeta a fluctuaciones. Monotípica.

Criterio. Fenología, censos en enero, cifras de interés (>100).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 178 individuos en 2009, 210 en 2010, cero en 2011, 645 en 2012, 270 en 2013 y 574 en 2014 (media 396 aves en 2012-2014). Casi toda la población regional se concentra en los arrozales de Vegas Altas, donde el máximo es de 631 aves en enero de 2012. En parte por el mayor esfuerzo

las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, pero aparentemente la tendencia es positiva a largo plazo (media de cero aves en 1993-1995, de 128 en 2005-2008 y de 396 en 2012-2014).

- Últimos en paso prenupcial. Uno en Portaje (CC) el 07/05/10 (S. Mayordomo). Uno en el embalse del Salor (CC) el 12/05/12 (J. L. Bautista e I. Jerez). 30 en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 13/05/12 (M. Kelsey).
- Primeros en paso postnupcial. 2 en Galisteo (CC) el 13/07/09 (J. Prieta). 23 en Casas de Hitos (BA-CC) el 16/07/09 (M. Kelsey). 40 en Casas de Hitos (BA-CC) el 20/07/10 (M. Kelsey). Uno en Valdecañas (CC) el 28/07/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). En Valdecañas (CC), un macho los días 07 y 27/07/12 (S. Mayordomo). El 28/07/12, 35 en Santa Amalia (BA) (F. Yuste) y 3 en el embalse del Cubilar (CC) (S. Mayordomo). 12 machos en Palazuelo (BA) el 06/07/13 (M. Kelsey). Una pareja en Esparragalejo (BA) el 21/07/13 (C. Clemente, M. García del Rey y S. Mayordomo). Una hembra en Galisteo (CC) el 25/07/13 (S. Mayordomo).
- Registros en junio. Uno en El Batán (CC) el 22/06/12 (S. Mayordomo). 7 en Palazuelo (BA) el 30/06/13 (J. L. Pérez Chiscano y J. P. Prieto).
- Cifras destacadas. 100 en Miajadas (CC) el 17/03/09 (S. Fletcher). En Santa Amalia (BA) 400 el 30/12/10, 300 el 29/01/11, 350 el 13/03/10, 60 el 08/09/11, 100 el 03/11/11 (F. Yuste) y 268 el 23/12/12 (Á. Sánchez). 120 en Campo Lugar-Palazuelo (CC/BA) el 28/09/11 (M. Kelsey).

Agachadiza chica (*Lymnocryptes minimus*)

Estatus regional. Escasa en paso e invernada (¿100-1.000? ejemplares), aunque por su difícil detección pasa desapercibida y las observaciones son casuales. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2009. Una en Talaván (CC) el 26/02/09 (S. Mayordomo). Una en Madrigalejo (CC) el 28/02/09 (M. Á. Muñoz y F. Ramírez). Una en Arrocampo (CC) el 08/04/09 (R. Montero).
- Año 2010. Una en Ayuela (CC) el 05/01/10 (A. Maestre y C. Luengo).
- Año 2011. Una en Arrocampo (CC) el 12/03/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). Una en El Batán (CC) el 30/12/11 (J. C. Paniagua y S. Mayordomo).
- Año 2012. Una en Cañaverál (CC) el 11/01/12 (S. Mayordomo).
- Año 2013. 2 en Torremejía (BA) el 13/01/13 (J. G. Aparicio). 6 en Santa Amalia (BA) el 14/01/13 (J. Fernández). Una en un canal en Galisteo

(CC) el 11/11/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en Riobos (CC) el 13/11/13 (S. Mayordomo). 4 en Palazuelo (BA) el 24/11/13 (M. Á. Muñoz). 2 en el río Guadalupejo, Alía (CC), el 03/12/13 (J. Á. Herrera y N. Baeza). Una en El Batán (CC) el 06/12/13 (S. Mayordomo) y 09/12/13 (J. Prieta).

- Año 2014. Una en Valverde de Mérida (BA) el 03/02/14 (J. Guerra). 5 en Puebla de Alcollarín (BA) el 08/02/14 (J. Pérez, J. Portillo, A. Sanmartí). Una en Talaván (CC) el 15/02/14 (J. J. Ramos). Una en Villagonzalo (BA) el 13/03/14 (M. Gálvez). Una en Arrocampo (CC) el 16/03/14 (S. Mayordomo) y 5 el 20/12/14 (C. Clemente, S. Mayordomo, E. Palacios, M. R. Esteban). Una en Palazuelo (BA) el 17/03/14 (M. Gálvez). Una en el río Guadalupejo, Alía (CC), el 12/12/14 (J. Á. Herrera).

Agachadiza común (*Gallinago gallinago*)

Estatus regional. Migrante frecuente. Invernante común (¿25.000? ejemplares) con tendencia decreciente. Subespecie *G.g.gallinago*.

Criterio. Fenología, censos en enero y observaciones de interés.

- Censos de enero 2009-2014. Los censos de aves acuáticas no son representativos para esta especie, no obstante, las cifras obtenidas en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se anotaron 816 ejemplares en 2009, 621 en 2010, cero en 2011, 4.228 en 2012, 3.431 en 2013 y 2.379 en 2014 (3.346 de media en 2012-2014). Las mayores cifras se obtienen en arrozales de Vegas Altas con un máximo de 3.346 en enero de 2012, que sin duda es sólo una fracción de las aves presentes.
- Tendencia. En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “declive moderado” (-60%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Cifras de interés. 155 en Palazuelo (BA) el 24/01/10 (M. Kelsey). 1.000 en Santa Amalia (BA) el 06/10/11 (Á. Sánchez) y 500 el 08/11/11 (F. Yuste). 460 en Galisteo (CC) el 03/12/11 (S. Mayordomo). 850 en Mengabril (BA) el 24/02/13 (M. Gálvez).
- Últimos registros. En Galisteo (CC), 3 el 17/04/09 (S. Mayordomo), una el 13/04/10 (J. Prieta) y 2 el 16/04/10 (S. Mayordomo). Una en Moheda Alta (BA) el 12/04/11 (M. Kelsey). 3 en Galisteo (CC) el 15/04/11 (S. Mayordomo). Una en Riobos (CC) el 22/04/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). Una en Torrealba (CC) el 18/04/12 (S. Mayordomo). Una en Galisteo (CC) el 21/04/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, I. Mairlot, E. Palacios y A. Ruiz). Una en Arrocampo (CC) el 07/04/13 (E. Palacios, J. Prieta, J. Sargatal y S. Mayordomo). Varias en Santa Amalia (BA) el 11/04/13 (F. Yuste). Una en Guareña (BA) el 25/04/13 (J. Guerra y M.

Gálvez). Una en Alange (BA) el 11/04/14 (Á. Sánchez). Una en Valverde de Mérida (BA) y otra en Torremejía (BA) el 15/04/14 (M. Gálvez, P. Goñi y J. L. Guisado). Una en el río Gargáligas (BA) el 08/05/14 (M. Kelsey).

- Llegadas. Una en de Portaje (CC) el 20/07/09 (S. Mayordomo). Una en Galisteo (CC) el 22/07/10 (S. Mayordomo). 4 en Galisteo (CC) el 27/07/11 y una Portaje (CC) el 31/07/11 (S. Mayordomo). El 26/07/12, 2 en Palazuelo-Campo Lugar (CC-BA) (M. Kelsey) y 3 en Galisteo (CC) (S. Mayordomo). Una en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 30/07/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Una en Vegas Altas (BA) el 31/07/13 (M. Kelsey). Una en Lancho, Arroyo de la Luz (CC), el 20/07/14 y el 24/07/14 (S. Molano). Varias en Santa Amalia (BA) el 31/07/14 (F. Yuste).

Agachadiza real (Gallinago media)

Estatus regional. Especie pendiente de confirmar.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Pendiente de homologación. Un ejemplar en el embalse de Los Canchales (BA) el 12/03/12 (F. Montaña, J. Vázquez y J. A. Delgado). Otra observación de 3 aves en Madrigalejo (CC) 01/04/11 ha sido rechazada por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Chocha perdiz (Scolopax rusticola)

Estatus regional. Invernante común (¿2.500-5.000? ejemplares) con grandes fluctuaciones y tendencia desconocida. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2009. Una en Plasencia (CC) el 07/01/09 (J. Prieta). Una en Navezuelas (CC) el 27/01/09 (M. Kelsey). Una en Casas del Castañar (CC) el 10/02/09 (J. Prieta). Una en Burguillos del Cerro (BA) el 26/12/09 (G. Schreur).
- Año 2010. Una en Higuera la Real (BA) el 16/02/10 (G. Schreur). Una en la Dehesa Boyal de Montehermoso (CC) el 26/12/10 (C. Clemente). Una en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 31/12/10 (J. C. Paniagua).
- Año 2011. Una en Mohedas de Granadilla (CC) el 14/11/11 (A. Pacheco). Una los días 22/11/11 y 23/11/11 en Trujillo (CC) (M. Kelsey). Una en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 29/12/11 (J. C. Paniagua). Una en la Dehesa Boyal de Montehermoso (CC) el 30/12/11 (C. Clemente).

- Año 2012. Una en el Valle del Viar, Monesterio (BA), el 08/01/12 y 3 en Palomero (CC) el 06/02/12 (A. Pacheco). Una en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 26/02/12 (J. C. Paniagua). Una en Las Mestas (CC) el 13/12/12 (A. Pacheco). Una en Casas del Castañar (CC) el 20/12/12 (J. Prieta).
- Año 2013. Una en el río Matachel, Alange (BA), el 25/02/13 (J. Guerra). Una en Puebla de Obando (BA) el 15/11/13 (J. L. Bautista y P. Herrador). Una en el Guadalupejo, Alía (CC), el 04/12/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera y N. Baeza). 2 en Cornalvo (BA) el 09/12/13 (J. Guerra). En el Tajo Internacional (CC), una fototrampeada el 11 y 13/12/13 (F. García).
- Año 2014. Una en Bodonal de la Sierra (BA) el 02/03/14 (F. Montaña). Una en el pinar de Granadilla (CC) el 01/04/14 (R. Montero). Una en La Zarza (BA) el 28/10/14 (J. Guerra). Una en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 20/11/14 (A. Pacheco). Una en el Guadalupejo, Alía (CC), el 10/12/14 (J. Á. Herrera). Una en Portanchito, Cáceres, el 17/12/14 y otra en Aldea del Cano (CC) el 19/12/14 (J. Gutiérrez del Sol). 2 en Moheda Alta (BA) el 27/12/14 (Á. Díaz y M. Llorente). Una en Alange (BA) el 28/12/14 (L. Alcántara).

Aguja colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus regional. Invernante escasa. Común en paso prenupcial (30.000 ejemplares) y escasa en el postnupcial. Tendencia creciente a largo plazo y estable a corto plazo. Subespecies *L.l.limosa* y *L.l.islandica* (8% en paso prenupcial).

Criterio. Fenología, cifras destacadas (>500) y localidades de interés.

- Migración prenupcial. Revisión. Fenómeno reciente consecuencia del incremento del cultivo de arroz en Extremadura. En la década de 1980 no hacía escala, en los años 1990 paran unos 4.000 ejemplares y en el siglo XXI se estabiliza en 25.000-30.000 aves. Casi la totalidad en Vegas Altas, inicialmente en el sector oriental (Palazuelo-Madrigalejo), pero desde los años 2000 en el sector oeste (Santa Amalia, Hernán Cortés y Yelbes). Dos oleadas migratorias en torno al 20 de enero y al 10 de febrero. En la primera la estancia es más larga (mínimo 40 días) con salida tardía (media 1 de marzo); la segunda dura menos (mínimo 17 días) y se acaba antes (media 24 de febrero). Estancia media conjunta de 22 días, con salida completa en torno al 15 de marzo. Máximos en febrero, variando entre la primera y la última semana. La media de las máximas es de 24.200 aves (15% de la población de la ruta Atlántica Este), con máximo conocido de 27.643 el 07/02/04. Importante aumento en Extremadura y Doñana como alternativas a la degradación de las escalas tradicionales en el noroeste de África.

- Censos de enero 2009-2014. Dado que enero es época de migración prenupcial, estos censos no determinan la presencia de invernantes estrictos. Las oscilaciones pueden ser muy grandes en cuestión de días. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 12.820 individuos en 2009, 1.874 en 2010, cero en 2011, 7.381 en 2012, 3.431 en 2013 y 14.004 en 2014 (media 8.272 aves en 2012-2014). Casi toda la población se concentra en los arrozales de Vegas Altas, donde el máximo es de 14.000 aves en enero de 2014, aunque se trata del único dato de la serie obtenido en dormidero (J. A. Maseró, J. M. Abad). Debido al mayor esfuerzo de censo, las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas en enero, con una aparente tendencia positiva (media de 3.600 en 2005-2008 y de 8.272 en 2012-2014).
- Tendencia. En Europa, origen de las aves invernantes y migradoras, la tendencia es “declive moderado” (-40%) en el periodo 1980-2012, siendo más patente desde 1990 (PECBMS, 2015).
- Paso prenupcial. Una en Galisteo entre el 25/11/11 (E. Palacios y S. Mayordomo) y el 22/12/11 (J. Prieta y S. Mayordomo). 12 en Hernán Cortés (BA) el 29/12/11 (A. Fernández). Una en Moheda Alta (BA) el 06/04/12 (M. Kelsey). Una en el embalse Lancho (CC), el 11/04/12 (S. Mayordomo).
- Registros en mayo y junio. En Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), una el 05/05/12, una el 26/05/12, 4 el 09/06/13 y 16 el 30/06/13 (J. L. Pérez Chiscano, J. P. Prieto, M. Kelsey, J. Muddeman). 7 en Santa Amalia (BA) el 15/06/13 (F. Yuste). Una en Navalvillar de Pela (BA) el 19/06/13 (Á. L. Sánchez). En Valdecañas (CC), una el 23/06/13 (C. Clemente y S. Mayordomo) y 10 el 30/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo).

Aguja colipinta (*Limosa lapponica*)

Estatus regional. Migrante muy escasa. 20 registros; en 1992-1993, 1995, 1996, 1999, 2001-2003, 2008 y 2010-2014; en marzo-mayo (11) y septiembre-octubre (9); mayor grupo de 36. Subespecie *L.l.lapponica* y quizás *L.l.taymyrensis*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Una en el embalse de Molano el 02/05/92 (A. Acha, T. Velasco). Una en mayo 1993 en Cáceres (S. Lozano). Una en el azud del Guadiana el 06/05/1995 (S. Lozano). En el embalse del Salor, 3 del 20/09 al 04/10/96 (S. Lozano) y una del 05/09 al 12/09/99 (A. Moga, J. M. Clavel y J. Jaén). Una el 13/05/01 en La Albuera (F. Gragera). En Los Canchales, una el 1/09/01 (X.

Piñeiro), una el 14/09/01 (F. Prieto y M. Cerro), 3 el 13/09/02 (F. Prieto y J. L. Valiña), 2 juveniles el 21/09/02 (J. A. García y A. Castaño), un juvenil del 18/09/03 al 24/09/03 (F. Prieto). Una en Vegas Altas el 23/04/08 (S. Villa). Una en Casas de Don Antonio el 17/09/08 (C. Fernández y F. Carrero).

- **Nuevos registros.** En Portaje (CC) 2 el 07/05/10 (S. Mayordomo). En Casas de Hitos (BA-CC), una hembra nupcial el 21/04/11 (M. Kelsey). En el embalse de Talaván (CC) un joven del 06/09/11 (S. Mayordomo) al 15/09/11 (J. Guerra, M. Gálvez, M. Kelsey y S. Mayordomo). En Los Canchales (BA) 2 el 12/03/12 (F. Montaña, J. A. Delgado y J. Vázquez). En Santa Amalia (BA) una el 11/04/13 (F. Yuste). Mayor bando en Extremadura en Aldea del Cano (CC), **36** el 29/04/13 (C. Giner). En Charco Salado (CC) un juvenil los días 20/09/13 (J. Prieta), 21/09/13 (E. Palacios) y 25/09/13 (R. Montero). En Talaván (CC) 2 el 21/09/13 (J. Esteban). En arrozales de Riobos (CC) una el 23/05/14 (J. Prieta).

Zarapito trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus regional. Migrante prenupcial muy escaso (marzo-junio). Migrante postnupcial esporádico (julio-octubre). Invernante excepcional (2 registros en enero). 55 registros entre 2004 y 2014. Subespecie *N.p.phaeopus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Registros invernales.** 2 registros. Uno en el embalse de Llerena (BA) el 24/01/09 (J. Salcedo). Uno en Santa Amalia (BA) el 31/01/11 (Á. Sánchez).
- **Paso prenupcial.** 16 registros. Uno en Palazuelo (BA) el 03/05/09 (M. Kelsey). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 13/04/10 (J. Prieta). 2 en Los Canchales (BA) el 12/03/12 (F. Montaña, J. A. Delgado y J. Vázquez). En Campo Lugar (CC), 4 el 15/04/12 y 13 el 25/04/12 (M. Kelsey). Uno en el embalse de Plasencia (CC) el 15/04/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez y E. Palacios). 2 en Alburquerque (BA) el 21/04/12 (G. Schreur). En Arrocampo (CC), **27**, mayor bando en Extremadura, el 22/04/12 (J. Julián) y 8 los días 27/04/12 (G. Schreur) y 28/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). En Talaván (CC), uno los días 26/04/12 (G. Schreur) y 29/04/12 (A. Jiménez). Uno en Murtales, La Nava de Santiago (BA), el 01/05/12 (P. Herrador). En Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC), uno el 05/05/12 y 5 el 08/05/12 (J. Muddeman). 2 en Valdecañas (CC) el 20/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). 2 en el embalse de Montijo (BA) el 30/05/12 (F. Montaña, E. del Viejo y A. Ruiz). Uno en Sierra Brava (CC) el 27/04/13 (J. Olsson, P. Wohlin, S. Carlström y T. Magnusson). Uno en Palazuelo (BA) el 02/05/13 (M. Kelsey). Uno en Valdecañas (CC) el 18/04/14 (S. Mayordomo). 3 en Casas de Hitos (BA-CC) el 24/04/14 (M. Kelsey y E. Owen), y uno el 11/05/14 y el 12/05/14 (M. Kelsey).

- Paso postnupcial. 3 registros. Uno en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela (BA), el 20/07/10 (M. Kelsey). Uno en Portaje (CC) el 03/08/10 (S. Mayordomo). Uno en la laguna Grande de La Albuera (BA) el 23/08/13 (F. Montaña).

Zarapito real (*Numenius arquata*)

Estatus regional. Migrante escaso. Invernante escaso (20-100 ejemplares) con tendencia positiva sujeta a fluctuaciones. Subespecie *N.a.arquata*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 2 individuos en 2009, cero en 2010 y 2011, 14 en 2012, 20 en 2013 y 22 en 2014 (media 19 aves en 2012-2014). Casi toda la población regional se concentra en arrozales de Vegas Altas y valle del Alagón, con máximos 21 y 18 respectivamente. En parte por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, dentro de su modestia, con una aparentemente tendencia positiva (media 4 aves en 2005-2008 y de 19 en 2012-2014).
- Año 2009. En Galisteo (CC), uno el 17/02/09 (J. Prieta), uno el 19/02/09 y 2 el 07/03/09 (S. Mayordomo). 2 en Miajadas (CC) el 17/03/09 (S. Fletcher).
- Año 2010. Uno en Calzadilla (CC) el 13/02/10 (C. Clemente y J. Mahillo). Uno en Riobobos (CC) el 19/12/10 (C. Clemente y J. Mahillo). En Galisteo (CC), invernada del 06/01/10 al 21/03/10 (J. Julián, R. Guzmán, J. Prieta y S. Mayordomo) con máximo de **29** el 11/03/10 (S. Mayordomo); uno el 22 y 28/08/10 (M. García del Rey, S. Mayordomo, J. Gayo); y 8 el 22/12/10 (R. Montero). Varios en Palancoso, Navalmoral de la Mata (CC), el 29/01/10 (J. Briz y V. Risco). En Arrocampo (CC), 7 el 01/01/10 (M. Kelsey), uno el 26/02/10 (J. Muddeman) y el 21/03/10 (J. Briz). Uno en Lancho (CC) el 10/12/10 (S. Mayordomo). **15** en Casar de Miajadas (CC) el 24/12/10 (M. Rodríguez). 8 en Casas de Hitos (BA-CC) el 24/01/10 (SEO-Cáceres). En Palazuelo (BA), **10** el 24/01/10 (M. Kelsey) y uno el 21/03/10 (D. Langlois y S. Langlois). 5 en el embalse de Los Canchales (BA) el 06/12/10 (Á. Sánchez). 4 en Santa Amalia (BA) el 18/12/10 (F. Yuste).
- Año 2011. Uno en Guijo de Coria (CC) el 08/11/11 y 4 en Portaje (CC) el 22/11/11 (J. Prieta y S. Mayordomo). Uno en Gabriel y Galán (CC) el 05/11/11 (A. Pacheco). 2 en El Batán (CC) el 19/01/11 (J. Prieta). En Riobobos (CC), **21** el 12/02/11, 3 el 22/02/11 y 16 el 17/03/11 (S. Mayordomo). En Galisteo (CC), **34** el 7/01/11, 30 el 19/01/11, **34** el

04/02/11 y uno el 20/02/11; 2 el 25/11/11 y uno el 21/12/11 (J. Prieta, E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Charco Salado (CC) el 28/12/11 (S. Mayordomo). En Arrocampo (CC), 5-10 del 04 al 15/01/11 con máximo el 08/01/11 (J. Briz, M. García del Rey, S. Mayordomo, D. Langlois, S. Langlois, V. Risco, M. Kelsey). 2 en Valdecañas (CC) el 23/08/11 (J. Prieta). 7 en Casas de Hitos (CC/BA) el 04/02/11 (S. Fletcher). 2 en Palazuelo (BA) el 28/01/11 (M. Kelsey). Uno en Santa Amalia (BA) el 31/01/11 (Á. Sánchez). Uno en el embalse de Montijo (BA) el 03/04/11 (J. Solana).

- Año 2012. 2 en Gabriel y Galán (CC) el 14/08/12 (J. Montero). Uno en Riolobos (CC) el 06/12/12 (S. Mayordomo). En Galisteo (CC), invernada entre el 28/01/12 y el 12/03/12 con máximo de 7 el 15/02/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y E. Palacios). Uno en Valdecañas (CC) el 02/12/12 (V. Risco, S. Mayordomo, P. Gómez, J. Prieta y otros). 6 en Miajadas (CC) el 02/02/12 (S. Fletcher). 2 en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 08/05/12 (J. Muddeman). En Santa Amalia (BA), invernada del 02/01/12 al 01/03/12 con máximo de 7 el 26/02/12 (F. Yuste, L. Lozano, J. P. Prieto y otros). En Navalvillar de Pela (BA), uno el 09/02/12 y 4 el 16/02/12 (M. Kelsey). 8 en Hernán Cortés (BA) el 10/01/12 (J. P. Prieto). En Puebla de Alcollarín (BA), 2 el 18/01/12 (M. Cardalliaguet y J. P. Prieto) y uno el 17/11/12 (M. Kelsey). En Los Canchales (BA), 3 los días 26/03/12 (F. Montaña) y 27/03/12 (I. Sánchez, F. Lopo, E. del Viejo, C. Díaz y A. Cangas). Uno en Villalba de los Barros (BA) el 10/11/12 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez).
- Año 2013. En Galisteo (CC), 5 el 02/01/13, 7 el 23/01/13, 18 el 26/01/13, 17 el 23/02/13, **18** el 10 y 13/03/13 y 7 el 27/03/13 (J. Prieta, S. Mayordomo, R. Montero, C. Clemente, J. Mahillo); 2 en Galisteo (CC) el 15/12/13 (J. Prieta) y uno el 22/12/13 (S. Mayordomo). Uno en Vega del Haza, Malpartida de Plasencia (CC), el 13/01/13 (Ó. Llama). El 14/01/13 uno en La Atalaya, Aldea del Cano (CC) (J. Muddeman). 4 en Los Guadalperales (BA) el 20/02/13 (H. García). Uno en Gadiana del Caudillo (BA) el 04/01/13 (J. L. Bautista y P. Herrador). En La Albuera (BA), uno del 27/08/13 al 20/09/13 (J. C. Paniagua, E. del Viejo y otros). Uno en Los Canchales (BA) el 14/01/13 (J. Solana). En Guareña (BA), uno el 14 y 15/04/13 (A. Núñez, F. Castro, F. Lopo y otros).
- Año 2014. Uno en Valdecañas (CC) el 15/12/14 (S. Mayordomo). 2 en Hitos de Abajo, Campo Lugar (CC), el 28/01/14 (J. Muddeman). En Palazuelo (BA), uno el 02/01/14 (A. Calvo), 3 el 26/02/14, uno el 06/03/14, 5 el 12/12/14 y uno el 28/12/14 (A. Mendoza, J. P. Prieto, G. Schreur, M. Kelsey). En Puebla de Alcollarín (BA), 2 el 07/01/14, 4 el 08/01/14, **19** el 09/01/14, 9 el 11/01/14 y **15** el 21/01/14 (M. Cardalliaguet, J. P. Prieto, M. Kelsey, A. Gil y otros). En Santa Amalia

(BA), 3 el 11/01/14 (F. Montaña y G. Montaña), 3 el 21/01/14 (J. Prieta), 2 el 15/02/14 y 4 el 22/02/14 (F. Yuste). 3 en Villanueva de la Serena (BA) (C. González) el 21/01/14. En el embalse de Llerena (BA), uno el 05/06/14 y el 07/09/14 (F. Montaña). Uno en el embalse de Cuncos, Villanueva del Fresno (BA), el 20/12/14 (F. Montaña y A. Núñez).

Andarríos chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso (¿10-50? parejas). Migrante abundante, sobre todo en paso postnupcial. Invernante escaso (500-1.000 ejemplares), con tendencia incierta. Monotípica.

Criterio. Reproducción, fenología, censos en enero y observaciones de interés.

- Censos de enero 2009-2014. Especie con presencia muy dispersa en todo tipo de humedales que no son objeto de censo, por ello los datos no son representativos. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 24 individuos en 2009, 11 en 2010, cero en 2011, 211 en 2012, 73 en 2013 y 102 en 2014 (media 129 aves en 2012-2014). La población está muy dispersa, destacando los arrozales de Vegas Altas, quizás por recibir mayor atención. En parte por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas con una aparente tendencia positiva (media 56 aves en 2005-2008 y de 129 en 2012-2014).
- Tendencia. En Europa, origen de las aves migradoras e invernantes, la tendencia es “declive moderado” (-40%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Registros en mayo. 5 en Santa Amalia (BA) el 03/05/11 (F. Yuste). Presencia en Valdecañas (CC) el 06/05/11 (Á. Sánchez). 2 en el río Jerte, Plasencia (CC) el 08/05/11 (J. Prieta). 2 en Arrocampo (CC) con comportamiento nupcial el 09/05/11 (G. Schreur). Uno en Aldea del Cano (CC) y 5 en Galisteo (CC) el 13/05/11, y uno en Guadiloba (CC) el 24/05/11 (S. Mayordomo). 3 en Valdecañas (CC) el 15/05/12 (Á. Sánchez). Uno en Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC) el 21/05/12 (M. Kelsey).
- Llegadas. Uno en Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), el 05/07/10 (S. Mayordomo). Uno en Portaje (CC) el 22/06/12 (S. Mayordomo). Uno en Valdecañas (CC) el 15/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Prieta y S. Mayordomo).
- Cifras importantes. Más de 250 en el embalse de Valdecañas (CC) el 28/07/11 y más de 150 el 19/04/12 (Á. Sánchez).

Andarríos grande (*Tringa ochropus*)

Estatus regional. Migrante frecuente. Invernante común (1.000-2.500 ejemplares) con tendencia incierta sujeta a fluctuaciones. Citado todos los meses del año. Monotípica.

Criterio. Fenología, agrupaciones (>30).

- Censos de enero 2009-2014. Especie con presencia dispersa en ríos y pequeños humedales que no son objeto de censo, por ello los datos no son representativos. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 38 individuos en 2009, 44 en 2010, cero en 2011, 403 en 2012, 269 en 2013 y 288 en 2014 (media 175 aves en 2012-2014). Casi toda la población se detecta en arrozales de Vegas Altas, con máximo de 194 aves en enero de 2012. En parte por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas con una aparente tendencia positiva (media 64 aves en 2005-2008 y de 175 en 2012-2014).
- Últimos registros. Uno en Galisteo (CC) el 18/05/11 (S. Mayordomo). 2 en el embalse del Salor (CC) el 10/05/12 (S. Mayordomo). 2 en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 13/05/12 (M. Kelsey). Uno en Riobos (CC) el 23/05/14 (J. Prieta).
- Llegadas. 3 en Galisteo (CC) el 03/06/09 (S. Mayordomo). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 05/06/09 (M. Kelsey y J. Hawkins) y 10 el 15/06/09 (M.Kelsey). En Galisteo (CC) 11 el 15/06/10 y 7 el 11/06/11 (S. Mayordomo). 6 en Vegas Altas (BA) el 16/06/11 (Á. Sánchez). 5 en el embalse del Salor (CC) el 19/06/11 (S. Mayordomo). Uno en Saucedilla (CC) el 09/06/12 (E. Palacios). 2 en Palazuelo (BA) el 16/06/12 (M. Kelsey). Uno en Badajoz (BA) el 17/06/12 (J. C. Paniagua y A. Fernández). 2 en Madrigalejo (CC) el 09/06/13 (M. Kelsey). El 15/06/13, presente en Santa Amalia (BA) (F. Yuste) y 3 en Valdecañas (CC) (C. Clemente, E. Palacios y otros). 17 en Palazuelo (BA) el 11/06/14 (M. Kelsey). Uno en Valdecañas (CC) el 12/06/14 (E. Palacios y S. Mayordomo).

Archibebe oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus regional. Migrante poco común. Invernante muy escaso (20-100 ejemplares). Tendencia creciente sujeta a fluctuaciones. Citado todos los meses del año. Monotípica.

Criterio. Invernada, fenología, agrupaciones (>20).

- Censos de enero 2009-2014. En los resultados de la Junta de Extremadura

(2009-2010) nunca fue detectado y los de SEO/BirdLife (2012-2014) se obtienen valores de 63 individuos en 2012, 5 en 2013 y 44 en 2014 (media 37 aves en 2012-2014). La principal localidad son los arrozales de Vegas Altas, con máximo de 41 aves en enero de 2012. En parte por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, dentro de su modestia, con una aparentemente tendencia positiva (media 2'75 aves en 2005-2008 y 37 en 2012-2014).

- Últimos en paso prenupcial. Uno en Los Barruecos (CC) el 24/04/09 (C. Fernández). Uno en Santa Amalia el 07/03/10 (F. Yuste). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 24/04/11 (G. Schreur y M. Kelsey). Uno en Palazuelo-Campo Lugar (BA/CC) el 05/05/12 (M. Kelsey y J. Muddeman). 24 en Palazuelo (BA) el 12/05/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano). El 25/04/13, uno en Sierra Brava (CC) (J. Olsson y otros) y otro en Valverde de Mérida (BA) (M. Gálvez). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 03/05/14 (J. Muddeman).
- Primeros en paso postnupcial. 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 16/07/09 (M. Kelsey). En Charco Salado (CC), uno el 21/07/09; 2 el 19/07/10 y 5 el 26/07/10; uno el 21/07/11 y 8, 5 de ellos en plumaje nupcial, el 26/07/11 (S. Mayordomo). En La Haba (BA) uno nupcial el 26/07/11 (J. L. Pérez Chiscano). En Charco Salado (CC) 3 el 15/07/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 5 el 23/07/12 (S. Mayordomo). Uno en Santa Amalia (BA) el 28/07/12 (F. Yuste). El 26/07/13, uno nupcial en Charco Salado (CC) y otro casi invernal en Valdecañas (CC) (S. Mayordomo). El 01/08/13, 2 en Charco Salado (CC) y uno en Valdecañas (CC) (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo). Uno en Charco Salado (CC) el 05/08/14 (J. Briz) y 3 el 15/08/14 (J. Briz, J. Gutiérrez del Sol y V. Risco). Uno en Alange (BA) el 14/08/14 (J. A. Román).
- Cifras destacadas. **120** en Santa Amalia (BA) el 21/02/09 (J. Porras). 30 en Campo Lugar-Palazuelo (CC/BA) el 28/09/11, 50 el 30/09/11 (M. Kelsey) y 47 el 07/10/11 (S. Fletcher). 23 en Torviscal (BA) el 22/10/11 (J. P. Prieto). 41 en Vegas Altas (BA/CC) el 18/01/12 (ECVA). **142** en Puebla de Alcollarín (BA) el 27/10/12 (F. Montaña y A. Núñez); *mayor registro en Extremadura*. 50 en Palazuelo (BA) el 03/10/13 (M. Kelsey) y 35 el 05/10/13 (J. Muddeman). 20 en Fernando V, Madrigalejo (CC), el 15/12/13 (M. Kelsey). 25 en Puebla de Alcollarín (BA) el 07/01/14 (M. Kelsey) y 23 el 08/01/14 (A. Gil). 50 en Palazuelo (BA) el 10/10/14 (M. Kelsey) y 51 el 30/10/14 (J. Porras).

Archibebe claro (*Tringa nebularia*)

Criterio regional. Migrante poco común. Invernante escaso (300-750 ejemplares) con tendencia estable y fluctuante. Observado todos los meses del año. Máximos en marzo-abril y septiembre. Monotípica.

Criterio. Fenología, agrupaciones (>25).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 7 individuos en 2009, 12 en 2010, cero en 2011, 175 en 2012, 93 en 2013 y 257 en 2014 (media 175 aves en 2012-2014). Casi toda la población se detecta en arrozales de Vegas Altas, con máximo de 194 aves en enero de 2014, pero es una especie con presencia muy dispersa en pequeños humedales que no son objeto de censo. En parte por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, dentro de su modestia, con una aparente tendencia positiva (media 24 aves en 2005-2008 y de 175 en 2012-2014) que probablemente sea estable con fluctuaciones.
- Concentraciones. 100 en Miajadas (CC) el 17/03/09 (S. Fletcher). 20 en la charca de Brozas (CC) el 14/10/10 (G. Schreur y J. Tarrío). 29 en el embalse del Salor (CC) el 12/08/11 (C. Fernández) y 30 el 19/08/11 (S. Mayordomo). 27 en el embalse de Ahigal (CC) el 27/09/11 (A. Pacheco). 24 en Puebla de Alcollarín (BA) el 05/11/11 (A. Gil). 25 en Palazuelo (BA) el 13/11/11 (E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M. J. Valencia, S. Mayordomo y X. Piñeiro).
- Últimos en paso prenupcial. Uno en Talaván (CC) el 22/05/09 (S. Mayordomo). 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 16/06/11 (Á. Sánchez). 3 en Valdecañas (CC) el 20/06/11 (EV2011). 12 en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 21/05/12 (M. Kelsey). Uno en Esparragalejo (BA) el 27/05/12 (Y. Simón, V. de Alba, J. Solana, G. Pizarro y A. Núñez).
- Primeros en paso postnupcial. 3 en Charco Salado (CC) el 28/07/09 (S. Mayordomo). 26 en Galisteo (CC) el 08/07/10 (S. Mayordomo). 2 en Portaje el 22/07/11 (S. Mayordomo). En Charco Salado (CC) uno el 15/07/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 6 el 23/07/12 (S. Mayordomo). El 26/07/12, uno en Valuengo (BA) (F. Montaña y D. García), y otro en Portaje (CC) (S. Mayordomo). Uno en Galisteo (CC) el 09/07/13 (S. Mayordomo). En Charco Salado (CC), 2 el 16/07/13 (J. Briz, S. Mayordomo y V. Risco) y uno el 17/07/13 (S. Mayordomo).

Archibebe patigualdo chico (*Tringa flavipes*)

Estatus regional. Accidental. 3 registros en Valdesalor (agosto 1999), Puebla de Alcollarín-Palazuelo (diciembre 2013-marzo 2014) y El Batán-Riolobos-Galisteo (diciembre 2014-marzo 2015). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Un probable adulto en el embalse de Valdesalor el 08/08/99 (A. Mogená).
- Segundo registro. Uno en los arrozales de Puebla de Alcollarín, Villar de

Rena (BA), el 30/12/13 (F. Crystal, J. G. Aparicio, J. Guerra y M. Gálvez), donde es visto del 07 al 11/01/14; se relocaliza en Palazuelo el 10/02/14 donde se observa el 12/02/14, el 18/02/14, el 22/02/14, el 26/02/14, el 06/03/14 y el 10/03/14 (numerosos observadores: A. Gil, J. Porras, J. P. Prieto, G. Schreur, J. Prieta, M. Gálvez, N. Renwick, etc.).

- Tercer registro. Uno en los arrozales de El Batán (CC) el 05/12/14 (S. Mayordomo), donde se observa el 06/12/14, el 08/12/14, el 12/12/14, el 13/12/14 y el 31/12/14; el día 06/12/14 se vio también en arrozales de Riobobos (C. Clemente, S. Mayordomo, M. Á. Muñoz y E. Palacios). El ejemplar se sigue viendo en El Batán y en diversos humedales de Galisteo hasta el 28/03/15 (numerosos observadores: S. Mayordomo, R. Montero, M. Á. Muñoz, E. Palacios, J. Prieta, R. Montero, C. Clemente y otros).

Archibebe fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus regional. Migrante esporádico. 12 registros; en 1993, 1998, 1999, 2001, 2007, 2008, 2010, 2011 (3), 2013 y 2014; en marzo (1), abril (3), mayo (1), agosto (2), septiembre (2), octubre (2) y noviembre (1).

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Uno en El Millar, Cáceres, el 19/03/93 (S. Lozano). Uno en Casas de Hito el 17/09/98 (J. M. Traverso). Un adulto en Barquera Baja, Cáceres, el 21/08/99 (M. Gálvez y E. Streich). Uno en Lancho, Arroyo de la Luz, en agosto de 2001 (X. Piñeiro). Uno en Fresnedilla, Oliva de Plasencia, el 8 (J. M. Diu) y el 9/11/2007 (J. Labra). Uno en Orellana el 15/04/08 (I. T. Escribano y J. M. Abad). No se contabilizan otros seis sin detallar en marzo, agosto, septiembre y octubre: 2 en Vegas Altas en 2004 y 4 en la provincia de Cáceres (J. A. Masero).
- Nuevos registros. Uno en Galisteo (CC) el 11/04/10 (E. Palacios y S. Mayordomo), el 13/04/10 (J. Prieta) y el 16/04/10 (S. Mayordomo). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo). Uno en Los Arenales, Cáceres (CC), el 28/09/11 (S. Mayordomo). Uno en los arrozales de La Herrerueta (CC) el 01/10/11 (P. Soper). 2 en La Albuera (BA) el 18/10/13 (F. J. Medina) y uno el 20/10/13 (F. Montañó y J. Vázquez). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 10/04/14 (J. Muddeman, D. Tyldesley y D. Tyldesley).

Andarríos bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus regional. Migrante escaso. Invernante regular, muy escaso (15-50 ejemplares), la mayoría en las Vegas Altas del Guadiana, con tendencia positiva. Monotípica.

Criterio. Invernada, fenología, agrupaciones (>10).

- Censos de enero 2009-2014. Se trata de un invernante regular reciente en muy bajo número. Nunca había sido detectado en los censos de enero hasta 2012, aunque ya se conocía su presencia invernal. Los resultados de SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 2 aves en 2012, 3 en 2013 y 9 en 2014 (media 4'6 aves en 2012-2014), en todos los casos, excepto uno, en los arrozales de Vegas Altas. La tendencia por tanto es creciente y expansiva.
- Invernada. Primeros casos en la cuenca del Tajo cacereña: Uno en la charca de Brozas (CC) el 04/01/09 (J. L. Valiña). Uno en Sierra de Fuentes (CC) el 12/01/11 (Á. Sánchez). Uno en Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), el 01/12/14 (H. Sánchez). Arrozales de Vegas Altas. Uno en Valdivia (BA) el 04/01/10 (J. L. Anguita). **10** en Casas de Hitos (BA-CC) el 28/01/10 (M. Kelsey). 2 en Zurbarán (BA) el 18/01/12 (L. Lozano). En Santa Amalia (BA) 4 el 19/02/12 (L. Lozano y L. Alcántara) y uno el 26/02/12 (F. Montaña). Uno en Hernán Cortés (BA) el 20/02/12 (J. P. Prieto). En Palazuelo (BA), 3 el 14/01/13 (J. P. Prieto y M. Cardalliaguet), uno el 22/01/13 (M. Kelsey) y 2 el 06/12/13 (J. P. Prieto y R. Serra). **6** en Puebla de Alcollarín (BA) el 01/01/14 (A. Calvo). **5** en Rena (BA) el 21/01/14 (L. Lozano). 2 en El Torviscal (BA) el 23/01/14 (J. P. Prieto). Uno en Santa Amalia (BA) el 06/12/14 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). Vegas Bajas: primer caso, uno en Gaudiana del Caudillo (BA) el 06/12/13 (P. Herrador).
- Cifras destacadas. En Galisteo (CC) 10 el 26/08/11 (S. Mayordomo), 14 el 16/08/13 (J. Prieta) y 15 el 22/08/13 (S. Mayordomo). En Campo Lugar-Palazuelo (CC-BA) 15 el 31/10/11, 12 el 10/10/14 y el 24/10/14 y 10 el 28/10/14 (M. Kelsey). 12 en Casas de Hitos (BA-CC), el 05/04/14 (M. Kelsey). En Moheda Alta (BA) 10 el 31/08/13 (C. Clemente y S. Mayordomo), **32** el 07/09/13 (M. Gálvez, J. Guerra), 18 el 30/08/14 y 16 el 02/09/14 (M. Kelsey). 19 en Torviscal el 20/10/11 (J. P. Prieto). En Santa Amalia (BA) 24 el 04/09/11 (F. Yuste) y 15 el 16/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez).
- Paso prenupcial. 3 en de Miajadas (CC) el 17/03/09 (S. Fletcher). 3 en Vegas Altas (BA) el 18/03/09 (C. Proper). 3 en Palazuelo el 08/05/09 (M. Kelsey). 6 en Casas de Hitos (BA-CC) el 13/03/10 (M. Kelsey). En Galisteo (CC) 3 el 16/04/10, uno el 05/04/11 (S. Mayordomo) y 2 el 12/04/11 (J. Prieta). En El Paredón, Campanario (BA), uno los días 09/03/12 (S. Mayordomo y J. P. Prieto), 14/03/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano) y 29/03/12 (J. P. Prieto). En Murtales, La Nava de Santiago (BA), 2 el 01/05/12 (P. Herrador) y uno el 06/05/12 (P. Herrador y J. L. Bautista). Uno en Palazuelo (BA) el 28/03/13 (M. Kelsey). En Guareña (BA), 4 el 02/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en El Batán

(CC) el 10/03/14 (S. Mayordomo y J. Prieta). En Galisteo (CC), uno en Valdefuentes el 19/03/14 y 3 en la laguna el 22/03/14 (S. Mayordomo). 5 en Casas de Hitos (BA-CC) el 03/05/14 (J. Muddeman) y uno el 11/05/14 (M. Kelsey).

- Paso postnupcial. 4 en Casas de Hitos (BA-CC) el 13/07/09 (M. Kelsey). 2 en Portaje (CC) el 07/08/09 (S. Mayordomo). Uno en Galisteo (CC) el 08/07/10 (J. Prieta y S. Mayordomo) y el 16/07/10 (S. Mayordomo). 10 en Casas de Hitos (BA-CC) el 20/07/10 (M. Kelsey). Uno en Galisteo (CC) el 17/09/10 (J. Prieta, R. Montero y S. Mayordomo). Uno en el embalse del Sotillo, Monroy (CC), el 17/07/11 (S. Mayordomo). Uno en Puebla de Alcollarín (BA) el 05/11/11 (J. P. Prieto). Uno en El Torviscal (BA) el 09/11/11 (J. P. Prieto y S. Mayordomo). Uno en Galisteo (CC) el 08/07/12 (S. Mayordomo). El 28/07/12, 9 en Moheda Alta (BA) y 4 en el embalse del Cubilar (BA) (S. Mayordomo). 2 en Esparragalejo (BA) el 31/07/12 (F. Montaña). Uno en Galisteo (CC) el 16/10/12 y el 23/10/12 (S. Mayordomo). 2 en Valdecañas (CC) el 30/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo). 2 en Palazuelo (BA) el 06/07/13 (M. Kelsey). En La Albuera (BA), uno entre el 11/07/13 y el 14/07/13 (A. Núñez, C. Clemente, E. Palacios y otros) y 2 el 18/07/13 (J. C. Paniagua); uno el 23/10/13 (A. Vega, F. Montaña y J. Guerra) y 15 en Palazuelo (BA) (M. Kelsey). 2 en Palazuelo (BA) el 26/06/14 (M. Kelsey). Uno en Galisteo (CC) el 13/07/14 (S. Mayordomo). Uno en Palazuelo (BA) el 01/11/14 (C. Clemente, S. Mayordomo y E. Palacios) y el 06/11/14 (J. P. Prieto), y 14 el 11/11/14 (M. Gálvez). Uno en Santa Amalia (BA) el 29/11/14 (V. de Alba y A. Núñez).

Archibebe común (*Tringa totanus*)

Estatus regional. Reproducción excepcional. Migrante común. Invernante muy escaso (25-200 ejemplares), con tendencia creciente con fluctuaciones. Subespecie *T.t.totanus*.

Criterio. Invernada, fenología, agrupaciones (>25).

- Censos de enero 2009-2014. Los resultados de la Junta de Extremadura (2009-2010) y SEO/BirdLife (2012-2014) arrojan valores de 15 individuos en 2009, 8 en 2010, cero en 2011, 137 en 2012, 97 en 2013 y 7 en 2014 (media 80 aves en 2012-2014). Casi toda la población se concentra en arrozales de Vegas Altas, con máximo de 133 en enero de 2012. En parte por el mayor esfuerzo las cifras de 2012-2014 son las mayores registradas, dentro de su modestia, con una aparente tendencia positiva (media 21 aves en 2005-2008 y de 80 en 2012-2014).

- Tendencia. En Europa, origen de las aves migradoras e invernantes, la tendencia es “declive moderado”, disminuyendo el 44% en el periodo 1980-2008 (PECBMS, 2010).
- Últimos en paso prenupcial. 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 05/06/09 (M. Kelsey y J. Hawkins). Uno en el embalse de Peña del Águila (BA) el 25/06/09 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Galisteo (CC) el 15/05/10 y otro en Portaje (CC) el 16/05/10 (S. Mayordomo). 5 en Valdehornillos (BA) el 05/06/11 (M. Rodríguez). Presente en Valdecañas (CC) el 17/06/11 (J. Briz y V. Risco) y 3 el 20/06/11 (ECV11). 2 en el embalse de Llerena (BA) el 05/06/12 (F. Montaña y J. Vázquez). Uno en el río Tajo en Monfragüe (CC) el 21/06/12 (J. Prieta). 2 en Riobobos (CC) el 29/05/13 y 3 en Valdecañas (CC) el 31/05/13 (S. Mayordomo).
- Primeros en paso postnupcial. 45 en La Anguila, Serrejón (CC), el 24/07/09 (S. Mayordomo). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 20/07/10 (M. Kelsey). El 23/07/11, 2 en el embalse del Salor (CC) (S. Mayordomo) y uno en Galisteo (CC) (C. Clemente y J. Mahillo). 10 en la charca de Esparragalejo (BA) el 06/07/12 (A. Cangas y E. del Viejo). 3 en Los Canchales (BA) el 15/07/12 (F. Lopo). Uno en el embalse de Alange (BA) el 12/07/13 (F. Bernáldez y F. Macías). Uno en Galisteo (CC) el 19/07/13 (S. Mayordomo).

Vuelvepiedras común (*Arenaria interpres*)

Estatus regional. Migrante regular muy escaso; en abril-junio y julio-octubre. Invernada excepcional (un registro en febrero y 2 en diciembre). Total de 41 registros y 85 individuos (mayor grupo de cinco). Subespecie *A.i.interpres*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2009. Uno en las lagunas de Azuaga (BA) el 06/05/09 (X. Piñeiro).
- Año 2010. Uno en Esparragalejo (BA) el 03/10/10 (Á. Sánchez).
- Año 2011. Un joven en el embalse del Salor (CC) el 09/09/11 (C. Fernández). Uno en Los Canchales (BA) el 24/09/11 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo).
- Año 2012. 6 registros, 12 aves. Registro invernal: Uno en Santa Amalia (BA) los días 11/02/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente), 13/02/12 (E. del Viejo) y 14/02/12 (F. Montaña). 2 en Portaje (CC) el 01/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). En Los Canchales (BA), 6 los días 01/05/12 (F. Lopo, F. Castro e I. Sánchez) y 06/05/12 (F. Lopo, E. del Viejo y A. Cangas) y uno los días 01/09/12 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez) y 05/09/12 (P. Herrador y J. L. Bautista). Uno en la charca de

Esparragalejo (BA) el 12/08/12 (V. de Alba, S. Mayordomo, F. Montaña, E. Palacios, C. Clemente y A. Núñez). Uno en Palazuelo (BA) el 27/10/12 (J. P. Prieto y A. Mendoza).

- Año 2013. 5 registros, 5 aves. Uno en Guareña (BA) el 27/04/13 (E. Charles, E. Palacios, F. Montaña, I. Flecha, J. Gómez Aparicio, J. Guerra, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Mayordomo y V. Resa). El 20/05/13, uno en el embalse de Alange (BA) (M. Gálvez) y otro en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela (BA) (J. Muddeman). Uno en el embalse de Villalba de los Barros (BA) el 03/08/13 (L. Alcántara). Registro invernal: Uno en el embalse de Arroyoconejos-Llerena (BA), el 02/12/13 (F. Montaña y J. Vázquez).
- Año 2014. 5 registros, 5 aves. Uno en Palazuelo (BA) el 24/04/14 (M. Kelsey y E. Owen) y el 26/04/14 (C. Clemente). Uno en el embalse de Los Canchales (BA) el 02/08/14 (J. G. Aparicio) y otro el 13/09/14 (V. de Alba, J. L. Bautista y A. Núñez), el 15/09/14 (F. Bernáldez, J. Guerra, F. Montaña y J. Vázquez), el 17/09/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y 2 el 21/09/14 (F. Bernáldez, A. Cangas, E. del Viejo, J. Mazón, J. Tarrío y otros). Uno en la charca de Esparragalejo (BA) el 19/09/14 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). Registro invernal: Uno en Palazuelo (BA) el 04/12/14 (N. Renwick).

Falaropo picofino (*Phalaropus lobatus*)

Estatus regional. Accidental. 7 registros; en 1977, 1996, 2004, 2006 y 2010 (2); en mayo (1) y en septiembre-octubre (6); en Santa Amalia, Los Canchales, La Serena, Llanos de Cáceres, Cornalvo y Esparragalejo..

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registros previos. Uno en Santa Amalia en mayo de 1977 (A. Aguilar). Uno el 08/09/96 en Los Canchales (J. P. Prieto, E. Costillo y F. J. Medina). Uno en el Paredón, Campanario, el 8/10/04 (V. M. Quintana). Un juvenil en Ayuela del 17 al 21/09/2008 (C. Fernández, F. Carrero, J. M. Brías, S. Molano y J. M. Benítez). Uno en Las Muelas, Cornalvo, el 19/09/06 (S. Mayordomo).
- Nuevos registros. Uno en Los Canchales (CC) el 08/09/10 (F. Yuste). Un juvenil en Esparragalejo el 14/09/10 (J. M. Benítez).

Falaropo picogruoso (*Phalaropus fulicarius*)

Estatus regional. Accidental. 6 registros; en 1989, 1994, 2000, 2008, 2009 y 2010; en septiembre (1), octubre (3), noviembre (1) y diciembre (1); en Cedillo, Los Canchales, Llerena, Talaván, Cáceres y Cañamero. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Un juvenil en el embalse de Cedillo en octubre de 1989 (V. M. Pizarro). Un ave el 20/09/94 en el embalse de Los Canchales (J. A. García Jiménez). Un ave el 19/11/00 en una charca junto al embalse de Llerena (J. Vázquez y F. Montaña). Uno invernante en Juana Morena, Talaván, el 3/10/08 (S. Mayordomo).
- Nuevos registros. Uno en la charca de El Trasquilón, Cáceres, el 06/12/09 (J. Jaén). Un ave en el embalse de Cancho del Fresno, Cañamero (CC), el 02/10/10 (S. Mayordomo y otros).

Págalo parásito (*Stercorarius parasiticus*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en septiembre de 1978. Monotípica

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Embalse de García Sola-Puerto Peña (BA), septiembre de 1978: un ejemplar capturado (F. Blanco, J. J. Ferrero y J. L. Pérez-Chiscano) y un juvenil observado (L. Galán, J. Gómez, F. Carbajo y F. de Lope).

Págalo grande (*Stercorarius skua*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en abril de 1980 en Retamal de Llerena y en noviembre de 2007 en el embalse de Gabriel y Galán. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Uno accidentado en Retamal de Llerena en abril de 1980 (F. Blanco, J. J. Ferrero y J. L. Pérez-Chiscano) Tres en el embalse de Gabriel y Galán el 10/11/07 (Ch. Casado y M. Arcas).

Gaviota de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*)

Estatus regional. *Especie pendiente de confirmar*

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- *Pendiente de homologación por el Comité de Rarezas. Un joven en el embalse de Alcollarín (CC) el 18/11/14 (M. Gálvez y J. Guerra).*

Gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*)

Estatus regional. Reproducción muy escasa e irregular (0-50 parejas). Invernante común (25.000 ejemplares en 2009, el 7'5% de España) con tendencia decreciente. Monotípica.

Criterio. Época de cría, nidos, censos en dormideros y cifras de interés (>1.000).

- Población reproductora. Revisión. Reproductor muy escaso, irregular y localizado (ninguna a pocas parejas). Primer intento de cría en 1979. Entre 1998 y 2010 no se dispone de registros de reproducción, que no se descarta. A partir de 2011 se cita la nidificación en los embalses de Valdecañas (5-20 nidos en 2011-2015), Sierra Brava (10 nidos), Alange (20 parejas) y Villalba de los Barros (2-10 parejas en 2013-2015) (Cardalliaguet *et al.* 2014). En 2015 cría en el nuevo embalse de Alcollarín (al menos 4 nidos) y en el embalse de Alange (al menos 1 nido) (GOCE).
- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta especie, no obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se anotaron 2.694 ejemplares en 2009, 8.711 en 2010, 2.267 en 2011, 12.386 en 2012, 11.006 en 2013 y 30.071 en 2014. Las mayores cifras se obtienen en arrozales de Vegas Altas con un máximo de 16.750 ejemplares el 20/01/14.
- Registros estivales (1 mayo-15 junio). 20 parejas con comportamiento reproductor en el embalse de Alange (BA) durante mayo de 2011 (Á. Sánchez). 81 en Madrigalejo (CC) el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo). 40 en Yelbes (BA) el 07/05/11 (J. Solana). 5 adultos nupciales en Portaje (CC) el 21/05/11 y 8 adultos nupciales en arrozales de Galisteo (CC) el 22/05/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). 22 en el embalse de Alange (BA) el 11/06/11 (D. Jorge, E. Mateos y J. Solana). En Valdecañas (CC) se observan 31 y 3 nidos el 20/06/11 (S. Mayordomo, J. Prieta). En el embalse de Villalba de los Barros (BA) un nido con 2 huevos el 14/07/13 (A. Núñez, C. Clemente, E. Palacios, F. Montaña, S. Mayordomo y V. de Alba) y 2 parejas con nido el 17/04/14 (J. M. Álvarez y F. Montaña).
- Cifras destacadas. 615 en el embalse de Alange (BA) el 06/09/11 y 800 en el vertedero de Mérida (BA) el 17/09/11 (Á. Sánchez). 2.000 en el embalse de Alange (BA) el 15/01/12 (L. Alcántara y J. Solana). 13.000 forman dormidero en el embalse de Alange (BA) el 06/12/12 (J. Solana).

Gaviota picofina (*Chroicocephalus genei*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Alange en mayo de 2008.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro previo. Tres adultos, uno anillado, el 06/05/08 en el embalse de Alange (J. G. Navedo y J. S. Gutiérrez).

Gaviota guanaguanare (*Larus atricilla*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Valdecañas en junio de 2011.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Primer registro en Extremadura. Un adulto en Valdecañas (CC) el 14/06/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado y M. Flores) y el 20/06/11 (C. Gutiérrez, E. Rodríguez, F. Hurtado y M. Flores).

Gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus regional. Migrante e invernante muy escasa con posible tendencia al aumento. 34 registros, sólo 7 registros antes de 2009 y 26 en 2010-2014; entre noviembre y julio. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. En el vertedero de Villanueva de la Serena: un 2º invierno el 28/01/96 y un adulto el 13/02/97 (J. M. Traverso). Un 1º invierno el 28/03/02 en el embalse de La Serena (D. Rees y D. Pullan). Un adulto el 10/05/03 en Navalvillar de Pela (B. Miller y A. Miller). Un juvenil el 25/07/05 en Los Canchales (J. A. García Jiménez). Una en Casas de Hitos el 27/04/08 (B. Bradnum y D. Bradnum). Una en la charca de Brozas el 28/12/08 (C. Fernández).
- Año 2009. Sin observaciones conocidas.
- Año 2010. 2 registros, 3 aves. En el vertedero de Mérida (BA) una el 4/11/10 y 2 el 7/11/10 y en el río Gadiana 2 el 25/12/10 (Á. Sánchez).
- Año 2011. 3 registros, 17 aves. En Valdecañas (CC) un 1º verano el 20/06/11 (Á. Sánchez, S. Mayordomo y J. Prieta), 15 adultos el 12/07/11 (Á. Sánchez, J. A. Guerrero y M. Flores) y 2 el 28/07/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). Un 1º invierno en el vertedero de Mérida (BA) el 06/11/11 (Á. Sánchez).
- Año 2012. 3 registros, 5 aves. En Los Canchales (BA) 3 el 21/01/12 (J. Fernández y Á. Sánchez). Un adulto en Charco Salado (CC) el 10/03/12 (P. de la Nava y J. C. López). Un 2º año en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) los días 01/05/12, 04/05/12 y 21/05/12 (M. Kelsey).
- Año 2013. 4 registros, 7 aves. Una en el embalse de Alange (BA) el 27/01/13 (J. Guerra y M. Gálvez). En Guareña (BA), 1-4 (1º invierno, dos 2º invierno y un adulto) entre el 10/04/13 y el 14/04/13 (A. Núñez, F. Castro, F. Lopo, J. Solana, J. Guerra, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Pérez, V. de Alba). Un 3º año en Arrocampo (CC) el 26/05/13 (D. Langlois, S. Langlois). Una en el embalse de Villalba de los Barros (BA) el 11/07/13 (J. M. Álvarez).

- Año 2014. 14 registros, al menos 20 aves. Una en Villanueva de la Serena (BA) el 21/01/14 (C. González). Una en el embalse de Alange (BA) el 05 y el 09/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra). En Santa Amalia (BA) una el 08/02/14 (J. Pérez, J. Portillo y A. Sanmartí) y el 07/03/14 (V. de Alba, A. Núñez y F. Yuste). Una en las Lagunas de Torremejía (BA) el 09/02/14 (J. Guerra, J. Pérez, J. Portillo y A. Sanmartí). Una en Navalvillar de Pela (BA) el 09/02/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). En la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), una el 12 y 14/02/14, 2 el 03/03/14 y una el 13/03/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Una en el embalse de Alcollarín (CC) el 18/04/14 (F. Yuste). En el embalse de Alange (BA): un adulto y un 1º invierno el 20/11/14; dos 1º invierno el 14/12/14; 2 el 16/12/14; un 1º invierno, un 2º invierno y un adulto el 17/12/14; y un 1º invierno y un 2º invierno el 31/12/14 (M. Gálvez y J. Guerra). 2 de 1º y 2º invierno en Torremejía (BA) el 23/11/14 (M. Gálvez). En Guareña (BA) un adulto el 20/12/14 (M. Gálvez, J. G. Aparicio y J. Guerra) y un 1º invierno el 31/12/14 (M. Gálvez).

Gaviota pipizcan (*Larus pipixcan*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en diciembre de 2003 en Los Barruecos.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Uno el 26/12/03 en Los Barruecos, Malpartida de Cáceres (G. Ceccolini y A. Cenerini).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus regional. Migrante esporádica. Influjos en julio-agosto de 2002, 2003 y 2004 (200 aves). Un registro en 2000 y 6 de 7 aves en 2005-2014.

Criterio. Todas las observaciones.

- Revisión. Primera cita el año 2000 en el río Guadiana, Badajoz. Durante el paso postnupcial de julio-agosto de los años 2002, 2003 y 2004 se ven decenas en los embalses de Montijo y Los Canchales (BA), sobre todo juveniles, algunos anillados en el Delta del Ebro (Tarragona). En 2002 tres citas de 19 aves, 15 citas de 57 aves en 2003 y en 2004 se estiman más de 200 aves, incluyendo un grupo de 66 aves, 65 de ellas juveniles. En agosto de 2004 se vio por vez primera en Cáceres (embalse de Plasencia). Sin registros entre 2005 y 2009. Seis registros de siete aves en 2010-2014. Por meses, en abril, mayo y junio hay citas esporádicas de adultos; en julio y agosto se ven sobre todo juveniles; y en octubre dos observaciones de juveniles. Sin registros en septiembre y noviembre-

marzo. Por provincias, cuatro ejemplares aislados en Cáceres, correspondiendo la enorme mayoría a la provincia de Badajoz.

- Registros 2010-2014. Un joven en el vertedero de Mérida (BA) el 05/10/10 (Á. Sánchez). Un 3º verano en La Pulgosa, Cáceres, el 12/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). En el embalse de Villalba de los Barros (BA), un adulto y un 2º año el 01/06/13 (A. Núñez, F. Montaña, J. M. Álvarez y J. A. Román) y sólo un adulto el 02/06/13 (Á. Sánchez y L. Alcántara). Un joven en el embalse de Ahigal (CC) los días 22/07/13 (J. C. Paniagua), 23/07/13 (J. C. Paniagua y S. Mayordomo) y 24/07/13 (R. Montero). Un joven en el vertedero de Mérida (BA) el 14/10/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y el 17/10/13 (M. Gálvez). Un joven en Charco Salado, Casatejada (CC), el 28/07/14 (S. Mayordomo).

Gaviota de Delaware (*Larus delawarensis*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros de aves de 1º invierno: uno en Badajoz en enero de 2009 y otro en Santa Amalia en marzo de 2013 .

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro previo. Un 1º invierno en el Puente Viejo, Badajoz, de finales de 2008 hasta el 31/01/09 (J. Mazón, J. M. Caballero, S. Solís y J. C. Paniagua).
- Segundo registro en Extremadura. Una de 2º invierno en arrozales de Santa Amalia (BA) el 18/03/13 (F. Yuste, J. Guerra y M. Gálvez).

Gaviota cana (*Larus canus*)

Estatus regional. Invernante y migrante muy escasa. Registros de noviembre a abril; años 1989, 1994-1997, 2002, 2008, 2010, 2011, 2013 y 2014. Subespecie *L.c.canus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- 2010. Un 1º invierno en Valdeñigos (CC) el 26/01/10 (J. Prieta). Un 1º invierno en Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), el 05/03/10 (S. Mayordomo). En el vertedero de Mérida (BA), un 1º invierno el 04/11/10, 2 el 07/11/10 y el 28/11/10 y una el 25/12/10 (Á. Sánchez).
- 2011. Un 1º invierno en Sierra Brava (CC) el 13/01/11 (N. P. Roberts).
- 2013. En el río Guadiana en Badajoz, un 1º invierno los días 04/01/13, 06/01/13 y 27/01/13 (J. C. Paniagua) y una el 11/03/13 (J. C. Paniagua). Un 1º invierno en el embalse de Alange (BA) el 01/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez). En Guareña (BA), tres 1º invierno los días 11/04/13 y 12/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Dos 2º año en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 02/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez).

- 2014. En el embalse de Alange (BA) una el 09/02/14 (M. Gálvez), una el 20/11/14 y una el 16/12/14 (J. Guerra). Una en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 13/03/14 (M. Gálvez y J. Guerra). 20 en Palazuelo (BA) el 26/11/14 (H. Zweers). Un 2º invierno en el azud de Badajoz el 04/12/14 (M. Kelsey).

Gaviota sombría (*Larus fuscus*)

Estatus regional. Invernante común (46.500 ejemplares en 2009, el 15% de España) con tendencia al aumento. Presencia estival. La subespecie *L.f.graellsii* es la más numerosa siendo común *L.f.intermedia*, sobre todo en paso. Un registro de *L.f.fuscus*.

Criterio. Citas estivales, censos en dormideros y cifras de interés (>1.000).

- Censos de enero 2009-2014. Los censos diurnos no son representativos para esta especie, no obstante, en los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se anotaron 3.516 ejemplares en 2009, 7.199 en 2010, 1.744 en 2011, 11.467 en 2012, 8.112 en 2013 y 5.463 en 2014.
- Cifras de interés. En el embalse de Alange (BA) 3.850 el 06/09/11 (Á. Sánchez); 6.500 el 06/12/11 (A. Núñez, J. Solana y V. de Alba) y 4.500 el 15/01/12 (L. Alcántara y J. Solana). En el Vertedero de Mérida (BA) 2.000 el 17/09/11 y el 26/02/12 (Á. Sánchez). 453 en Valdecañas (CC) el 13/01/12 (J. Prieta), 915 en La Albuera (BA) el 21/01/12 (S. Mayordomo).
- Últimos registros. 2 en Torremejía (BA) el 02/05/11 (A. Núñez). Una en Yelbes (BA) el 07/05/11 (J. Solana). Varias en Alange (BA) el 17/05/11 (Á. Sánchez). Un inmaduro en Galisteo (CC) el 22/05/11 (E. Palacios y S. Mayordomo).
- Llegadas. En Badajoz (BA), 54 el 24/07/10 (J. C. Paniagua). 2 inmaduros en el embalse de Alange (BA) el 11/06/11 (D. Jorge, E. Mateos y J. Solana). En Valdecañas (CC) un adulto el 16/06/11 (S. Mayordomo) y 3 el 20/06/11 (EV2011). Adulto nupcial en el embalse del Salor (CC) el 23/07/11 (S. Mayordomo). Varias aves en Valdecañas (CC) el 28/07/11 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez).

Gaviota argétea europea (*Larus argentatus*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Guareña en abril de 2013.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro en Extremadura. Una de primer invierno en Guareña (BA) el 11/04/13 (M. Gálvez).

Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)

Estatus regional. Reproductora regular en Valdecañas (2-5 parejas; 2002-2015). Escasa en paso e invernada (¿10-50? de individuos) con tendencia incierta. Subespecie *L.m.michahellis*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Población reproductora. Revisión.** Reproductor muy escaso y localizado en el embalse de Valdecañas. Primeros casos en 2002 y 2003 (2 nidos). En 2005, 2007 y 2008 se cita en primavera, pero no se describe nidificación. En 2011 se localizan 4 parejas nidificantes el 05/05/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Guerrero y M. Flores). Entre 2012 y 2015 se estiman 2-5 parejas reproductoras. La especie es residente con fluctuaciones, con presencia todo el año.
- **Censos de enero 2009-2014.** Los censos de humedales no son representativos para esta especie por no cubrir los basureros. En los censos de la Junta de Extremadura (2009-2011) y en los de SEO/BirdLife (2012-2014) se anotaron 4 ejemplares en 2009, cero en 2010 y 2011, 3 en 2012, 3 en 2013 y 7 en 2014. La localidad más regular es el embalse de Valdecañas, donde es residente. Dado su bajísimo número, la tendencia es incierta (2 aves de media en 2005-2008 y 4'5 en 2012-2014).
- **Año 2009.** 2 en Lancho, Arroyo de la Luz (CC), el 11/11/09 (F. Carrero, R. Parra y S. Mayordomo).
- **Año 2010:** Una en Valdecañas (CC) el 17/10/10 (J. Briz y V. Risco). Un 3º invierno en el vertedero de Mérida (BA) el 21/10/10, varias el 07/11/10, 2 el 28/11/10 y una el 25/12/10 (Á. Sánchez). En Lancho (CC) un adulto los días 10/12/10 y 29/12/10 (S. Mayordomo). Una en el embalse del Salor (CC) el 27/12/10 (S. Mayordomo).
- **Año 2011:** Una en el embalse de Ahigal (CC) el 12/01/11 (A. Pacheco). Una en el vertedero de Mirabel el 02/02/11 (S. Mayordomo). En Valdecañas (CC), **58** ejemplares el 20/06/11 (J. Prieta y S. Mayordomo), **42** el 23/08/11 (J. Prieta), 6 el 08/09/11 y un adulto el 30/10/11 (S. Mayordomo). Un adulto en el embalse de Talaván (CC) el 14/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). En Lancho, Arroyo de la Luz (CC), una el 21/01/11 (S. Mayordomo) y una el 21/12/11 (J. Guerra y S. Mayordomo). Un 2º año en Los Canchales (BA) el 24/09/11 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo). **16** en el vertedero de Mérida el 5/02/11 (Á. Sánchez). En el embalse de Alange (BA) una el 05/03/11 (J. Solana), varios inmaduros el 17/05/11 y 2 el 06/09/11 (Á. Sánchez).
- **Año 2012:** Un adulto en Gabriel y Galán (CC) el 23/05/12 (J. Prieta). Una en Arrocampo (CC) el 11/10/12 (R. Vicente). En Valdecañas (CC): un adulto el 03/01/12, 2 el 13/01/12, un adulto el 08/04/12, **36** el 20/05/12,

22 el 17/06/12 -incluye un adulto territorial en la colonia de pagazas, 16, entre ellos 2 jóvenes, el 07/07/12, 8 el 21/07/12, 3 el 01/09/12, 13 el 22/09/12, 2 el 21/10/12, un adulto el 23/11/12, 3 el 02/12/12 y 4 el 23/12/12 (S. Mayordomo, J. Prieta, E. Palacios, C. Clemente, M. García del Rey). Una en las charcas de Manzanares, Campo Lugar (CC), el 22/09/12 (A. Calvo). Una en el río Gadiana en Badajoz los días 16/09/12, 18/09/12 y 20/09/12 (J. C. Paniagua). En el embalse de Montijo (BA) 8 el 17/03/12 y 3 el 25/11/12 (Á. Sánchez). Un 3º invierno en el embalse de Alqueva (BA) el 20/01/12 (S. Mayordomo). Varias, incluidos jóvenes, en el embalse de Alange (BA), el 12/07/12 (J. M. Castaño, J. M. Rama y Á. Sánchez). Una en el vertedero de Mérida (BA) el 18/10/12 (M. Gálvez y J. Guerra). Un 3º invierno en el vertedero de Badajoz el 10/11/12 (J. C. Paniagua).

- Año 2013. En Valdecañas (CC): 2 el 15/01/13, una el 26/01/13, una el 06 y 07/04/13, 2 adultos el 31/05/13, 4 adultos y un inmaduro el 15/06/13, **20**, mayoría inmaduros, los días 23/06/13 y 30/06/13, **22** el 26/07/13, 10 el 01/08/13, **27**, mayoría adultos, el 11 y 12/09/13, 6 el 10/10/13, una el 08/11/13 (S. Mayordomo, C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey, J. Prieta, J. Guerrero, M. Flores, J. L. Guisado, J. Guerra, M. Gálvez). En el río Gadiana, Badajoz (BA), una el 20 y 24/02/13, 2 el 06/06/13 y un adulto el 31/07/13 (J. C. Paniagua). En Guareña (BA), 2 el 11/04/13 y una del 12 al 15/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una de 2º año en la garvera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 02/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez). En Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC), una el 15/05/13, 2 el 17/05/13 y una el 23/10/13 (M. Kelsey). En el embalse de Alange (BA): un 2º año el 16/05/13, 5 el 13/06/13, un adulto el 05/09/13, un inmaduro el 28/09/13, una el 07/10/13 y una el 10/11/13 (J. Guerra y M. Gálvez). En el embalse de Villalba de los Barros (BA) un adulto el 01/06/13 y dos el 14/07/13 (A. Núñez, F. Montaña, J. M. Álvarez, J. A. Román y otros). En el vertedero de Mérida (BA), una el 07/10/13, 2 el 14/10/13, una el 16/10/13, 2 el 21/10/13, 6 el 24/10/13, 4 el 07/11/13 y 3 el 01/12/13 (J. Guerra y M. Gálvez). En el vertedero de Badajoz, 4 el 19/10/13 y 2 el 16/11/13 (J. C. Paniagua). En el vertedero de Villanueva de la Serena (BA) una el 24/02/13 (M. Gálvez).
- Año 2014. 2 en Gabriel y Galán (CC) el 13/04/14 (C. Mills y R. Montero). Una en Charco Salado (CC) el 02/02/14 (M. Kelsey). En Valdecañas (CC) 2 el 10/01/14, 2 el 15/03/14, 5 el 18/04/14, 2 el 04/05/14, 3 el 15/05/14, una el 22/05/14, 2 el 23/05/14, una el 25/05/14, 3 inmaduros el 05 y 12/06/14, 5 el 02/08/14, 10 el 08/08/14, 4 adultas el 24/11/14 y 6 el 15/12/14 (S. Mayordomo, C. Clemente, J. Prieta, E. Palacios, J. Muddeman, J. M. Abad, M. Flores, Á. Sánchez, D. Langlois, S. Langlois). Una en Guadiloba (CC) el 16/09/14 (J. M. Jiménez). Una en

La Atalaya, Aldea del Cano (CC), el 13/10/14 (C. González). En el embalse de Alcollarín (CC) 2 el 12/05/14 y una el 31/08/14 (M. Kelsey). Una en el río Guadiana en Badajoz (BA) el 29/03/14 (J. C. Paniagua). Una adulta en Guadiana del Caudillo (BA) el 14/12/14 (J. L. Bautista). En Los Canchales (BA) una el 07/08/14 (C-J. Palacios y J. A. Román) y una el 22/12/14 (J. L. Bautista). En la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), una el 12/02/14, 2 el 14/02/14 y una el 03/03/14 (M. Gálvez y J. Guerra). 2 adultas en el vertedero de Mérida (BA) el 30/11/14 (L. Alcántara). En Palazuelo (BA) una el 10/10/14 y una el 01/11/14 (M. Kelsey). 3 en Villar de Rena (BA) el 21/01/14 (Á. Sánchez). En Moheda Alta (BA) una el 01/11/14 y el 21/11/14 (M. Gálvez). En el embalse de Alange (BA) una el 05/02/14, una el 12/03/14, 2 jóvenes el 03/11/14 y una adulta el 17/12/14 (M. Gálvez, J. Guerra, F. Montaña, J. A. Román). En el embalse de Villalba de los Barros (BA) una el 01/08/14 y una el 18/09/14 (J. M. Álvarez y F. Montaña). En las Lagunas de Torremejía (BA) 4 el 22/11/14 (M. Gálvez) y una el 29/11/14 (V. de Alba y A. Núñez).

Gavión atlántico (*Larus marinus*)

Estatus regional. Accidental. **Dos registros** invernales. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro previo. Un 1º invierno en el basurero de Badajoz el 03/12/00 (I. Galván).
- Segundo registro para Extremadura. Uno en el embalse de Guadiloba, Cáceres, el 08/01/10 (A. Gil).

Gaviota tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus regional. Accidental. Presencia relacionada con temporales fuertes en el Atlántico. Cuatro registros en diciembre de 1997 (Portaje), mayo de 2009 (La Vera) y febrero de 2014 (Monfragüe y Valencia de Alcántara). Subespecie *R.t.tridactyla*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro previo. Uno en el embalse de Portaje el 23/12/97 (F. J. Caballero).
- Nuevos registros. Se recoge una muerta en La Vera (CC) el 05/05/09 (F. Martín). Una en La Higuera, Monfragüe (CC), el 10/02/09 (C. Jewitt). Ingresó una en el CRF Los Hornos recogida en Valencia de Alcántara (CC) el 10/02/14 que muere al día siguiente (J. Caldera).

Gaviota enana (*Hydrocoloeus minutus*)

Estatus regional. Invernante esporádica. 12 registros; con predominio de inmaduros; en 2000-2002, 2005-2006 y 2012-2014; entre diciembre y marzo; en Borbollón, Portaje (2), Valdecañas, Malpartida de Cáceres, Los Canchales, Orellana (3), La Albuera (2) y Navalvillar de Pela. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Una en invierno (sin año) en Los Canchales (G. Schreur). Tres el 29/12/00 en el embalse de Portaje (J. Caballero). Un juvenil en Valdecañas el 24/11/01 (J. Briz). 5 en el embalse de Portaje el 11/01/02 (J. Caballero). Uno en Orellana el 30/03/05 (J. J. Saiz). Un 1º invierno en Malpartida de Cáceres del 25/12/05 al 22/01/06 (J. A. García Jiménez).
- Nuevos registros. En el embalse de El Borbollón (CC), un 1º invierno los días 10/12/12 (G. Naharro, F. Salas y A. Torrijo) y 11/12/12 (S. Mayordomo, R. Montero y C. Clemente) y dos de 1º invierno el 13/12/12 (M. Á. Muñoz, J. Mahillo, H. Sánchez, E. Palacios y C. Clemente) y el 15/12/12 (J. Prieta, J. Mahillo, G. Naharro y C. Clemente). Un 1º invierno en La Albuera (BA) el 21/01/13 (J. Vázquez). En el Ancón de Casas de Don Pedro, embalse de Orellana (BA), un adulto y un 1º invierno los días 07/02/13 (J. Muddeman) y 17/02/13; y además un 2º invierno en la cola del embalse el 17/02/13 (C. Clemente, E. Palacios, L. Alcántara, M. García del Rey y S. Mayordomo). En el embalse de Orellana (BA), un 1º invierno el 28/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y el 30/01/14 (C. Cook, J. Muddeman, A. Plumb y T. Plumb). Un primer invierno en el embalse de Orellana (BA) el 09/02/14 (S. Mayordomo y E. Palacios), el 16/02/14 (M. Kelsey y P. Kelsey) y el 22/02/14 (V. de Alba y A. Núñez); y un adulto el 09/02/14 (M. Kelsey). Una adulta en Navalvillar de Pela (BA) el 30/01/14 (C. Cook, J. Muddeman, A. Plumb y T. Plumb). Una en las lagunas de La Albuera (BA) el 16/02/14 (J. M. Álvarez).

Pagaza piconegra (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus regional. Reproductora estival común (1.100 parejas en 2014) con tendencia creciente a largo plazo (1980-2014) y estable a corto plazo (2007-2014). Subespecie *S.n.nilotica*.

Criterio. Época de cría, nidos y cifras de interés (>100).

- Población reproductora 2013-2014. En 2013-2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio en la Red Natura 2000 de Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014). Se confirmó la reproducción en 4 colonias en 2013 y 2014, con 975 parejas en 2013 y 1.100 en 2014 (similar a las 990 parejas del censo de 2007), lo que sugiere estabilidad poblacional. En años recientes las colonias más importantes se localizan en los embalses

de Alange (200-450 parejas), Valdecañas (200-300), Villalba de los Barros (2-350) y Sierra Brava (0-75). El 70-75% de la población conocida en 2013 y 2014 estaba dentro de la Red Natura 2000 (en 2007 era del 100%).

- Llegadas. En Arrocampo (CC) una el 08/04/09 (R. Montero) y una el 10/04/10 (M. Kelsey). 30 en Casas de Hitos (BA-CC) el 07/04/11 (M. Kelsey). 2 en Arrocampo (CC) el 06/04/12 (J. Briz). 9 en Valdecañas (CC) el 08/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). En embalse de Alange (BA) una el 14/04/12 (L. Alcántara) y una el 24/03/13 (A. Cangas) y el 02/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en el río Guadiana, Mérida (BA), el 03/04/13 (S. Pérez). Una en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 31/03/14 (M. Gálvez). 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 01/04/14 (M. Kelsey). Presente en el embalse de Villalba de los Barros (BA) el 05/04/14 (J. M. Álvarez).
- Últimos registros. 3 en Charco Salado (CC) el 21/07/09 (S. Mayordomo). Una en Los Arenales (CC) el 18/08/11 (C. Fernández). Una en el embalse del Salor (CC) el 19/08/11 (S. Mayordomo). Un adulto y un joven en Esparragalejo (BA) el 22/08/11 (Á. Sánchez). 3 en Los Canchales (BA) el 12/08/12 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente). Una en el embalse de Gabriel y Galán (CC) el 01/08/13 (J. Montero). 2 en Moheda Alta (BA) el 14/08/12 (M. Kelsey). Una en Arrocampo (CC) el 13/10/13 (C. Moreno, N. Franco, Ó. Llama, R. Vicente y Y. Annicharicco). 6 en el embalse de Llerena (BA) el 07/09/14 (M. Corvillo y F. Montaña).

Pagaza piquirroja (*Hydroprogne caspia*)

Estatus regional. Migrante e invernante esporádica. 15 registros; en 1967, 1985, 1999 (2), 2002, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 (3) y 2014 (4); en enero-febrero (2), marzo-junio (7), junio y agosto-octubre (6). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Embalse del Zújar: una en octubre 1967 y dos en septiembre 1985 (J. J. Ferrero). Los Canchales: uno el 11/04/99 (E. Costillo), un adulto el 24/08/99 (J. A. García Jiménez) y un adulto y un juvenil el 18/09/02 (F. Prieto y J. L. Valiña). Un adulto el 6/04/07 en Sierra Brava (J. Muddeman y M. Kelsey). Uno en Extremadura en mayo de 2008 (J. G. Navedo).
- Nuevos registros. Una en el embalse de Alqueva (BA) el 01/06/09 (E. Costillo). Una en Valdecañas (CC) el 01/09/12 (S. Mayordomo). En el río Guadiana, Badajoz (BA), una los días 06 y 07/03/13 (J. Mazón y J. C. Paniagua). En el embalse de Alange (BA) una los días 09/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez), 11/03/13 (M. Gálvez) y el 30/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en el embalse de Alqueva, Villarreal (BA), el 16/01/14 (J.

Mazón). Una en el embalse de Orellana (BA) el 23/02/14 (F. Montaña y G. Montaña). Una en el embalse de Montijo, Mérida (BA), el 23/04/14 (M. Gálvez). Una en la charca de Esparragalejo (BA) el 22/09/14 (J. Vázquez).

Charrán bengalí (Sterna bengalensis)

Estatus regional. Especie pendiente de confirmar.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- *Pendiente de homologación por el Comité de Rarezas. Dos ejemplares en el embalse de Arroyoconejos ó Llerena (BA) los días 07/08/12 y 08/08/12 (J. Vázquez, F. Montaña y B. Muñoz). Existen fotografías que corresponden a esta especie, pero es necesario esperar a su homologación para descartar por completo el Charrán real (Sterna maxima).*

Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en Brovales en mayo de 2001 y en Valdecañas en junio de 2012. Subespecie *S.s.sandvicensis*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro previo. Uno en el embalse de Brovales el 25/05/01 (F. Dixon).
- Nuevo registro. Uno en la colonia de pagazas piconegras del embalse de Valdecañas (CC) el 21/06/12 (M. Flores, J. A. Guerrero y Á. Sánchez).

Charrán común (Sterna hirundo)

Estatus regional. Reproductor muy escaso y muy localizado (1-2 parejas 2011-2014; embalse de Valdecañas). Muy escaso en paso. Subespecie *S.h.hirundo*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Revisión. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio en la Red Natura 2000 de Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014). Solamente se observó una pareja en el embalse de Valdecañas. En esta localidad se citó la crianza en la década de 1990. Tras un lapso sin información se comprueba que sigue presente entre 2011-2015, con 1-2 parejas reproductoras durante cinco años consecutivos. Fuera de esta localidad, sólo 5 registros en 1998-2010. En 2011 se observó en los embalses del Salor, Valdecañas y Sierra Brava; en 2012 en Portaje, Ahigal, Valdecañas, Arrocampo, Guadiloba, Alange y Llerena, en un influjo sin

precedentes durante la primavera; en 2013 en Valdecañas y Gabriel y Galán y Los Canchales y en 2014 en Valdecañas y Los Canchales.

- Nuevos registros.

2011. En Sierra Brava (CC) 4 el 08/04/11 (J. Muddeman). En el embalse de Valdecañas (CC), 6 incluyendo **una pareja incubando** el 16/06/11 (M. Flores); una pareja en la colonia el 20/06/11 (J. Prieta y S. Mayordomo) y 5 ejemplares el 12/07/11 (Á. Sánchez, J. A. Guerrero y M. Flores). Uno en el embalse del Salor (CC) el 19/06/11 (S. Mayordomo).

2012. En el embalse de Ahigal (CC), uno el 26/04/12 (S. Mayordomo y J. Prieta) y 7 el 27/04/12 (A. Pacheco). **11** en el embalse del Guadiloba, Cáceres, el 26/04/12 (S. McAvoy y G. Schreur). **12** en el embalse de Portaje (CC) el 27/04/12 (S. Mayordomo). En Arrocampo (CC), una pareja el 17/05/12 (J. Prieta) y un inmaduro el 20/05/12 (S. Langlois y D. Langlois). En Valdecañas (CC), 2 el 21/06/12 (M. Flores, J. A. Guerrero y Á. Sánchez) y un juvenil el 07/07/12 (S. Mayordomo). En el embalse de Alange (BA) 4 el 21/06/12 (M. Sánchez, J. Fernández, J. Prieto y Á. Sánchez) y uno el 12/07/12 (J. M. Castaño, J. M. Rama y Á. Sánchez).

2013. Uno en Valdecañas (CC) los días 15/06/13 (C. Clemente, J. Prieta y S. Mayordomo) y 21/06/13 (E. Palacios y M. Á. Muñoz). 3 en el embalse de Gabriel y Galán (CC) el 13/08/13 (J. Montero).

2014. Uno en Valdecañas (CC) el 12/06/14 (S. Mayordomo). Uno en Los Canchales (BA) el 15/09/14 (C. González).

Charrán ártico (*Sterna paradisaea*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Herrera de Alcántara en mayo de 2002. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registro previo. Ocho sobre el río Tajo en Herrera de Alcántara el 17/05/02 (L. Gordinho).

Charrancito común (*Sternula albifrons*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (mínimo 135-170 parejas en 2013-2014, el 2-5% de España) con tendencia estable, aunque fluctuante. Un registro invernal. Subespecie *S.a.albifrons*.

Criterio. Época de cría, nidos, invernada y cifras de interés (>20).

- Población reproductora 2013-2014. En 2013-2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio en la Red Natura 2000 de Extremadura

(Cardalliaguet *et al.* 2014). Se confirmó la reproducción en 7 colonias en 2013 y 2014, con un mínimo de 135 parejas en 2013 y 170 en 2014 (similar a las 125 parejas del censo de 2007), lo que sugiere estabilidad poblacional. En años recientes las colonias más importantes se localizan en los embalses de Alange (25-65 parejas), La Serena (30-125), Valdecañas (10-35), Orellana (10-100), Villalba de los Barros (6-20) y Sierra Brava (0-25). El 100% de la población conocida en 2013 y el 88% en 2014 estaba dentro de la Red Natura 2000 (en 2007 sólo el 57%).

- **Llegadas.** Uno en el Azud de Badajoz el 19/04/09 (J. C. Paniagua). Uno en Los Barruecos (CC) el 22/04/09 (S. Fletcher). 2 en el Azud de Badajoz el 23/04/11 (J. C. Paniagua). 2 en Casas de Hitos (BA-CC) el 24/04/11 (G. Schreur y M. Kelsey). Presente en Los Canchales (BA) el 22/04/12 (F. Lopo). 3 en el embalse del Guadiloba (CC) los días 26 y 27/04/12 (G. Schreur). Uno en el embalse de Ahigal (CC) el 27/04/12 (A. Pacheco). Uno en Monfragüe (CC) el 28/04/12 (Ó. Díaz). Presente en el río Gadiana, Mérida (BA), el 26/04/13 (F. Lopo). Uno en el río Matachel, Alange (BA), el 27/04/13 (L. Alcántara). Uno en el río Gadiana, Badajoz, el 28/04/13 (J. C. Paniagua). 12 en el río Gadiana en Mérida (BA) el 02/03/14 (Á. Sánchez). 2 en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 21/04/14 (J. Guerra).
- **Reproducción.** Colonia con unas 100 parejas en el embalse de La Serena (BA) el 12/06/12 (S. Pérez, M. Sánchez, F. Sierra, D. Rivera, D. Vázquez y Á. Sánchez). Colonia de más de 15 parejas en el embalse de Valdecañas (CC) el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y C. Clemente).
- **Últimos registros.** 6 en Lancho, Arroyo de la Luz (CC), el 04/08/09 (C. Fernández). 7 jóvenes y un adulto en Esparragalejo (BA) el 21/08/11 (Á. L. Sánchez). 2 jóvenes y un adulto en Talaván (CC) el 22/08/11 y 2 en el embalse del Salor (CC) el 25/08/11 (C. Fernández). En el embalse de Montijo, Mérida (BA), uno el 03/10/11 (J. Muddeman) y 8 el 15/08/12 (J. Solana). 6 en el embalse de Alange (BA) el 16/08/12 (L. Alcántara). Un joven en Los Canchales (BA) el 15/09/14 (F. Bernáldez, J. Guerra, F. Montaña y J. Vázquez) y el 17/09/14 (M. Gálvez y J. Guerra).
- **Citas invernales.** En el embalse de Montijo, Mérida (BA), uno los días 14/11/11 y 29/11/11 (Á. Sánchez).

Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybrida*)

Estatus regional. Reproductor estival muy escaso y muy irregular (0-80 parejas). Paso moderado, más intenso el prenupcial. Invernada ocasional. Subespecie *C.h.hybrida*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Población reproductora. En el periodo 2009-2014 sólo se conoce la reproducción en las lagunas de La Albuera en muy bajo número (2-3 parejas en 2013). Cría citada en 2000 (10 parejas, una localidad) y 2001 (80 parejas en 3 sitios) en 8 humedales: El Millar, Cáceres (60 parejas), Laguna de Torremejía (40 parejas en 2000), Charca del Lugar, Malpartida de Cáceres (27 parejas en 2000), La Albuera (1 pareja en 1997; 10 parejas en 2001), Torrealba, Torremocha (5 parejas en 2000), Los Canchales (2 parejas en 1990), embalse de Alange (2 parejas) y Casas de Hitos (sin cifras ni fechas).
- Reproducción en La Albuera. 2013. En la Laguna Grande, 2 los días 07/07/13 (J. C. Paniagua) y 10/07/13 (S. Pérez); 4 el 14/07/13 entrando en un juncal a posibles nidos (A. Núñez, C. Clemente, E. Palacios, F. Montaña, L. Alcántara, S. Mayordomo y V. de Alba); el 18/07/13 se confirma la cría al observarse jóvenes volanderos (J. C. Paniagua) que siguen presentes el 20/07/13, el 03/08/13 y el 11/08/13 (J. C. Paniagua, F. Bernáldez, F. Macías); por último, 2 adultos y 2 juveniles el 20/08/13 (F. Montaña y J. Vázquez). En 2014 es posible que también haya criado, pero no llega a confirmarse.
- Registros invernales. En el embalse de Montijo, Mérida (BA), uno 3 inviernos consecutivos (2011-2014): registros el 04/12/11 (J. Solana); los días 10/01/13 (J. Solana y S. Pérez), 15/01/13 (S. Pérez), 07/02/13 (J. Solana) y 18/02/13 (S. Pérez); y los días 27/02/14 (J. Guerra), 01/03/14 (J. J. Ramos), 06/03/14 (Á. Sánchez) y 08/03/14 (J. Nolan y G. Schreur). Uno con plumaje invernal en Los Canchales (BA) el 05/02/11 (J. C. Paniagua, S. Mayordomo y T. Álvarez). Uno en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 29/01/13 (J. Guerra y M. Gálvez).
- Año 2009. Uno en Los Barruecos (CC) el 22/04/09 (S. Fletcher) y el 25/04/09 (C. Fernández). 3 en Casas de Hitos (BA-CC) el 24/05/09 y 2 el 15/06/09 (M. Kelsey). 2 en Guijo de Coria (CC) el 29/05/09 (S. Mayordomo).
- Año 2010. Uno en el embalse de Los Molinos (BA) el 21/04/10 (F. Yuste). 10 en La Albuera (BA) el 22/06/10 (J. C. Paniagua). Un juvenil en el embalse de Talaván (CC) el 07/10/10 (R. Montero). 3 en Esparragalejo (BA) el 23/10/10 (Á. Sánchez).
- Año 2011. En Portaje (CC) uno, el 23/04/11 y el 21/05/11, y 2 el 22/07/11 (S. Mayordomo, E. Palacios). En Valdecañas (CC) 10 el 05/05/11 (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Guerrero y M. Flores) y 8 el 20/06/11 (J. Prieta, S. Mayordomo). 2 en el embalse del Salor (CC) el 06/05/11 (S. Mayordomo). 12 en Casas de Hitos (BA-CC) el 12/04/11 (M. Kelsey). En La Albuera (BA) 15 el 18/04/11 (Á. Sánchez y J. Fernández), 6 el 01/05/11 (J. Guerra y M. Gálvez), 5 el 04/05/11 (G. Schreur) y 4 el

19/06/11 (A. Núñez). 8 en Valdesequera (BA) el 9/04/11 (Á. L. Sánchez). Varios en las lagunas de Torremejía (BA) el 21/04/11 (Á. Sánchez). En la charca de Esparragalejo (BA) 2 el 21/08/11 (Á. L. Sánchez) y uno del 11/09/11 al 22/10/11 (E. Palacios, J. C. Paniagua, S. Mayordomo, C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta, M. Rouco, A. Cangas, Á. Sánchez, E. del Viejo, F. Prieto y J. C. Paniagua). 71 en el embalse de Alange (BA) el 06/09/11 (Á. Sánchez). Uno en el embalse de Montijo, Mérida (BA), desde el 18/03/11 (J. Solana) hasta el 02/04/11 (M. Kelsey) y varios el 23/04/11 (Á. Sánchez). En el embalse de Llerena (BA) 8 el 23/04/11 (A. Núñez),

- **Año 2012.** 2 en el embalse de Ahigal (CC) el 27/04/12 (A. Pacheco). En Arrocampo (CC), 2 los días 17/05/12 (J. Prieta) y 20/05/12 (V. de Alba, S. Langlois, D. Langlois y A. Núñez) y uno el 11/07/12 (M. García del Rey y J. Briz). Presente en el embalse del Guadiloba (CC) el 26/04/12 (G. Schreur). 2 en Palazuelo (BA) los días 23/05/12 (J. P. Prieto) y 26/05/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano). 2 en Los Canchales (BA) el 27/03/12 (I. Sánchez, F. Lopo, E. del Viejo, C. Díaz y A. Cangas). Uno en el Puente Romano de Mérida (BA) los días 15/03/12 (J. Solana) y 20/03/12 (Á. Sánchez). 3 en el embalse de Alange (BA) el 03/04/12 (T. Montalvo). En el embalse de Arroyoconejos-Llerena (BA), 15 el 08/05/12, 5 el 09/05/12 y 2 el 05/06/12 (J. Vázquez y F. Montaña).
- **Año 2013.** 6 en Portaje (CC) el 25/05/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). El 10/09/13, un joven en el embalse de Ahigal (CC) (A. Pacheco). 2 en Arrocampo (CC) el 01/05/13 (E. Palacios, S. Mayordomo). 2 en Sierra Brava (CC) el 23/06/13 (M. Kelsey). Un joven en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 23/10/13 (M. Kelsey). En La Albuera (BA), 4 el 17/04/13, 15 el 18/04/13 (A. García y A. Núñez), 7 el 21/04/13 (L. Alcántara), 10 el 17/05/13 (A. Núñez), ver párrafo de “reproducción”, uno el 07/09/13 y 3 el 09/09/13 (J. C. Paniagua). En Guareña (BA), 3 el 02/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y uno los días 03 y 04/05/13 (J. Guerra, A. Núñez, E. Palacios, S. Mayordomo y V. de Alba); uno el 14/07/13 (A. Núñez, F. Castro, F. Lopo, J. Solana, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Pérez Gil y V. de Alba). En el embalse de Alange (BA) 10 el 14/04/13 (J. Solana, J. Guerra, M. Gálvez y S. Pérez) y uno el 03/08/13 (L. Alcántara). Uno en el embalse de Orellana (BA) el 19/06/13 (Á. L. Sánchez). 3 en el embalse de Brovales (BA) el 10/09/13 (F. Montaña). Uno en el embalse de Villaba de los Barros (BA) el 01/06/13 (A. Núñez, F. Montaña, J. M. Álvarez y J. A. Román).
- **Año 2014.** En Arrocampo (CC) 6 el 10/05/14 (J. Briz, I. Gallardo, M. García del Rey, J. González, C. Parrilla y M. Sánchez) y 4 el 15/05/14 (J. Prieta). Uno en Valdecañas (CC) el 18/04/14 (S. Mayordomo). En el embalse de Alcollarín (CC) 8 el 18/04/14 (F. Yuste), 4 el 11/05/14, 2 el

12/05/14, 3 el 02/06/14, 3 el 11/06/14 (M. Kelsey), **15** el 14/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 2 el 26/06/14 (M. Kelsey). En Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) 2 el 24/04/14 (M. Kelsey y E. Owen), 2 el 26/04/14 (C. Clemente) y **42** el 14/05/14 (J. P. Prieto). En La Albuera (BA) 6 el 26/04/14, 12 el 07/06/14 (J. C. Paniagua), 2 el 16/06/14 (J. A. Román), 5 el 29/06/14 (J. C. Paniagua), 3 el 05/07/14 (F. Montaña), 3 el 11/07/14 (E. del Viejo), 3 el 12/07/14 (J. Mazón y J. C. Paniagua), y uno del 08 al 11/08/14 (F. Montaña, A. Núñez, J. Vázquez). Uno en Los Canchales (BA) el 15/09/14 (F. Bernáldez, J. Guerra, F. Montaña y J. Vázquez). Uno en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 30/03/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y el 31/03/14 (C. Camacho, M. Gálvez y M. Kelsey). En el embalse de Villalba de los Barros (BA) 11 el 17/04/14 (J. M. Álvarez y F. Montaña) y 3 el 15/09/14 (V. de Alba y A. Núñez). 2 en el embalse de Arroyoconejos-Llerena (BA), el 05/06/14 (F. Montaña y A. Núñez).

Fumarel común (*Chlidonias niger*)

Estatus regional. Dos casos de reproducción en Los Canchales: 2 parejas en 1990 y 3 en 2005, considerados dudosos por algunos autores. Poco común en paso entre abril y noviembre (>500 individuos). Subespecie *C.n.niger*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Año 2009. 20 en Sierra Brava (CC) el 05/05/09 (J. Muddeman). Presente en Arrocampo (CC) el 10/05/09 (C. González, J. Briz, M. García del Rey, V. Risco y Laura). En Portaje (CC) uno el 22/05/09 y 2 el 12/09/09 (S. Mayordomo).
- Año 2010. 2 en Portaje (CC) el 27/04/10 (R. Montero). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 16/04/10 (S. Mayordomo).
- Año 2011. En Portaje (CC) 5 el 23/04/11, 3 el 21/05/11, uno el 22/08/11 y uno el 02/09/11 (S. Mayordomo). 2 en Charco Salado (CC) el 21/08/11 (S. Mayordomo). 11 en Valdecañas (CC) el 20/06/11 (J. Prieta, S. Mayordomo). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 21/04/11 (M. Kelsey). El 24/09/11, 2 en la Charca de Esparragalejo (BA). 2 en Los Canchales (BA) el 24/09/11 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo). En el embalse de Alange (BA) 2 el 11/06/11 (D. Jorge, E. Mateos y J. Solana) y 2 el 06/09/11 (Á. Sánchez). 4 en la charca de La Haba (BA) el 28/08/11 (J. P. Prieto).
- Año 2012. En Portaje (CC) uno el 01/05/12, 3 el 15/08/12, 3 el 15/09/12 y 3 el 02/10/12 (S. Mayordomo). Dos el 27/04/12 en el embalse de Ahigal (CC) (A. Pacheco), Dos en La Torrecilla, Plasencia (CC), el 21/08/12 (S. Mayordomo). En Valdecañas (CC) 3 el 20/05/12 (S. Mayordomo y E.

Palacios), el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. Prieta y C. Clemente) y 5 el 22/09/12 (S. Mayordomo). En el embalse del Guadiloba (CC) 5 el 26/04/12 y 3 el 27/04/12 (G. Schreur). En Palazuelo-Puebla de Alcollarín-Campo Lugar (BA-CC) 5 el 12/05/12 (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano) y uno el 13/05/12 (M. Kelsey). Uno en Los Canchales (BA) el 06/05/12 (F. Lopo, E. del Viejo y A. Cangas). En Esparragalejo (BA), 2 del 22/09/12 al 29/09/12 (F. Montaña, E. del Viejo, A. Núñez, S. Mayordomo, E. Palacios, C. Clemente, J. Vázquez, J. Solana). En el embalse de Montijo (BA) 3 el 27/04/12 (Á. Sánchez). En el embalse de Alange (BA) 5 el 27/04/12 (Á. Sánchez) y 2 el 16/08/12 (L. Alcántara). Uno en el embalse de Brovales (BA) el 09/08/12 (J. Vázquez, F. Montaña y B. Muñoz). En el embalse de Llerena (BA) 2 los días 08 y 09/05/12 (F. Montaña) y 2 el 05/06/12 (J. Vázquez y F. Montaña).

- Año 2013. 2 en Portaje (CC) el 21/04/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Arrocampo (CC) el 05/04/13 (I. Gallardo. M. García del Rey, M. Kelsey, S. Mayordomo y S. Fletcher). En Valdecañas (CC) 5 el 19/04/13, 4 el 31/05/13 (S. Mayordomo), 4 nupciales, 2 invernales y uno en muda el 30/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo) y 2 en plumaje invernal el 26/07/13 (S. Mayordomo). En el embalse de Talaván (CC) 2 el 30/05/13 y un joven los días 25/09/13 (M. Kelsey) y 29/09/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). En La Albuera (BA) uno el 17/05/13 (A. Núñez), 2 el 24/05/13 (J. Corral y Ó. Llama) y 2 el 24/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en el embalse del Boquerón, Cordobilla de Lácara (BA), el 23/05/13 (G. Schreur). Un adulto en Los Canchales (BA) el 25/08/13 (J. G. Aparicio). En la charca de Esparragalejo (BA) **14** el 27/04/13 (A. Cangas y E. del Viejo). 2 en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 15/04/13 (J. Guerra). 2 en Santa Amalia (BA) el 16/05/13 (F. Yuste). Uno en el embalse de Brovales (BA) el 10/09/13 (F. Montaña). En el embalse de Villaba de los Barros (BA), 3 el 16/04/13 (S. Pérez), 2 el 17/04/13 (B. Iglesias y M. Gálvez) y **13** el 01/06/13 (A. Núñez, F. Montaña, J. M. Álvarez y J. A. Román).
- Año 2014. En El Borbollón (CC) 5 el 16/06/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). En Valdecañas (CC) **42** el 18/04/14 (S. Mayordomo), 3 el 04/05/14 (S. Mayordomo y E. Palacios), uno el 22/05/14 (J. Muddeman), 14 el 25/05/14 (D. Langlois y S. Langlois), uno el 26/05/14 (C. Clemente) y **21** el 12/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). En el embalse de Alcollarín (CC) 3 el 02/06/14 (M. Kelsey), **15** el 14/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios), 3 el 26/06/14, uno el 31/08/14 (M. Kelsey), 2 el 13/09/14 (C. Clemente y S. Mayordomo) y 3 el 19/09/14 y el 21/09/14 (W. Haworth y M. Kelsey). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 21/04/14 y el 24/04/14 (M. Kelsey). Un adulto en Palazuelo-Campo Lugar (BA-CC) el 10/10/14 (M. Kelsey). 12 en el embalse de Morantes (BA) el

13/09/14 (J. L. Bautista). En Esparragalejo (BA) 1-2 del 15/09/14 al 21/09/14 (C. González, J. A. Román, V. de Alba, M. Gálvez, J. Guerra y otros). En Los Canchales (BA) 4 el 06/09/14 (M. Gálvez, J. Guerra, M. Infantes y M. Oro) y uno el 13/09/14 (V. de Alba, J. L. Bautista y A. Núñez). Uno en el embalse de Alange (BA) el 06/07/14 (L. Alcántara). Uno en el embalse de Villalba de los Barros (BA) el 17/04/14 (J. M. Álvarez y F. Montaña). 2 en el embalse de Cuncos, Villanueva del Fresno (BA), el 17/04/14 (Á. T. Mejías). 3 en el embalse de Brovales (BA) el 23/09/14 (F. Montaña).

Fumarel aliblanco (*Chlidonias leucopterus*)

Estatus regional. Accidental. Un caso de invernada. Seis registros; en 1964, 2002, 2003, 2009, 2013 y 2014; en enero-febrero (1), mayo (2), agosto y septiembre (2). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Uno en el río Guadiana en mayo 1964 (J. L. Pérez Chiscano). Un 1º invierno en el embalse de Portaje el 18/09/02 (J.A. García y A. Castaño). Uno nupcial el 15/08/03 en Los Canchales (F. Prieto). Uno nupcial en el embalse de Llerena el 30/04/06 (J. Salcedo).
- Registros 2009-2014. 3 en los arrozales de Palazuelo (BA) el 03/05/09 (M. Kelsey). Uno en el embalse de Torrecillas de la Tiesa (CC) el 09/09/13 (J. Hawkins). En el embalse de Orellana (BA) uno desde el 09/01/14 (W. Haworth) al 23/02/14 (M. Gálvez, J. Guerra, J. Pérez, J. Portillo, A. Sanmartí, S. Mayordomo, E. Palacios, V. de Alba, A. Núñez, F. Montaña y G. Montaña).

Ganga ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus regional. Residente común (1.400-2.000 ejemplares) con tendencia negativa (1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005-2014). Se desconoce el alcance de los desplazamientos estacionales. Monotípica.

Criterio. Localidades donde es escasa, cifras destacadas (>50).

- Población en 2014. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014). En invierno se censaron 732 ejemplares (578 en Badajoz y 154 en Cáceres) y en primavera 482 (319 en Badajoz y 163 en Cáceres). La estima conjunta a nivel regional es de 1.400-2.000 individuos. En el censo previo de primavera de 2005 se censaron 473 aves en Extremadura, 413 en Badajoz y 64 en Cáceres, y se estimaron 1.000-2.000. Las cifras en ambos censos son similares a escala regional, siendo el triple en

Cáceres y la mitad en Badajoz. Tales diferencias parecen ser debidas al grado de cobertura. Comparando las estimas la tendencia es aparentemente estable entre 2005 y 2014, tras una fuerte regresión previa. La población para las distintas ZEPA de Extremadura (primera cifra: máximo censado, segunda cifra: estima) son las siguientes: La Serena (210-450), La Albuera (213-220), Campiña Sur (76-150), Dehesas de Jerez (111-120), Orellana-Sierra de Pela (79-100), Alcántara-Brozás (33-75), Llanos de Cáceres (25-75), Zorita (40-70), Talaván-Cuatro Lugares (45-60), Trujillo (43-60), Magasca (30-50), Alange (11-25) y Valdecañas (6-15).

- Registros de interés. Una leucística en Campo Lugar (CC) el 23/08/12 (A. Calvo). 104 en Orellana la Vieja (BA) el 06/11/12 (Á. Sánchez).

Ganga ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus regional. Residente común (1.100-1.400 ejemplares en 2014) con tendencia negativa (1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005-2014). Se desconoce el alcance de los desplazamientos estacionales. Monotípica.

Criterio. Localidades donde es escasa, cifras destacadas (>50).

- Población en 2014. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014). En invierno se censaron 509 ejemplares (165 en Badajoz y 324 en Cáceres) y en primavera 541 (176 en Badajoz y 358 en Cáceres). La estima conjunta a nivel regional es de 1.100-1.400 individuos. En el censo previo de primavera de 2005 se censaron 273 aves en Extremadura, 229 en Badajoz y 44 en Cáceres, y se estimaron 1.000-1.500. Las cifras obtenidas en 2014 duplican a escala regional las de 2005, siendo 8 veces mayores en Cáceres y algo inferiores en Badajoz. Posiblemente la enorme diferencia detectada en Cáceres se deba a una mayor calidad de censo en 2014. Comparando las estimas la tendencia es aparentemente estable entre 2005 y 2014, tras una fuerte regresión previa. La población para las distintas ZEPA de Extremadura (primera cifra máximo: registrado, segunda cifra: estima) son las siguientes: La Serena (217-400), Talaván-Cuatro Lugares (200-220), Magasca (104-150), Alcántara-Brozás (91-150), Llanos de Cáceres (56-100), Trujillo (22-50), Orellana-Sierra de Pela (13-30) y Alange (5-15).
- Registros de interés. En Santa Marta de Magasca (CC) 3 bandos con 250 aves el 10/11/10 y 170 el 7/11/11 (M. Kelsey). Primera observación en Guijo de Coria (CC): un macho en un grupo de ortegas del 31/07/12 (S. Mayordomo) al 21/08/12 (J. Prieta, C. Clemente, J. Mahillo, H. Sánchez). Bando de 600 en los Llanos de Cáceres el 24/09/12 (A. Mogena). El

06/12/12, un bando de 330, mixto con 210 sisonos, entre Cabeza del Buey y Castuera (BA) (J. M. Vadillo)

Paloma bravía (*Columba livia*)

Estatus regional. Residente abundante (620.000 ejemplares en 2004-2006, 9'5% de España). Hasta la fecha no se han citado formas silvestres puras (subespecie *C.l.livia*) en Extremadura. Por tanto, toda la población debe considerarse doméstica, incluyendo aves cimarronas. Tendencia estable en todas las épocas.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1% y un aumento poblacional de +25% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2% y total de -1%; es decir, aparente estabilidad (SEO/BirdLife, 2013b).

Paloma zurita (*Columba oenas*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso y localizado (al menos en Villuercas). Común en invernada (>5.000 ejemplares) con tendencia positiva. Subespecie *C.o.oenas*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en España en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,9% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +6,2% y total de +47%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “aumento moderado” (+25%) en el periodo 1980-2012, sobre todo a partir del año 2000 (PECBMS, 2015).
- **En época de cría.** 27 en Alía (CC) el 19/04/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera).
- **Invernada.**
- **2008-2009.** Paso por el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 28/02/09 (J. M. Lorenzo y E. L. Rodríguez).
- **2009-2010.** En Galisteo (CC) 70 el 15/10/09 (S. Mayordomo), 85 el 13/01/10, **265** el 01/02/10 (J. Prieta) y más de 250 el 14/02/10 (S. Mayordomo). Una en Portaje (CC) el 14/02/10 (S. Mayordomo).
- **2010-2011.** 40 en Rioloobos (CC) el 19/12/10 (C. Clemente y J. Mahillo).

En Galisteo (CC), 3 el 19/10/10 (R. Montero), 90 en vuelo el 26/10/10 y unas 100 el 20/02/11 (S. Mayordomo).

- 2011-2012. En Riobobos (CC) 121 el 20/10/11 (S. Mayordomo), 25 el 18/11/11 (J. Prieta), 50 el 30/12/11 (J. C. Paniagua y S. Mayordomo) y **170** el 10/02/12 (S. Mayordomo). En Galisteo (CC) **231** el 02/11/11 (J. Prieta), 50 el 21/12/11 (J. Prieta) y **200** el 24/12/11 (C. Clemente y J. Mahillo). 36 en Portaje (CC) el 05/11/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). 56 en vuelo sobre Plasencia el 17/11/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). 4 en Oliva de Plasencia (CC) el 19/12/11 (S. Mayordomo).
- 2012-2013. 6 en el Alagón en Montehermoso (CC) el 15/01/13 (C. Cemente y J. Mahillo). En arrozales de Riobobos (CC), 75 el 09/12/12, 73 el 28/12/12, 7 el 20/01/13 y 80 el 30/01/13 (J. Prieta, S. Mayordomo). En Galisteo (CC), una en Valdefuentes el 13/10/12 (S. Mayordomo), **200** el 23/12/12, 168 el 26/01/13 (J. Prieta), 6 el 28/01/13, **300** el 30/01/13 (S. Mayordomo) y 20 el 13/02/13 (C. Clemente y J. Mahillo). 35 en Cerro Alto, Saucedilla (CC) el 20/01/13 (D. Langlois, J. Briz, M. García del Rey y S. Langlois). En Monroy (CC), 3 en el embalse del Sotillo el 06/10/12 (S. Mayordomo y M. García del Rey) y 25 el 12/01/13 (J. Muddeman). 40 en Casas de Hitos (BA-CC), el 15/11/12 (M. Kelsey). 40 en La Senda, Montemolín (BA), el 20/12/12 (A. Pacheco).
- 2013-2014. En Riobobos (CC), 2 el 20/11/13, 6 el 13/01/14 y 2 en Riobobos el 10/03/14 (S. Mayordomo). 11 en El Batán (CC) el 05/10/13 (R. Montero). En Galisteo (CC) 2 el 28/09/13 (R. Montero), 3 el 06/10/13 (A. Pacheco y S. Mayordomo), 16 el 14/10/13, 2 el 27/10/13, 20 el 05/11/13 (R. Montero), 2 el 11/11/13 (S. Mayordomo), 4 el 26/01/14, 5 el 08/02/14 (J. Prieta), una el 10/02/14, 2 el 17/02/14 (S. Mayordomo) y **200** el 27/02/14 (M. Kelsey). 3 en Fresnedilla, Oliva de Plasencia (CC), el 30/12/13 (S. Mayordomo). 11 en Casatejada (CC) el 27/10/13 (J. Briz y V. Risco). 2 en El Sotillo, Monroy (CC), el 12/01/14 (E. Palacios). **60** en Vegas Altas (BA) el 15/11/13 (M. Kelsey). 5 en La Albuera (BA) el 09/03/14 (F. Montaña) y 6 el 10/03/14 (A. Cama, M. Gálvez, J. Guerra y M. Pauly). 20 en Valverde de Leganés (BA) el 20/02/14 (J. Muddeman, J. P. Prieto y G. Schreur) y una el 22/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra). 6 en Retamal de Llerena (BA) el 30/11/13 (M. Gálvez).
- 2014-2015. 153 en Moraleja (CC) el 24/12/14 (C. Clemente y J. Mahillo). 60 en los arrozales de Riobobos (CC) el 08/12/14 (S. Mayordomo). 17 en Galisteo (CC) el 01/12/14 (S. Mayordomo). En La Aldea del Obispo (CC) 12 el 27/10/14 (M. Kelsey) y 8 el 29/12/14 (J. Porras). 3 en La Albuera (BA) el 17/11/14 (F. Montaña y J. Vázquez). 5 en Mérida (BA) el 09/12/14 (J. Guerra). 10 en Hornachos (BA) el 09/11/14 (M. Gálvez y J. Guerra).

Paloma torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus regional. Residente abundante (380.000 ejemplares en 2004-2006, 4% de España) con tendencia al aumento. Invernada muy abundante (300.000-1.650.000 ejemplares) con tendencia positiva, aunque fluctuante. Paso otoñal intenso. Subespecie *C.p.palumbus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Censo diciembre 2009. Aunque se realizan censos regionales anuales en dormideros por encargo de la Junta de Extremadura, la información no se publica. Tan sólo se dispone de los resultados del censo de diciembre de 2009: 317.612 torcaces en Extremadura, 389.624 en España y 2.079.574 en la península Ibérica, cifras anormalmente bajas en Extremadura. En comparación, en 2006 y 2008 se censaron 4.242.173 y 4.512.433 en la península Ibérica (Ekos, 2010). No obstante, hay que tener en cuenta el habitual desplazamiento de las aves a lo largo del invierno, que suelen ocupar en octubre los montados de Portugal y que según consumen las bellotas se mueven a Extremadura donde los máximos suelen ser en enero y febrero, de entre 1 y 3 millones de individuos.
- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,6% y un aumento poblacional de +54% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +11% y total de +26% (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “aumento moderado” (+100%) y constante en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Cifras de interés. Dormidero con más de 12.000 cerca del embalse de Brovales (BA) el 29/01/13 (F. Montaño). Más de 5.000 migrando sobre Cáceres el 15/04/12 (C. Fernández). Dormidero con 25.000-150.000 en el pinar de Hambrona, Toril (CC), en 2011-2012 (J. Prieta).

Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus regional. Residente común (760.000 ejemplares en 2004-2006, 23% de España) y en fuerte expansión, llegando tal vez a un fase de estabilidad. Subespecie *S.d.decaocto*.

Criterio. Nuevas localidades con reproducción y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +15% y un aumento poblacional de

+1.230% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2% y total de +30%; es decir, aparente aumento, pero a menor ritmo que en años precedentes (SEO/BirdLife, 2013b).

Tórtola europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus regional. Reproductor estival común (¿100.000? ejemplares en 2004-2006, 2'7% de España) con tendencia en declive. Frecuente en paso postnupcial, con tendencia decreciente. Subespecie *S.t.turtur*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,1% y una reducción poblacional de -32% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Llegadas.** Una en Villanueva de la Vera (CC) el 20/04/09 (D. Langlois). Una en Casas de Belvís (CC) el 21/04/09 (J. Briz). Una en Monfragüe (CC) el 14/04/11 (M. Kelsey). Una en Belvís de Monroy (CC) el 17/04/11 (G. Schreur) y otra en Santa Cruz de Paniagua (CC) (J. C. Paniagua). 2 en Valdesalor (CC) el 07/03/12 (C. Fernández). El 16/04/13 se observa una en Fuente del Maestre (BA), otra en Monesterio (BA) (S. Pérez) y otra en Benquerencia de la Serena (BA) (B. Iglesias, J. Guerra y M. Gálvez). Una en Feria (BA) el 15/03/14 y otra en Almendralejo (BA) el 30/03/14 (A. Giraldo y A. M. Sánchez).
- **Últimos registros.** Una en Los Canchales (BA) el 05/09/12 (P. Herrador y J. L. Bautista) y 5 en Mérida (BA) el 21/09/12 (J. Sánchez). Una en Medellín (BA) el 09/09/13 (F. Yuste). Una en Azuaga (BA) el 18/10/14 (M. Corvillo). Una en Riobobos (CC) el 29/11/14 (M. Á. Muñoz).

Cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus regional. Especie exótica naturalizada. Colonizador reciente (2013). Pequeña población en Cáceres capital con 2 nidos y 4 parejas en 2015. Tres registros previos en Zarza la Mayor (1996), Mérida (2003) y Casatejada (2007).

Criterio. Todas las observaciones.

- **Cáceres capital.** 3 en el parque del Príncipe el 01/01/13 (J. Solana). 4 en el Paseo Alto el 28/02/13 (R. Montero), el 03/03/13 y el 17/03/13 (J. Solana) y una el 28/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). En el Parque

del Príncipe, 4 el 24/03/13 (J. Solana), 3 el 02/04/13 (A. Cebrián) y 4 el 04/11/13 (A. Gil). 4 en el albergue municipal el 17/11/13 (F. J. Caballero). Presencia el 16/03/14 (J. Solana), el 30/04/14 (E. Cabrera, J. Ledo y J. Solana) y el 23/12/14 (J. Solana).

- Otras localidades. Una posiblemente escapada en Villanueva de la Serena (BA) los días 08/10/12, 09/10/12 y 10/10/12 (J. M. García). 2 en los jardines del hipódromo de Mérida (BA) el 15/07/14 (Á. Sánchez).

Críalo europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus regional. Reproductor estival común (¿5.000? ejemplares, 13% de España). Tendencia incierta. Invernante esporádico. Subespecie *C.g.glandarius*.

Criterio. Fechas extremas, nidos parasitados y observaciones de interés.

- Tendencia. No hay datos concretos para Extremadura, donde la impresión generalizada es de declive rápido y generalizado. En contraste los resultados del programa SACRE en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 indican “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,6% y un aumento poblacional de +45% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros. Un pollo en un nido con pollos de cuervo en Ahigal (CC) el 30/05/12 (A. Pacheco). Primer volantón el 25/05/13 en Arrocampo (CC) (M. Gálvez).
- Llegadas. Media 2009-2014: 7 de enero. Uno en La Serena (BA) el 07/01/09 (R. Montero). Uno en Madrigalejo (CC) el 05/01/10 (J. M. Tapia y M. Jiménez). Uno en Mérida el 18/01/11 (J. Solana). Uno en Don Álvaro (BA) el 23/01/11 (F. Crystal). Uno en Arroyo de la Luz (CC) el 29/01/11 (R. Parra). Uno en La Roca de la Sierra (BA) el 21/12/11 (M. Iglesias). 2 en Santa Marta de Magasca (CC) el 30/01/12 (M. Kelsey). Uno en Trujillo (CC) el 02/01/13 (M. Kelsey). 2 en Magasca (CC) el 11/01/14 (M. Kelsey). 2 en Villamesías (CC) el 25/01/14 (A. Calvo).
- Últimos registros. Un joven en Guijo de Coria (CC) el 21/08/12 (J. Sánchez).

Cuco común (*Cuculus canorus*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (320.000 ejemplares en 2004-2006, 16% de España) con tendencia estable. Migrante con tendencia decreciente. Subespecie *C.c.bangsi*, *C.c.canorus* en paso.

Criterio. Fechas extremas, nidos parasitados y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,1% y total de +4,7% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros de interés. Un juvenil cebado por un triguero en Barquilla de Pinares, Talayuela (CC), el 25/07/10 (D. Langlois).
- Llegadas. Uno en Malpartida de Plasencia (CC) el 19/02/09 (R. Montero). Uno en Portaje (CC) el 08/03/09 (M. Á. Muñoz) y otro en Plasencia (CC) (S. Mayordomo). Primeras 2 hembras en Villanueva de la Vera (CC) el 23/03/09 (D. Langlois). Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 04/03/10 (M. Kelsey). Uno en Casatejada (CC) el 08/03/10 (S. Mayordomo). Primera hembra en Villanueva de la Vera (CC) el 27/03/10 (D. Langlois). Uno en Arroyo de la Luz (CC) el 05/03/11 (F. Carrero). Uno en Portaje (CC) el 11/03/11 (S. Mayordomo). Uno en Trujillo (CC) el 17/03/11 (M. Kelsey). Primeras hembras en Villanueva de la Vera el 26/03/11 (D. Langlois) y en Casatejada (CC) el 27/03/11 (S. Mayordomo). Uno en Alcuéscar (CC) el 06/03/12 (S. Molano). Uno en Serrejón (CC) el 11/03/12 (M. García del Rey, I. Gallardo y E. Pérez-Balsalobre). Uno en Trujillo (CC) el 13/03/12 (G. Schreur). Uno en Oliva de Mérida (BA) el 01/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez). El 09/03/13, uno en Casatejada (CC) (E. Palacios y S. Mayordomo) y otro en Alange (BA) (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Montehermoso (CC) el 12/03/13 (J. Mahillo). Primera hembra el 26/03/13 en Serrejón (CC) (M. García del Rey). Uno en Burguillos del Cerro (BA) el 05/03/14 (F. J. Durán). Uno en Oliva de Mérida (BA) el 09/03/14 (F. Bernáldez, M. Gálvez y F. Macías). Uno en Trujillo (CC) el 11/03/14 (J. Muddeman). Primera hembra en Villanueva de la Vera (CC) el 30/03/14 (D. Langlois).
- Últimos registros. Un joven en el puerto de Tornavacas (CC) el 03/08/10 (E. Palacios). Uno en el puerto de Honduras, Cabezuela del Valle (CC), el 12/08/13 (B. Molina y J. Prieta). Uno en La Albuera (BA) el 20/08/13 (F. Montaña y J. Vázquez). Una hembra joven en Monfragüe (CC) el 23/09/14 (J. Torfs y M. Viskens).

Lechuza común (*Tyto alba*)

Estatus regional. Residente común (¿2.000? parejas) con tendencia incierta, aparentemente negativa. Subespecie *T.a.alba*, *T.a.guttata* sin confirmar.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “incierta”, con una reducción de -36% (SEO/BirdLife, 2014). Por tanto, aunque

estadísticamente no puede determinarse la tendencia, aparentemente es negativa.

Autillo europeo (*Otus scops*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (>10.000 parejas) con tendencia decreciente. Invernada escasa y poco conocida (decenas o cientos de ejemplares). Cría la subespecie *O.s.mallorcae* con paso adicional de *O.s.scops*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual del -5,3% y una reducción poblacional de -36% (SEO/BirdLife, 2014).
- **Llegadas.** Uno en Plasencia (CC) el 10/03/09 (J. Prieta). Uno en Aldeacentenera (CC) el 19/03/09 (C. Proper). Uno en Plasencia (CC) el 10/03/10 (J. Prieta). Uno en Cáceres capital el 23/03/10 (B. Molina). Uno cantando en Trujillo (CC) el 26/02/11 (J. Muddeman) y otro en Plasencia (CC) el 27/02/11 (J. Prieta). Uno en Collado de la Vera (CC) el 10/03/12 (J. M. Cano). Uno en Plasencia (CC) el 12/03/12 (J. Prieta). Uno en La Haba (BA) el 23/02/13 (F. J. Morcillo). Uno en Plasencia el 26/02/13 (J. Prieta). Uno en Pago de San Clemente (CC) el 12/03/14 (M. Kelsey). 3 en Plasencia el 16/03/14 (J. Prieta) y uno acosado por urracas el 20/03/14 (S. Mayordomo).
- **Últimos registros.** Uno en Casas del Castañar (CC) el 14/10/09 y otro en Plasencia (CC) el 29/10/09 (J. Prieta). Uno en Plasencia el 06/10/11 (J. Prieta). Uno en Plasencia (CC) el 21/10/13 (J. Prieta).

Búho real (*Bubo bubo*)

Estatus regional. Residente común (¿500-1.000? parejas) con tendencia creciente. Subespecie *B.b.hispanus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +10% y un aumento poblacional de +91% (SEO/BirdLife, 2014).

Mochuelo europeo (*Athene noctua*)

Estatus regional. Residente abundante (¿15.000? parejas) con tendencia decreciente. Subespecie *A.n.vidalii*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje de cambio anual del -3,8% y una reducción poblacional de -53% (SEO/BirdLife, 2013a). Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “estable”, con un cambio del +0,7% anual y +0,6% en total (SEO/BirdLife, 2014).

Cárabo común (*Strix aluco*)

Estatus regional. Residente común (¿5.000? parejas) con tendencia incierta, posiblemente estable. Subespecie *S.a.sylvatica*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,3% y un cambio poblacional de +1% (SEO/BirdLife, 2014). Por tanto, aunque estadísticamente no puede determinarse la tendencia, aparentemente es estable.
- **Registros de interés.** Nidificación en el suelo de una pareja en Mohedas de Granadilla (CC) el 30/03/12 (A. Pacheco). Citas urbanas: uno en el Paseo de Canovas, Cáceres, el 30/03/13 (F. J. Caballero y J. L. Caballero) y un pollo volantón en el Campus de Badajoz el 13/01/14 (E. Costillo).

Búho chico (*Asio otus*)

Estatus regional. Residente escaso (¿100-300? parejas) con tendencia incierta. Más frecuente en invernada con tendencia desconocida. Probablemente más numeroso, pues pasa muy fácilmente inadvertido. Subespecie *A.o.otus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4,8% y una reducción poblacional de -16%; ambas cifras son de signo distinto (SEO/BirdLife, 2014).
- **Año 2009.** En Peraleda de la Mata (CC) 2 el 13/02/09, 2 pollos en un nido el 25/04/09 y 2 pollos en un nido distinto el 08/05/09 (C. González). En Pago de San Clemente (CC) uno el 11/04/09 y varios pollos el 21/04/09 (M. Kelsey).

- Año 2010. Uno en Pago de San Clemente (CC) el 13/03/10 y el 22/04/10 (M. Kelsey). Uno en Ribera del Fresno (BA) el 11/12/10 (A. Núñez).
- Año 2011. Adulto con 2 pollos volantones en Santa Marta de Magasca (CC) el 03/04/11 (D. Langlois, J. Muddeman y S. Langlois). Uno en la isla del embalse de El Borbollón (CC) el 12/04/11 (J. Prieta y S. Mayordomo). Se escucha uno en Valcorchero, Plasencia (CC), el 13/04/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Montehermoso (CC) el 18/04/11 (C. Clemente y J. Mahillo). Uno en Alconchel (BA) el 02/05/11 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno cantando en Casatejada (CC) el 19/09/11 (E. Pérez-Balsalobre, M. García del Rey, M. Sánchez y S. Mayordomo).
- Año 2012. En Saucedilla (CC), nido ocupado el 10/03/12 (P. de la Nava y J. C. López) y con 2 pollos entre el 01/05/12 y el 17/05/12 (V. Risco, S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, M. García del Rey, J. Prieta, J. Briz y E. Palacios). Uno muerto por atropello entre Vegas de Coria (CC) y Riomalo de Abajo (CC) el 12/07/12 (A. Pacheco). Uno en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata (CC) desde el 21/11/12 (V. Risco y J. Briz) al 01/12/12 (V. Risco, M. Á. Muñoz, J. Briz, E. Palacios y C. Clemente, J. Garrido y C. Andrés). 2 en la rotonda de la N-V en Navalmoral de la Mata (CC) el 02/12/12 (P. Gómez).
- Año 2013. Uno en Las Cansinas, Monfragüe (CC), el 15/01/13 (S. Mayordomo). Uno en Arrocampo (CC) el 17/01/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Montehermoso (CC) el 05/02/13 (C. Clemente). 2 en el casco urbano de Badajoz el 07/11/13 (J. Guerra).
- Año 2014. En Pago de San Clemente (CC) uno el 12/03/14 y 4 jóvenes el 14/05/14 (M. Kelsey). Uno en La Aldea del Obispo (CC) el 18/05/14 (J. Muddeman). Uno en Badajoz capital el 24/10/14 (J. Guerra), el 30/10/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y el 01/11/14 (M. Rodríguez y J. C. Salgado). Uno en Alía (CC) el 06/12/14 (J. Á. Herrera). Uno en Montehermoso (CC) el 29/12/14 (C. Clemente y S. Mayordomo).

Búho campestre (*Asio flammeus*)

Estatus regional. Reproducción esporádica (un caso conocido). Escaso, pero regular, en paso e invernada (¿50-200? ejemplares) con tendencia muy fluctuante. Subespecie *A.f.flammeus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Revisión. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Cardalliaguet *et al.* 2014), revisando datos recientes para esta especie. Estos incluyen citas en época de cría en zonas cerealistas del sur de Badajoz (Campiña Sur, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Villagarcía de la Torre, Usagre y Bienvenida) y en

Llanos de Cáceres. La zona de mayor presencia invernal conocida se encuentra en el triángulo formado por Santa Amalia, Valdehornillos y Hernán Cortés, seguida por el Embalse de Los Canchales, los arrozales de Palazuelo-Guadalperales y La Albuera.

- Año 2009. Uno en Madrigalejo (CC) el 20/12/09 y 3 el 23/12/09 (J. M. Tapia y M. Jiménez).
- Año 2010. Uno en la Campiña Sur (BA) el 21/11/10 (A. Núñez). Dormidero de 3 ejemplares el 19/12/10 en Santa Amalia (BA) (F. Yuste y J. Porras). Uno en Casas de Hitos (BA) el 19/12/10 (Á. Díaz y otros).
- Año 2011. Uno en la Campiña Sur (BA) el 23/04/11 (A. Núñez). Uno en Arroyo de la Luz (CC) el 28/11/11 (R. Parra). Dormidero con **17** en Hernán Cortés (BA) el 12/12/11 y uno en Santa Amalia (BA) el 15/12/11 (J. A. Román). Un en la Cocosa, Olivenza (BA), el 28/12/11 y 2 en Santa Amalia (BA) el 30/12/11 (F. Yuste).
- Año 2012. Dormidero en Hernán Cortés (BA): 10 el 25/01/12 (R. Montero), más de 20 en febrero de 2012 (S. Fletcher, S. Mayordomo, L. Lozano, L. Alcántara, F. Yuste, E. Palacios, E. del Viejo y otros), **35** el 02/03/12 (Á. Sánchez) y sólo tres el 11/03/12 (F. Yuste). Uno en Santa Amalia (BA) el 29/01/12 (Á. Sánchez). Uno en Galisteo (CC) el 18/02/12 (J. Mahillo y C. Clemente). En Los Canchales (BA) 2 el 27/03/12 (I. Sánchez, F. Lopo y C. Díaz), uno el 27/10/12 (E. del Viejo y A. Cangas). y uno los días 13/12/12 (J. Vilches, J. M. Salazar, J. Arias y F. Martínez) y 16/12/12 (F. Lopo). 2 en el Canal de las Dehesas, cerca de la compuerta de Gorbea (BA) el 26/09/12 (E. Peña). Uno en el embalse de Talaván (CC) el 19/10/12 (M. Bourgeois). Uno en Cáceres (CC) el 22/11/12 (F. Carrero).
- Año 2013. En arrozales de Madrigalejo (CC), uno los días 08/01/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y 11/01/13 (J. Muddeman) y 2 el 12/01/13 (A. Mirat, J. M. Traverso, J. Prieta, J. Guerra, J. Morena, J. A. Fimia, M. Gálvez y Ó. Llama). Uno en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 06/03/13 (S. Mayordomo). 3 en Cabeza del Buey (BA) el 20/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Carcaboso (CC) el 17/04/13 (S. Mayordomo). Uno en Los Canchales (BA) el 12/10/13 (A. Cangas, E. del Viejo, J. G. Aparicio, J. Guerra, L. Gómez y M. Gálvez). Uno en Valdeherrero, La Roca de la Sierra (BA), el 20/12/13 (F. Lopo). Uno en Alvarado, Badajoz, el 23/12/13 (J. Guerra).
- Año 2014. Uno en Hernán Cortés (BA) el 21/01/14 (J. M. Abad y J. A. Maseró). Uno en Valdehornillos (BA) el 23/01/14 (J. A. Román). Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 10/04/14 (R. Sancho). 4 en Bienvenida (BA) el 01/11/14 (D. García y F. Montañó). Uno en Casar de Miajadas (CC) el 19/12/14 (J. Porras). Uno en Villanueva del Fresno (BA) el

20/12/14 (F. Montaña y A. Núñez). Uno en Higuera de Llerena (BA) el 26/12/14 (F. Montaña). Uno en Navalvillar de Pela (BA) el 27/12/14 (F. Bernáldez, J. Guerra y F. Macías).

Chotacabras europeo (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus regional. Reproductor estival poco común (¿1.000? parejas) con tendencia incierta, pero posiblemente creciente. Cría la subespecie *C.e.meridionalis*, paso de *C.e.europaeus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3% y un aumento poblacional de +7% (SEO/BirdLife, 2014). Por tanto, aunque estadísticamente no puede determinarse la tendencia, aparentemente es positiva.
- **Registros.** **2009.** Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 26/04/09 (D. Langlois), en Casas de Belvís (CC) el 29/05/09 (J. Briz) y en Robledillo de Trujillo (CC) el 12/11/09 (S. Fletcher). **2010.** Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 17/05/10 (D. Langlois) y en San Vicente de Alcántara (BA) el 23/10/10 (G. Schreur). **2011.** Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 26/04/11 (D. Langlois), en Cuacos de Yuste (CC) el 08/05/11 (G. Schreur), en La Garganta (CC) el 05/06/11 (R. Montero), en Montehermoso los días 09/06/11 (C. Clemente y J. Mahillo) y el 11/06/11 (C. Clemente), en Malpartida de Plasencia (CC) el 09/08/11 (G. Schreur), dos en Portaje (CC) el 10/09/11 (E. Palacios y S. Mayordomo), uno en Toril (CC) el 30/09/11 (M. García del Rey) y 6 en puerto de Esperabán, Pinofranqueado (CC), el 05/10/11 (A. Pacheco). **2012.** Uno en la Sierra de San Serván, Mérida (BA), el 06/05/12 (E. del Viejo y A. Cangas). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 11/05/12 (D. Langlois). 2 en Monfragüe (CC) el 29/05/12 (G. Schreur). Uno en Montehermoso (CC) el 14/06/12 (J. Mahillo y C. Clemente). Uno en Casas del Monte (CC) el 21/08/12 (S. Mayordomo). **2013.** Uno en Montehermoso (CC) el 22/04/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 24/04/13 (D. Langlois). Varios en mayo de 2013 en Monfragüe (CC) (P. Holgado). 2 en Montehermoso (CC) los días 07/06/13 (C. Clemente), 18/06/13 (C. Clemente, E. Palacios y J. Mahillo), 24/06/13 (C. Clemente y J. Mahillo) y 29/06/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Mahillo y J. Portillo). Uno en Casas del Monte (CC) a 1.400 msnm el 27/06/13 (J. Prieta y S. Mayordomo). 4 en Las Hurdes (CC) el 12/08/13 (A. Pacheco). 3 en San Serván, Mérida (BA), el 17/09/13 (A. Cangas). 2 entre Riomalo de Abajo y Casares de Hurdes (CC) el 03/10/13 (A. Pacheco). Uno en Granadilla (CC) el 04/10/13 (J. Casado). **2014.** Uno en Villanueva de la Vera (CC)

el 15/04/14 (D. Langlois). Uno en sierra de la Garrapata, Zarza la Mayor (CC), el 02/06/14 (S. Mayordomo). Uno en Montehermoso (CC) el 12/06/14 (C. Clemente y J. Mahillo) y 2 el 13/06/14 (C. Clemente, S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Cuacos de Yuste (CC) el 04/08/14 (F. Montaña). Uno en Los Canchales (BA) el 31/10/14 (F. Lopo).

Chotacabras cuellirrojo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus regional. Reproductor estival común (¿30.000? parejas) con tendencia estable. Subespecie *C.r.ruficollis*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa NOCTUA la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2006-2014 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,1% y una reducción poblacional de +6% (SEO/BirdLife, 2014).
- **Llegadas.** Uno en Pago de San Clemente (CC) el 21/04/09 (M. Kelsey). Uno en Peraleda de la Mata (CC) el 30/04/09 (C. González). Uno en Pago de San Clemente (CC) el 23/04/10 (M. Kelsey). Uno en Montehermoso (CC) el 25/04/10 (C. Clemente). Uno en Pago de San Clemente (CC) el 10/04/11 (M. Kelsey). Uno en Serrejón (CC) el 12/04/11 (M. García del Rey). Uno en Monesterio (BA) el 28/04/12 (A. Pacheco). Uno en Trujillo (CC) el 30/04/12 (M. Kelsey). Uno en Los Santos de Maimona (BA) el 13/04/13 (F. Montaña y F. Crystal). Uno en Alange (BA) el 14/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Serrejón (CC) el 16/04/13 (M. García del Rey). Uno muy temprano en Campo Lugar (CC) el 22/03/14 (A. Calvo). Uno en La Aldea del Obispo (CC) el 11/04/14 (J. Muddeman). Uno en Orellana (BA) el 13/04/14 (W. Haworth). Uno en la Portilla del Tiétar, Monfragüe (CC), el 13/04/14 (D. Langlois y S. Langlois).
- **Últimos registros.** Uno en Mirandilla (BA) el 01/10/10 (Á. Sánchez). 2 en Trujillo (CC) el 01/10/11 (J. Muddeman). El 26/09/12, uno en Mérida (BA) (J. Solana) y otro en Logrosán (BA) (E. Peña). Uno en Orellana (BA) el 29/09/12 (M. Llorente y Á. Díaz). Uno recién atropellado en Serrejón (CC) el 13/10/12 (P. Holgado). Uno en Monfragüe (CC) el 03/10/13 (M. García del Rey). Uno ingresa herido en AMUS, Villafranca de los Barros (BA), el 03/11/14 y otro el 01/12/14 (AMUS).

Vencejo común (*Apus apus*)

Estatus regional. Reproductor estival muy abundante (860.000 ejemplares en 2004-2006, 2’6% de España) con tendencia en declive. Migrante numeroso. Subespecie *A.a.apus*.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1% y una reducción poblacional de -32% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Llegadas. Primeros en Badajoz el 16/03/09 (J. C. Paniagua). Uno en Monfragüe (CC) el 31/03/09 (J. Prieta). Primeros en Plasencia (CC) el 25/03/10 (J. Prieta). Varios en Montehermoso (CC) el 31/03/11 (C. Clemente y J. Mahillo). 2 en Plasencia el 01/04/12 (S. Mayordomo). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 02/04/12 (D. Langlois). Uno en Guijo de Santa Bárbara (CC) el 03/04/12 y 8 el 04/04/12 (J. Calle). 8 en Zafra (BA) el 15/03/13 (A. Núñez y F. Montaña). Primeros en Mérida (BA) el 17/03/13 (S. Pérez). En Badajoz, uno el 21/03/13 (J. Mazón) y varios el 27/03/13 (J. C. Paniagua). Primeros en Feria (BA) el 15/03/14 (A. Giraldo y A. M. Sánchez). Uno en sierra de Alor, Olivenza (BA) el 23/03/14 y varios en Badajoz el 26/03/14 (J. C. Paniagua).
- Últimos registros. 20 en Arrocampo (CC) el 23/08/11 y un grupo en la Sierra de Tormantos, Piornal (CC), el 25/08/11 (J. Prieta). El 01/09/12, varios en Los Canchales (BA) (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez) y 3 en Monfragüe (M. Carregal y G. Fernández). 4 en Villalba de los Barros (BA) el 07/09/12 (F. Montaña). Uno en Alange (BA) el 21/09/13 (B. Iglesia, J. Guerra y M. Gálvez).

Vencejo pálido (*Apus pallidus*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (>25.000 parejas) con tendencia positiva y aparente expansión geográfica. Invernante muy escaso, de reciente descubrimiento y limitado a una localidad (Alange, 2-15 ejemplares, 2009-2015). Subespecie *A.p.brehmorum*.

Criterio. Fechas extremas, nuevas localidades y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “incremento fuerte” con un porcentaje medio de cambio anual de +84% (SEO/BirdLife, 2013a). Se ignora si este aumento es real o debido al mejor conocimiento en la identificación de la especie.
- Invernada en Alange (Badajoz). Por Jesús Solana. En 2009/2010 fue confirmada la invernada completa en la localidad de Alange, donde duermen en mechinales de la Iglesia de N^a S^a de los Milagros, fenómeno que continúa en inviernos sucesivos. Máximos por temporada: 2009-2010, 9 aves el 04 y 05/01/10; 2010-2011, 15 y 11 aves el 03 y 05/01/11; 2011/2012, invernada de al menos 8 con un máximo de 15 el

06/12/11; 2012-2013, visitas entre el 10/10/12 y el 07/03/13 con invernada de 2 individuos, últimos migrantes el 22/11/12 y primeros el 05/02/13; 2013-2014, sólo un invernante del 29/11/13 al 14/01/14; por último, 2014-2015, 7-8 invernantes. Con el fin de detectar otros puntos de invernada, en 2011/12 se hicieron prospecciones en Mérida, Hornachos, Valverde de Mérida y Palomas con resultado negativo; aunque el 02/01/15 se ven 2 en Oliva de Mérida (F. Montaña). Registros concretos: 2010-2011. Máximo de 15 vencejos los días 03/01/11, 04/01/11 y 05/01/11 (J. Solana). 2011-2012. 6 el 29/11/11, 7 el 30/11/11, 15 el 01/12/11 (J. Solana), 12 el 06/12/11 (A. Núñez, J. Solana, V. de Alba), 9 el 11/12/11 (L. Alcántara), 9 el 27/12/11 (J. Solana), 7 el 10/01/12 y 8 el 01/02/12 (J. Solana). 2012-2013. 8 el 10/10/12 (J. Solana), uno el 17/10/12 (M. Gálvez y J. Guerra), 8 el 24/10/12, 4 el 31/10/12 (J. Solana), 2-3 entre el 09/11/12 y el 29/11/12 (J. Solana), 1-3 durante diciembre 2012 (J. Solana), 2 el 11/01/13 (J. Guerra, M. Gálvez), uno el 23/01/13 (J. Solana) y uno el 26/01/13 (J. Guerra, M. Gálvez). 2013-2014. 3 el 06/11/13 (M. Gálvez), el 10/11/13, 4 el 12/11/13 (J. Guerra, M. Gálvez), 4 el 19/11/13, uno el 29/11/13, uno el 09/01/14 (J. Solana) y uno el 14/01/14 (J. Guerra). 2014-2015. 5 el 18/10/14 (V. de Alba, A. Núñez y J. Solana), 15 el 14/11/14 (J. Solana), uno el 22/11/14 (M. Gálvez), 8 el 27/11/14, 11 el 01/12/14, 10 el 05/12/14, 9 el 15/12/14, 8 el 22/12/14 (J. Solana) y 3 el 31/12/14 (A. M. Sánchez).

- Otros registros en enero. Un ejemplar el 24/01/09 en Mérida (J. Solana) y el 13/01/10 (Á. Sánchez). Presente en el embalse de Alange (BA), el 08/01/10 (F. Crystal). Uno entrando a dormir en Jaraíz de la Vera (CC) el 20/01/10 (P. Gómez).
- Llegadas. Primeros en Plasencia (CC) el 19/02/09 (J. Prieta) y 3 en Piornal (CC) el 28/02/09 (M. J. Valencia y X. Piñeiro). Primeros en Plasencia el 18/02/10 y en Piornal (CC) el 03/03/10. (J. Prieta). Uno en Plasencia (CC) el 26/01/11 (S. Mayordomo) y varios el 24/02/11 (J. Prieta). 8 en Cáceres el 14/02/11 (F. Carrero). 2 en Alburquerque (BA) el 22/02/11 (G. Schreur). Primeros en Piornal (CC) el 09/03/11 (J. Prieta). El día 01/03/12: 4 en Montehermoso (CC) (J. Mahillo), 25 en Plasencia (J. Prieta), 40 en Mérida (BA) (Á. Sánchez) y varios en Badajoz (J. C. Paniagua). 53 en Alange (BA) el 02/03/12. 20 en Trujillo (CC) el 03/03/12 (M. Kelsey, J. Porrás y G. Schreur). Primeros en Piornal (CC) el 06/03/12 (J. Prieta). 3 en Campo Lugar (CC) el 04/02/13 (A. Calvo), varios en Montehermoso (CC) el 05/02/13 (J. Mahillo), 2 en Usagre (BA) el 12/02/13 (F. Montaña). Uno en Trujillo (CC) el 13/02/14 (J. Porrás) y otro en Llerena (BA) (F. Montaña). Primeros en Plasencia (CC) el 27/03/14 y en Piornal (CC) el 17/03/14 (J. Prieta).
- Últimos registros. Últimos en Plasencia (CC) el 22/09/09 y en Piornal (CC) el 25/09/09 (J. Prieta). 4 en Piornal (CC) el 13/10/10 y uno en

Plasencia el 17/10/10 (J. Prieta). 3 en Piornal (CC) el 06/10/11 y uno en Montehermoso (CC) el 21/10/11 (C. Clemente). Uno recién muerto en Plasencia (CC) el 22/10/11 (M. J. Escalante) y otro vivo el 23/10/11 (J. Prieta). Uno en Navalморal de la Mata (CC) el 22/11/11 (J. Briz). Últimas citas de uno en Plasencia (CC) el 14/09/12 y 2 en Piornal (CC) el 20/09/12 (J. Prieta). Uno en Piornal (CC) el 02/10/14 (J. Prieta).

Vencejo real (*Apus melba*)

Estatus regional. Reproductor estival poco común (250-500 parejas) con tendencia incierta, quizás estable. Subespecie *A.m.melba*.

Criterio. Fechas extremas, colonias y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “incierta” aunque el cálculo arroja un porcentaje medio de cambio anual de +2,3% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Llegadas.** 2 en Badajoz (BA) el 10/03/09 (J. C. Paniagua). En Plasencia (CC), primeros el 11/03/09 y uno el 25/02/10 (J. Prieta). 3 en Mérida (BA) el 03/03/10 (M. Kelsey). 20 en la presa de Alange (BA) el 26/02/11 (R. Romero). 4 en Mérida (BA) el 02/03/11 (Á. Sánchez). Primeros en Mérida (BA) el 08/03/12 (E. del Viejo). 5 en Plasencia (CC) el 09/03/12 (J. Prieta). En la presa de Alange (BA), 4 el 27/02/13 (J. Solana, M. G. Soria y S. Pérez) y 15 el 28/02/13 (J. Guerra, M. Gálvez). 5 en Mérida (BA) el 06/03/13 (J. Solana). 3 en Alange (BA) el 20/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Uno en el río Guadiana en Badajoz el 26/02/14 (G. Schreur).
- **Últimos registros.** 26 en Alburquerque (BA) el 25/10/09 (G. Schreur). 15 en Cornalvo (BA) el 01/11/10 (J. Ledo). Uno en Mérida (BA) el 12/11/10 (Á. Sánchez). El 19/11/11, 2 en Badajoz (J. C. Paniagua) y 3 en Alange (BA) (J. Solana). Últimos en Mérida (BA) el 21/11/11 (Á. Sánchez). En Mérida (BA), 40-50 el 04/11/12 (Á. Sánchez) y varios el 11/11/12 (S. Pérez). **400** en la presa de Alange (BA) el 04/11/12 (E. del Viejo, A. Cangas). 35 en Badajoz el 05/11/13 (J. C. Paniagua). 8 en Alange (BA) el 17/11/13 (M. Gálvez) y 3 el 20/11/13 (A. Millet, A. Carreño, J. Guerra y M. Gálvez). 14 en Badajoz (BA) el 16/11/14 (J. C. Paniagua). 100 en Alange (BA) el 18/11/14 (M. Gálvez y J. Guerra), **230** el 19/11/14 (M. Gálvez, J. Guerra, X. Piñeiro y M. J. Valencia) y 80 el 20/11/14 (M. Gálvez).
- **Reproducción.** Colonia con 6 parejas y 19 ejemplares, incluyendo juveniles, en el puente de Guareña, Valverde de Mérida (BA) el 01/06/13 (F. Crystal).

Vencejo cafre (*Apus caffer*)

Estatus regional. Reproductor estival muy escaso (¿75-150? parejas, 20-35% de España) con tendencia creciente. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones, en Monfragüe sólo fenología y nidos.

- **Revisión.** Primer registro y primera reproducción en la península Ibérica, en Cádiz, en 1964 y 1966. Primeros registros en Extremadura: una pareja en Villar del Rey en 1979 y otra pareja en Montánchez en 1981 y 1982. Primera reproducción confirmada, tres nidos, en Canchos de Ramiro en 1989 y 1990. Actualmente presente de modo disperso en zonas montañosas de toda la región con estima de >100 parejas. Citado en 45 localidades de Extremadura hasta 2015, en concreto en Sierra Morena, sierras centrales de Badajoz (Alange, Hornachos, La Serena), embalses del Guadiana (Orellana, García Sola y Cijara), Alburquerque-San Pedro-Montánchez, Ibores-Villuercas, Canchos de Ramiro-Monfragüe-Valdecañas y La Vera. En Monfragüe ha sido visto en nueve parajes diferentes, con nidos en cuatro y mayor grupo de 12 aves. Fenología tardía con citas extremas en abril (día 25) y noviembre (día 13) y mayor presencia entre mitad de mayo y final de septiembre. En Extremadura se conocen nidos en sustrato rocoso y edificaciones (sobre todo puentes, también presas y edificios), siempre en nidos usurpados a golondrinas dáuricas excepto un caso en Guijo de Santa Bárbara de una pareja que nidificó en 2010 y 2011 en un hueco de un edificio del pueblo.
- **Registros.** 2 en el embalse de Brovales (BA) el 31/08/09 (F. Montaña). En Guijo de Santa Bárbara (CC), 2 entrando bajo un alero el 07/08/10 (J. Calle), uno los días 08/05/11 (G. Schreur) y 22/05/11 y una pareja entrando al nido el 12/06/11 (J. Calle). 2 en Helechal (BA) el 28/04/11 (J. Porras). Uno en la mina La Jayona (BA) el 21/05/11 (F. Montaña). En Canchos de Ramiro (CC), 4 el 22/05/11 (C. Clemente), uno el 25/06/11 (C. Clemente y J. Mahillo). En Puerto Peña, Talarrubias (BA), uno el 06/06/11 (J. Porras) y el 17/05/13 (M. Gálvez). 3 en el Pico de Miravete (CC) el 23/06/11 (G. Schreur). Uno en Casas de Millán (CC) el 29/06/11 (G. Schreur y P. López). En Alía (CC), 2 el 12/05/12 (J. Á. Herrera y J. Cerezo), el 30/05/12, el 03/06/12 (J. Á. Herrera) y el 08/06/13 (J. Cerezo). En Alange (BA), uno en la presa el 18/05/12 (M. Kelsey y J. Porras); 1-4 entre la sierra y el pueblo del 26/05/13 al 05/10/13 (A. Núñez, C. Clemente, D. Huerta, E. Palacios, F. Castro, F. Montaña, J. Solana, J. Vázquez, J. A. Román, J. Guerra, L. Alcántara, M. Gálvez, M. Martínez, M. Kelsey, S. Mayordomo, S. Pérez y V. de Alba); uno el 09/05/14 (J. Solana) y 2 el 18/10/14 (V. de Alba, J. Solana

y A. Núñez). 2 en Cabañas del Castillo (CC) el 10/05/13 (S. West). 3 en el río Sotillo entre Azuaga y Malcocinado (BA) el 12/06/13 (F. Crystal). Uno en el embalse de Cancho del Fresno, Cañamero (CC), el 13/06/13 (G. Schreur). 2 en sierra de San Pedro (BA/CC) el 12/07/13 (Á. Sánchez).

- Llegadas. Todas en Monfragüe. 3 en la Portilla del Tiétar el 06/05/09 (J. Muddeman). Uno en la Portilla del Tiétar y otro en el Salto del Gitano el 25/04/10 (M. Kelsey). Uno en el Salto del Gitano el 27/04/11 (M. Kelsey). En el castillo, uno el 06/05/12 (J. Muddeman) y 2 el 11/05/12 (M. Kelsey). En el Salto del Gitano, uno el 29/04/13 (G. Carr y L. Carr) y 2 el 01/05/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en el Salto del Gitano el 06/05/14 (M. Kelsey).
- Últimos registros. 3 en el castillo de Monfragüe (CC) el 12/10/09 (J. Briz). 2 entran a un nido en Monfragüe (CC) el 19/10/11, el 22/10/11 y el 13/11/11 (M. Kelsey). Uno en Monfragüe (CC) el 05/10/13 (C. Clemente, M. Kelsey y S. Mayordomo) y 4 el 06/10/13 (J. Muddeman). Uno en Cañamero (CC) el 09/10/13 (S. Pérez). 2 en Monfragüe (CC) el 20/10/14 y uno el 27/10/14 (J. Porras). Uno en el embalse de Cancho del Fresno, Cañamero (CC), el 01/11/14 (J. P. Prieto).

Vencejo moro (*Apus affinis*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en Alange en julio de 2013 y en Badajoz capital en mayo de 2014.

Criterio. Todas las observaciones recibidas

- Primeros dos registros para Extremadura. Uno en el castillo de Alange (BA) los días 01/07/13 (S. Pérez), 03/07/13 (J. A. Román) y 11/07/13 (L. Alcántara). Uno en Badajoz capital (BA) el 19/05/14 (J. Mazón).

Martín pescador común (*Alcedo atthis*)

Estatus regional. Residente común (3.000 individuos y 1.000 parejas en 2007; el 10% de España), con tendencia incierta, posiblemente negativa. En invierno llegan bastantes aves foráneas; tendencia incierta, quizás en aumento. Subespecie *A.a.ispida*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -4,8% y una reducción poblacional de -42% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN,

la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +10% y total de +18%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b).

Abejaruco europeo (*Merops apiaster*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (*¿*1.300.000? ejemplares en 2004-2006, 22% de España) con tendencia estable. Terminada la época de cría, en julio y agosto se concentra en zonas ricas en alimento, como regadíos y montañas. Monotípica.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,2% y un aumento poblacional de +7,7% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Llegadas.** Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 20/03/09 (D. Langlois) y varios en Jaraicejo (CC) (M. Kelsey y C. Durdin). Varios en Villanueva de la Serena (BA) el 23/03/10 (V. M. Quintana) y en Plasencia (CC) (M. Á. Muñoz) y Monesterio (BA) el 26/03/10 (A. Pacheco). Varios en Usagre (BA) el 20/03/11 (E. Costillo), en Las Hurdes (CC) el 25/03/11 (A. Pacheco) y en Mérida (BA) el 26/03/11 (S. Fletcher). Varios en Montánchez (CC) el 14/03/12 (C. Fernández), en Mérida (BA) el 27/03/12 (Á. Sánchez), en Serrejón (CC) el 28/03/12 (M. García del Rey) y en Los Canchales (BA) el 28/03/12 (E. del Viejo). Varios en Cornalvo (BA) el 27/03/13 (E. del Viejo). El 28/03/13, 9 en Montijo (G. Schreur, J. L. Bautista, J. Tarrío, N. Schreur y P. Schreur), 8 en Palazuelo (BA) (M. Kelsey) y uno en Monfragüe (CC) (M. García del Rey). 4 en Alange (BA) el 29/03/13 (L. Alcántara). Varios en Plasencia (CC) el 18/03/14 (M. Á. Muñoz), en Burguillos del Cerro (BA) el 21/03/14 (F. J. Durán) y en Torremejía (BA) el 22/03/14 (A. Giraldo y A. M. Sánchez).
- **Últimos registros.** Varios en Plasencia (CC) el 06/09/10 (J. Prieta). Grupo sobre Piornal (CC) el 15/09/11 (J. Prieta). El día 11/09/12, varios en Peraleda de la Mata (CC) (V. Risco y J. Briz) y uno en el embalse del Jerte (CC) (S. Mayordomo y E. Palacios). Varios sobre Plasencia (CC) el 13/09/13 (S. Mayordomo). 2 sobre Monterhermoso (CC) el 19/09/13 (J. Mahillo). Varios sobre Plasencia (CC) el 12/09/14 (S. Mayordomo).

Carraca europea (*Coracias garrulus*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (*¿*<200 parejas?) con tendencia muy negativa y extinciones locales. Subespecie *C.g.garrulus*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. No existen datos cuantitativos sobre carraca en Extremadura, pero todo indica que está sufriendo un “declive fuerte”, tanto con reducción poblacional como pérdida del área de ocupación. En el norte de Cáceres está casi desaparecida en las comarcas donde antes estaba presente (La Vera, Campo Arañuelo, Ambroz y Alagón), donde en 2013 sólo se detectó una pareja, en 2014 un ejemplar y en 2015 no ha sido citado (Oliva de Plasencia).
- Llegadas. Una en Casas de Belvís (CC) el 21/04/09 (J. Briz). Una entre Botija y Plasenzuela (CC) el 23/03/10 (A. Dale, A. Spence e I. Spence). Una en La Pulgosa, Cáceres, el 27/03/11 (S. Villa). En Cáceres, una el 29/03/12 (M. Perrins y C. Perrins), el 02/04/12 (J. C. López) y el 04/04/12 (R. Montero y R. Sutton). Una en Llanos de Cáceres el 07/04/13 (C. Luengo). El 09/04/13, dos en Santa Marta de Magasca (CC) (M. Kelsey) y una en Usagre (BA) (F. Lopo). Una en Santa Marta de Magasca (CC) el 04/04/14 (R. Montero). Una en Llanos de Cáceres el 06/04/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). Una en Torremocha (CC) el 08/04/14 (C. Fernández).
- Últimos registros. En el embalse de Arroyoconejos-Llerena (BA), 2 el 07/08/12 (J. Vázquez, F. Montaña y B. Muñoz) y una el 11/08/12 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). Una en los regadíos de Santa Amalia (BA) el 15/08/12 (F. Yuste).

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus regional. Reproductora abundante (430.000 ejemplares en 2004-2006, 23% de España; año 2008) con tendencia estable. Invernante común (≥ 50.000 ejemplares) con tendencia incierta, posiblemente creciente. Subespecie *U.e.epops*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual del 0% y un aumento poblacional de +8% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,9% y un aumento poblacional de +11%; es decir, con posible aumento (SEO/BirdLife, 2013b).
- Registros. En Garganta la Olla, una entrando a un nido a 1.400 msnm y otra vista a 1.570 msnm, el 15/06/11 (J. Prieta). Una melánica en Santa Amalia (BA) el 28/03/13 (A. Maestre, A. Núñez, C. Luengo, F. Yuste, F. Montaña, J. Solana y V. de Alba). Una leucística entre Yelbes y

Valdetorres (BA) el 29/01/14 (J. A. Román) y el 09/02/14 (F. Yuste).

Torcecuello euroasiático (*Jynx torquilla*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (100-500 ejemplares en 2004-2006, <0.1% de España) con tendencia positiva. Más frecuente en paso e invernada, con tendencia desconocida. Subespecie *J.t.torquilla*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,8% y total de -30% (SEO/BirdLife, 2013a).

- **Época de cría**

Norte de Cáceres. Uno macho en Torre de Don Miguel (CC) el 05/04/09 (S. Mayordomo). Uno en Montehermoso (CC) el 12/06/09 (C. Clemente). En Zarza la Mayor (CC), 2 el 10/04/10 (C. Clemente y J. Mahillo). En Santa Cruz de Paniagua (CC) 2 el 25/06/11 (J. C. Paniagua) y uno el 25/04/14 (A. Pacheco). 4 en la dehesa de Aceituna (CC) el 08/06/12 (A. Pacheco). Cría posible en Plasencia (CC), 1-2 en el Paseo Fluvial en junio de 2010 a 2014 (R. Montero, J. Prieta, S. Mayordomo) y en el cordel de Navacebreda, 2 machos el 17/04/13 y el 03/04/14 (S. Mayordomo). Uno en el Pitolero a 1.200 msnm, Cabezabellosa (CC), el 11/05/13 (J. Prieta). En Villanueva de la Vera (CC), cría probable: 1-2 del 26/03/09 a junio de 2009; 3 el 26/03/11, uno los días 28/03/11 y 30/03/11, uno durante abril de 2011 con máximo de 3 el día 16/04/11; uno los días 12/04/12, 17/04/12 y 25/04/12, 2 el 30/04/12, y uno el 12 y el 14/05/12; uno los días 06/04/13, 07/04/13, 18/04/13, 22/04/13 y 30/04/13, 3 el 12/04/14, y uno el 15/04/14, el 17/04/14, el 09/05/14 y el 10/05/14 (D. Langlois). Uno en el río Eljas, Eljas (CC), el 28/05/14 (S. Mayordomo). Uno en Santibáñez el Alto (CC) el 16/06/14 (C. Clemente y S. Mayordomo).

Sur de Cáceres. Dos machos en Valencia de Alcántara (CC) el 10/04/11 (J. Prieta). Uno en Madrigalejo (CC) el 05/05/12 (M. Kelsey y J. Muddeman). Uno en Pago de San Clemente (CC) el 21/04/13 (M. Kelsey). Uno entre Santa Marta de Magasca y Trujillo (CC) el 05/04/14 (N. Renwick). Uno en Alía (CC) el 03/05/14 y 3 el 04/05/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera). En Monfragüe (CC), uno en Las Corchuelas el 24/04/13 (S. Mayordomo) y uno el 18/05/14 (J. Muddeman).

Provincia de Badajoz. En Cornalvo (BA), uno el 10/04/10 y se confirma la cría de una pareja el 16/05/12 (J. Ledo). Un macho en Cheles (BA) el 12/05/12 (L. R. Hernández y J. C. Paniagua). Uno en Barcarrota (BA) el 22/05/13 (M. Gálvez). En Mérida (BA), 2 el 13/04/13 (J. Solana, J.

Guerra, M. Gálvez y S. Pérez Gil); uno con ceba en el soto del Guadiana el 30/06/13 (C. Clemente y M. García del Rey) y uno en Valluncosa el 03/04/14 (Á. Sánchez). En La Lapa (BA), 2 los días 13/04/13 (E. del Viejo, F. Montaña y F. Crystal) y 28/04/13, una pareja criando el 12/06/13 (F. Montaña), uno en la sierra de Santa Cruz el 26/05/13 (F. Montaña y G. Montaña), uno el 16/04/14 (F. Montaña) y el 28/04/14 (F. Bernáldez, F. Macías, F. Montaña), y uno entrando a un viejo nido de picapinos el 12/05/13 (F. Montaña). Presente en Alange (BA) el 28/04/13 (M. Gálvez). En Salvaleón (BA), 2 machos el 21/05/13 (M. Gálvez) y uno los días 22/05/13 (F. Montaña) y 24/05/13 (L. Alcántara). 4 en Zahínos (BA) el 16/05/14 (F. Montaña). Uno en Monesterio (BA) el 02/05/13 (A. Pacheco). Varios en el valle de Santa Ana (BA) el 02/05/14 (F. Montaña). Uno en el río Bembézar, Azuaga (BA), el 25/05/14 (V. de Alba y A. Núñez).

- **Invernada** (1 noviembre- 15 febrero).

Provincia de Cáceres. Uno en Valdeobispo (CC) el 01/02/10 (J. Prieta). Uno en el embalse de Talaván (CC) el 07/11/11 (M. Kelsey). En Casas de Hitos (CC/BA) 2 el 4/02/11 (S. Fletcher). En el río Jerte en Plasencia, uno los días 29/11/11, dos el 06/12/11, 05/11/12, 19/11/12, 31/12/12, dos el 04/01/13 y uno los días 07/02/13 y 12/02/13 (S. Mayordomo, R. Montero, J. Prieta, A. Salvador). Uno en Tejeda del Tiétar (CC) el 02/02/09 (R. Montero). Uno en Toril el 12/11/11 (J. Briz). En Saucedilla (CC) uno el 13/02/11 (J. Briz) y el 29/01/13 (R. Montero). En Monfragüe (CC) uno el 10/02/11 (S. Mayordomo), el 09/02/13 (J. Porras) y el 14/11/13 (M. García del Rey y M. Hörstermann). Uno en Galisteo (CC) el 13/02/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Uno en Cedillo (CC) el 18/01/14 (G. Schreur y P. Schreur). Uno en el pinar de Garrovillas (CC) el 12/01/14 y otro en Malpartida de Plasencia (CC) el 18/01/14 (S. Mayordomo).³ en El Batán (CC) el 24/01/14 (R. Montero, J. Torfs y M. Viskens).

Provincia de Badajoz. Uno en Valverde de Leganés (BA) el 02/02/10 (G. Schreur). Uno en Jerez de los Caballeros (BA) el 14/02/10 (R. Montero). Uno en Hernán Cortés (BA) el 02/11/12 (J. P. Prieto). En Mérida (BA), uno el 03/11/12 (Á. Sánchez) y el 01/11/14 (V. de Alba y A. Núñez). Uno en Cornalvo (BA) el 26/01/13 (S. Pérez). En el río Matachel, Alange (BA), uno el 22/11/13 (J. Guerra y L. Alcántara) y el 09/01/14 (J. Guerra). Uno en La Parra (BA) el 18/01/14 (V. de Alba y A. Núñez). Uno en La Lapa (BA) el 11/11/14 (F. Montaña). Uno en Brovales (BA) el 23/11/14 (F. Montaña). Uno en Valdecigüeñas, Puebla del Maestre (BA), el 23/01/14 (M. Gálvez). Uno en el río Bembézar, Azuaga (BA) el 01/02/14 (V. de Alba y A. Núñez). Un en la sierra de Tentudia (BA) el 17/11/14 (M. Gálvez y J. Guerra).

- **Época prenupcial.** 2009. Uno en Monfragüe (CC) el 28/02/09 (J. M. Traverso). Uno en Serrejón el 02/04/09 (M. García del Rey). 2010. Uno

en Santa Amalia (BA) el 13/03/10 (F. Yuste). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 14/03/10 y el 27/03/10 (D. Langlois). Uno en Aliseda (CC) el 03/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). 2012. Uno en el río Jerte, Plasencia (CC), el 23/02/12 (R. Montero). Uno en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 26/02/12 (J. C. Paniagua). Uno en Madrigalejo (CC) el 12/03/12 (G. Schreur). En Villanueva de la Vera, uno los días 13/03/12 y 30/03/12 (D. Langlois). Uno en la dehesa boyal de Ahigal (CC) el 07/04/12 (J. C. Paniagua). 2013. Uno en el paseo fluvial de Plasencia (CC) los días 20/03/13 (J. Sánchez), 22/03/13 (S. Mayordomo) y 30/03/13 (R. Montero). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 30/03/13 (D. Langlois). El 30/03/13, uno en Malpartida de Plasencia (CC) (H. Knecht) y otro en Alange (J. Guerra). 2014. Uno anillado en el río Gargáligas, Rena (BA), el 23/02/14 (GIA Extremadura). Uno en Palazuelo (BA) el 18/03/14 (A. Davies y R. Miller). Uno en el cordel de Navacebreda, Plasencia (CC) el 20/03/14 (S. Mayordomo). Uno en Moheda Alta (BA) el 21/03/14 (M. Kelsey).

- **Época postnupcial.**

2009. Uno en el puerto de Tornavacas (CC) el 25/07/09 (D. Langlois y S. Langlois). Uno en Casas de Belvís (CC) el 22/08/09 (J. Briz). Uno en Valcorchero, Plasencia (CC) el 23/09/09 (S. Mayordomo). 2 en Valdesalor (CC) el 10/10/09 (C. Fernández).

2010. En Plasencia (CC) 2 el 06/09/10 (R. Montero) y uno en Piornal (CC) el 11/09/10 (E. Palacios).

2011. Uno en Tornavacas (CC) el 19/08/11 (B. Molina y J. Prieta). Uno en Ahigal (CC) el 07/09/11 y otro en Portaje (CC) el 16/09/11 (S. Mayordomo). El 18/09/11, uno en Belvís de Monroy (CC) (J. Briz) y otro en Valdesalor (CC) (S. Mayordomo). El 21/09/11, 2 en Guijo de Granadilla (CC) y uno en Oliva de Plasencia (CC) (J. Prieta y S. Mayordomo). Uno en la Sierra de San Pedro (BA) el 25/09/11 (J. Gordillo). Uno en Plasencia los días 27/09/11, 29/09/11 (R. Montero), 02/10/11 y 22/10/11 (J. Prieta). Uno en Torrecillas de la Tiesa (CC) el 05/10/11 (J. Muddeman).

2012. En Galisteo (CC), uno los días 04/09/12 y 24/09/12 (S. Mayordomo). Uno en Piornal (CC) el 13/09/12 (J. Prieta). En Plasencia (CC), 2 el 14/09/12 y 16/09/12 (R. Montero), y uno el 22/09/12 (J. Prieta). En el Azud del Guadiana, Badajoz, uno el 14/09/12 (A. Fernández) y otro el 30/09/12 (J. C. Paniagua y Á. T. Mejías). Uno en Ventaquemada, Guijo de Granadilla (CC), el 20/09/12 y otro en Torrejoncillo (CC) el 25/09/12 (S. Mayordomo). En el paseo fluvial del río Jerte en Plasencia (CC), 2 el 02/10/12 (S. Mayordomo) y uno los días 10/10/12 (J. Prieta), 11/10/12 (S. Mayordomo) y 31/10/12 (R. Montero). Uno en el embalse de Arrocampo (CC) el 21/10/12 (M. Gálvez y J. Guerra). Uno en el río Guadiana en Badajoz el 28/10/12 (E. Costillo).

2013. En el río Gargáligas, Rena (BA), uno el 21/07/13 y el 17/08/13 (GIA-Extremadura). Uno en La Isla, Plasencia (CC), el 25/08/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Piornal (CC) el 28/08/13 (J. Prieta). Uno en el río Guadiana, Medellín (BA), el 09/09/13 (F. Yuste). Uno anillado en sierra de La Mosca, Cáceres, el 23/09/13 (GIA Extremadura). Uno en Plasencia (CC) el 17/10/13 y otro en El Batán (CC) el 27/10/13 (R. Montero). En Salvatierra de los Barros (BA), uno los días 27/10/13 y 28/10/13 (F. Montaña).

2014. Uno en Piornal (CC) el 19/08/14 (J. Prieta). Uno en La Lapa (BA) el 31/08/14 (F. Montaña). Uno en Plasencia (CC) el 04/09/14 (S. Mayordomo), el 09/09/14 (C. Bradley, D. Bradley y R. Montero) y el 06/10/14 (S. Mayordomo). Uno en Casas del Castañar (CC) el 10/09/14 (J. Prieta). 2 en el río Gargáligas, Rena (BA), el 13/09/14 (GIA-Extremadura). Uno en Alcollarín (CC) el 21/09/14 (W. Haworth). Uno en El Batán (CC) el 30/09/14 (R. Montero). Uno en Portaje (CC) el 30/09/14 (J. L. Bautista y S. Mayordomo). Uno en Pueblo Nuevo de Miramontes (CC) el 18/10/14 y el 25/10/14 (D. Langlois). Uno en Guadalupe (CC) el 25/10/14 (Á. Sánchez, Á. L. Sánchez y J. Sánchez).

Pito real (*Picus viridis*)

Estatus regional. Residente común (3.200 ejemplares en 2004-2006, <0'5% de España). Tendencia decreciente. Subespecie *P.v.sharpei*. En la lista de BirdLife adoptada por la Unión Europea aparece como *Picus sharpei* (Pito real ibérico).

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,4% y una reducción poblacional de -32% (SEO/BirdLife, 2013a).

Pico picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus regional. Residente común (18.000 ejemplares en 2004-2006, 2'6% de España). Tendencia creciente. Subespecie *D.m.hispanicus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,5% y un aumento poblacional de +39% (SEO/BirdLife, 2013a).

Pico menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus regional. Residente común (1.000-2.000 parejas, el 20% de España) con tendencia al aumento. Subespecie *D.m.buturlini*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “incremento fuerte” con un porcentaje medio de cambio anual de +13,4% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros: Cita urbana: una pareja en el Parque del Príncipe, Cáceres (CC), el 8/01/12 (J. J. Bote).

Alondra ricotí (*Chersophilus duponti*)

Estatus regional. Accidental, quizás hubiese alguna población reproductora en el pasado. Dos datos, uno anterior a 1995 (Trujillo) y otro de abril de 2004 (La Serena).

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Reproducción probable cerca de Trujillo antes de 1995 (Purroy 1997). Uno en Cabeza del Buey el 03/04/2004 (A. Gil).

Calandria común (*Melanocorypha calandria*)

Estatus regional. Residente muy abundante (1.850.000 ejemplares en 2004-2006, 22% de España) con tendencia estable, aunque con indicios de declive en invierno. Migración parcial y nomadeos post-reproductores. Subespecie *M.c calandria*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,1% y total de -4% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -6% y total de -25%; es decir, aparente declive (SEO/BirdLife, 2013b).

Terrera común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (400.000 ejemplares en 2004-2006, 15% de España). Tendencia estable. Subespecie *C.c.brachydactyla*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,2% y un aumento poblacional de +29% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Llegadas. Varias en Guijo de Coria (CC) el 23/03/09 (S. Mayordomo). 6 en La Pulgosa (CC) el 28/03/10 (T. Naturalist). El 30/03/11, una en Galisteo (CC) (S. Mayordomo), 6 en Zorita (CC) y 2 en Palazuelo (BA) (M. Kelsey). Decenas en Guijo de Coria (CC) el 02/04/12 (A. Pacheco). Presente en Valdecañas (CC) el 08/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). 11 en Llanos de Cáceres el 10/04/12 (S. Mayordomo). Varias entre Trujillo y Santa Marta de Magasca (CC) el 15/03/13 (J. L. Guisado y P. Goñi). 2 en Torremejía (BA) el 28/03/13 (M. Gálvez). 3 en Santiago del Campo (CC) el 21/03/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). 2 en Campo Lugar (CC) el 22/03/14 (A. Calvo) y una el 28/03/14 (M. Kelsey).
- Últimos registros. 2 en Galisteo (CC) el 04/10/09 (S. Mayordomo). 4 en Santa Amalia (BA) el 03/10/11 (J. Muddeman). Una en Campo Lugar (CC) el 05/10/13 (J. Muddeman). 2 en La Aldea del Obispo (CC) el 23/09/14 (N. Renwick).

Terrera marismeña (*Calandrella rufescens*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros en Santa Amalia (1977) y en Madrigalejo (2003). Subespecie *C.r.apetzii*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Una en Santa Amalia en julio 1977 (A. Aguilar). 5 en Madrigalejo el 23/02/03 (A. Howes).

Cogujada común (*Galerida cristata*)

Estatus regional. Residente muy abundante (5.750.000 ejemplares en 2004-2006, 18% de España). Tercera especie más numerosa. Tendencia estable, aunque con indicios de declive en invierno. Subespecie *G.c.pallida*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,6% y total de -1,9% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -4,2% y total de -18%; es decir, aparente declive (SEO/BirdLife, 2013b).

Cogujada montesina (*Galerida tecklae*)

Estatus regional. Residente abundante (¿230.000? ejemplares en 2004-2006, 6% de España). Tendencia al aumento tanto en primavera como en invierno. Subespecie *G.t.tecklae*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4,9% y un aumento poblacional de +86% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +6% y total de +18%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b). No sé sabe hasta que punto el aumento es real o debido a una mejor identificación.

Alondra totovía (*Lullula arborea*)

Estatus regional. Residente abundante (280.000 ejemplares en 2004-2006, 13% de España). Tendencia estable. Llegada moderada de invernantes, con tendencia estable o en ligero declive. Cría *L.a.pallida*, en invernada también *L.a.arborea*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,3% y un aumento poblacional de +17% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -3% y total de -5%; es decir, estable o el ligero declive (SEO/BirdLife, 2013b).

Alondra común (*Alauda arvensis*)

Estatus regional. Reproductora común (¿200-1.000? ejemplares en 2004-2006) con tendencia negativa. Invernada muy abundante (varios millones) con tendencia posiblemente estable. Cría la subespecie *A.a.sierrae*, en paso e invernada *A.a.arvensis*.

Criterio. Época de cría, fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,1% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el

periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1% y total de +3%; es decir, aparente estabilidad (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves migradoras e invernantes, la tendencia es “declive moderado” (-50%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).

- **Reproducción.** En el puerto de Tornavacas (CC), una el 25/07/09 (D. Langlois y S. Langlois) y 2 el 27/07/09 (F. Carrero); varias el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo); una el 23/05/13 (M. Gálvez), 2 el 15/06/13 (E. Palacios y S. Mayordomo) y está presente el 26/06/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Una en Garganta la Olla (CC) el 02/05/11 (E. Palacios, F. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo). Una en los llanos del Convento, Pinofranqueado (CC), el 07/05/11 (Alberto Pacheco). Una en Piornal (CC) el 10/05/13 (S. Mayordomo). 14 en La Panera, Cabezuela del Valle (CC), el 22/05/13 (I. Solana, J. Prieta y S. Mayordomo). 2 en el pico Valdeamor, Cabezuela del Valle (CC), el 23/06/13 (J. Prieta). Presente en La Serrá, Tornavacas (CC), el 23/05/14 (I. Solana) y el 08/06/14 (P. Gargantilla, J. Prieta e I. Solana). 21 en Castilfrío, Tornavacas (CC), el 21/06/14 (J. Prieta).
- **Llegadas.** Varias en Guijo de Coria (CC) el 14/10/09 (J. Prieta). En Galisteo (CC), 8 el 15/10/09 y una el 28/09/10 (J. Prieta). 2 en La Aldea del Obispo (CC) el 02/10/11 (J. Muddeman). Una en Santa Amalia (BA) el 09/10/11 (F. Yuste). 5 en Galisteo (CC) el 10/10/11 (E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo). 3 en Portaje (CC) el 20/09/12 (S. Mayordomo). Una en El Batán (CC) el 30/09/13 (R. Montero). 4 en Brovales (BA) el 22/09/14 y otras 4 en Zafra (BA) el 24/09/14 (F. Montaña). 3 en Trujillo (CC) el 03/10/14 (J. Porras).
- **Últimos registros.** 3 en Trujillo (CC) el 28/03/10 (T. Naturalist). 2 en Trujillo (CC) el 11/03/12 (G. Schreur) y 5 en Santiago del Campo (CC) el 16/03/12 (S. Mayordomo). 2 en Arrocampo (CC) el 04/04/12 (S. Mayordomo y J. L. Guisado). Varias en Cabeza del Buey (BA) el 20/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez).

Avión zapador (*Riparia riparia*)

Estatus regional. Reproductor estival común (6.000-12.000 parejas en 2003-2004). Tendencia incierta debido a las grandes fluctuaciones. Frecuente en paso. Subespecie *R.r. riparia*.

Criterio. Colonias, fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1% y total de -80% (SEO/BirdLife, 2013a).

- Registros en enero. Uno entre aviones comunes y golondrinas en Arrocampo (CC) el 18/01/09 (J. Briz). Uno en Trujillo (CC) a principios de enero de 2011 (J. Rokkanen).
- Llegadas. 2 en Talaván (CC) el 26/02/09 (S. Mayordomo). Varios en Arrocampo (CC) el 26/02/10 (J. Muddeman). 3 en Los Canchales (BA) el 06/02/11 (S. Mayordomo y T. Álvarez). Uno en Malpartida de Plasencia (CC), el 21/02/12 (S. Mayordomo y J. Prieta), en Casatejada (CC) el 24/02/12 (S. Mayordomo), y en Arrocampo (CC) el 26/02/12 (M. Llorente y Á. Díaz), donde hay varios el 27/02/12 (R. Montero). En la gravera El Soto, Valverde de Mérida (BA), 5 el 24/02/13 (M. Gálvez) y es abundante el 28/02/13 (J. Solana, M. García Soria y S. Pérez). 2 en el río Gadiana en Mérida (BA) el 25/02/13 (J. Solana). Uno en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 14/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y más de 10 el 03/03/14 (M. Gálvez).
- Últimos registros. 3 en Arrocampo (CC) el 06/10/11 (J. Muddeman). En la laguna de Galisteo (CC), un grupo mixto con golondrinas el 07/10/13 (C. Martín, J. Prieta y M. Á. Muñoz) y otro grupo el 16/10/13 (S. Mayordomo). 2 en La Zarza (BA) el 04/11/14 (M. Gálvez).
- Otros registros. Colonia con 800 nidos en la gravera Viñuelas, Galisteo (CC), en 2014 (J. Prieta). 2.000 en la laguna de Galisteo (CC) el 28/09/10 (J. Prieta). Más de 6.000 en el Puente de Palmas, Badajoz, el 30/08/11 (J. C. Paniagua).

Avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus regional. Residente común (¿20.000? parejas) con migración parcial en latitud y altitud. Tendencia incierta. Monotípica.

Criterio. Dormideros (>100) y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,7% y total de -13% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “declive fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de -19% y total de -45% (SEO/BirdLife, 2013b).

Golondrina común (*Hirundo rustica*)

Estatus regional. Reproductor estival muy abundante (3.800.000 ejemplares en 2004-2006, 13% de España) con tendencia negativa. Cuarta especie de ave más numerosa. Migrador común. Invernada muy escasa (¿25-100? ejemplares). Se aprecia un adelanto en la llegada prenupcial. Subespecie *H.r.rustica*.

Criterio. Invierno, fechas extremas y de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,3% y un aumento poblacional de -30% (SEO/BirdLife, 2013a). Según el programa SACIN, en el periodo 2008-2013 se detecta un porcentaje medio de cambio anual de +16% y total de +51% (SEO/BirdLife, 2013b) más relacionado con el adelanto en las fechas de llegada que con invernada en sentido estricto.
- Registros en noviembre y diciembre. Una en Mérida (BA) el 19/12/11 (J. Solana). Una en el Lancho, Arroyo de la Luz (CC), el 03/12/12 (R. Parra). En Barquilla de Pinares (CC), una el 30/12/12 (J. Briz) y otra el 02/11/13 (V. Beltrán). Una en Alange (BA) el 04/11/13 y el 12/11/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 11/11/13 (J. Guerra, M. Gálvez y S. Mayordomo). Una en Villar de Rena (BA) el 15/11/13 (J. P. Prieto y W. Haworth). Una en Sierra Brava (CC) el 24/11/13 (J. Guerra, M. Gálvez, M. Á. López y N. Tarrasón). Una en Plasencia (CC) el 13/11/14 (S. Mayordomo). 3 en Saucedilla (CC) el 26/11/14 (J. Porras). Una en Acehúche (CC) el 18/12/14 (M. Rodríguez).
- Llegadas. Una Galisteo (CC) el 04/01/09 (S. Mayordomo). 12 en Jerez de los Caballeros (BA) el 07/01/09 (F. Yuste). Una en Arroyo de la Luz (CC) el 10/01/09 (R. Parra). 3 en Arrocampo (CC) el 01/01/10 (M. Kelsey). Una en el embalse de Nogales (CC) el 05/01/10 (A. Maestre y C. Luengo). Una en Galisteo (CC) el 06/01/10 (J. Julián y S. Mayordomo). Una en Alange (BA) el 06/01/11 (Á. Sánchez). Una en Brovales (BA) el 15/01/11 (A. Núñez). 4 en Los Canchales (BA) el 23/01/11 (G. Schreur). Una en Sierra Brava (CC) (M. Rodríguez) y en Badajoz capital (J. C. Paniagua) el 25/01/11. 10 en Coria (CC) el 26/01/11 (J. Prieta). Una en Talayuela (CC) el 15/01/12 (V. Risco y J. Briz). El 22/01/12, varias en Los Canchales (BA) (E. Costillo) y una en Pago de San Clemente (CC) (M. Kelsey). Una en Arrocampo (CC) el 13/01/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo). Una en Alburquerque (BA) el 16/01/13 (G. Schreur). El 20/01/13, 3 en Serrejón (CC) (M. García del Rey) y una en Mérida (BA) (J. Solana). 4 en Alange (BA) el 04/01/14 (F. Macías) y una el 14/01/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Una en Trujillo (CC) el 14/01/14 (N. Renwick).
- Últimos registros. 2 en Plasencia (CC) el 19/10/09 (S. Mayordomo). 2 en Torrequemada (CC) el 30/09/11 (S. Mayordomo). El 13/10/12, 2 en Valdefuentes, Galisteo (CC), (S. Mayordomo) y presente en Hornachos (M. Gálvez y J. Guerra). Una en Rincón de Ballesteros (CC) el 25/10/13 (F. Martín). Una en Guijo de Granadilla (CC) el 26/10/13 (S. Mayordomo). Una en Pallares (BA) el 27/10/13 (F. Crystal). En Trujillo (CC), una el 31/10/13 y el 23/10/14, y otra en Monfragüe el 29/10/14

(M. Kelsey). Una en Alange (BA) el 29/10/14 (M. Gálvez).

- Otros registros. 2 albinas en Arrocampo (CC) el 07/05/12 (R. Cabo). Dormidero pre-migratorio en la gravera de Valdefuentes, Galisteo (CC), con miles a lo largo de agosto de 2012 y un máximo estimado de 25.000 el 23/08/12 (J. Prieta y S. Mayordomo).

Golondrina dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (425.000 ejemplares en 2004-2006, el 12% de España). Tendencia al aumento. Invernada esporádica. Subespecie *H.d.rufula*.

Criterio. Invierno, fechas extremas y de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1% y un aumento poblacional de +58% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros invernales. Una en Monfragüe (CC) el 24/12/10 (C. Mills). Una en Arrocampo (CC) el 11/11/11 (J. Guerra y M. Gálvez). 4 en La Tajadilla, Monfragüe (CC) el 13/11/11. En la Plaza Mayor de Trujillo (CC), 20 el 14/11/11, 7 el 23/11/11 y una los días 28/11/11, 01/12/11 (M. Kelsey) y 18/02/12 (M. Kelsey y G. Schreur). Una en Plasencia (CC) los días 02/11/12 y 16/11/12 (R. Montero). Una en la Plaza Mayor de Trujillo (CC) el 07/11/12 (M. Kelsey). Una en Alange (BA) el 21/12/12 y el 21/01/13 (M. Gálvez y J. Guerra). 2 en Aliseda (CC) el 26/01/13 (R. Parra). 10 en Navalmodal de la Mata (CC) el 08/11/13 (J. Briz). 11 en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC) el 11/11/13 (J. Guerra, M. Gálvez y S. Mayordomo). En Alange (BA), una el 12/11/13, 5 el 02/11/14, 6 el 08/11/14 (J. Guerra y M. Gálvez), una el 28/11/14 (J. Solana) y una el 31/12/14 (A. M. Sánchez). El 05/11/14, una en Monfragüe (CC) y 2 en Trujillo (CC) (M. Kelsey). Una en Mérida (BA) el 07/11/14 (F. Montaña y S. Mayordomo). 8 en La Zarza (BA) el 11/11/14 (J. Guerra). Varias en Riobobos (CC) el 29/11/14 (M. Á. Muñoz). Una en Cerro Alto, Saucedilla (CC), el 08/12/14 (S. Mayordomo). 2 en Portanchito, Cáceres, el 29/12/14 (J. Solana).
- Registros de interés. 3 pollos no voladeros alimentados por adultos en Orellana (BA) el 21/10/10 (Á. Sánchez).
- Llegadas. Una en Badajoz el 15/02/09 (J. C. Paniagua). Varias en Monfragüe (CC) el 22/02/09 (J. Porras). 3 en Plasencia (CC) el 13/02/10 (J. Prieta). 2 en Trujillo (CC) el 04/02/11 (R. Cabo). Una en Monfragüe (CC) el 7/02/11 (G. Schreur y R. Montero). Una en Torrejón el Rubio (CC) el 01/03/12 (G. Schreur). Una en Monfragüe (CC) el 04/03/12 (S.

Mayordomo). 2 en Montánchez (CC) el 13/03/12 (M. Kelsey). Una en Alange (BA) el 25/02/14 (J. Guerra). Una en Monfragüe (CC) el 28/02/14 (E. Charles e Ivana).

- **Últimos registros.** Una entrando a un nido en La Vera (CC) el 19/10/09 (P. Gómez). 5 en la plaza Mayor de Trujillo (CC) el 30/10/10 (S. Mayordomo, J. Prieta, E. Palacio, M. A. Muñoz). Una en Santa Amalia (BA) el 21/10/12 (F. Yuste). El 23/10/12, una en Pago de San Clemente (CC) y 2 en la Plaza Mayor de Trujillo (CC) (M. Kelsey). 3 en Trujillo (CC) el 31/10/13 (M. Kelsey). Una en Los Arenales (CC) el 29/10/14 (J. Gutiérrez del Sol). 2 en Viandar de la Vera (CC) el 29/10/14 y el 30/10/14 (D. Langlois).

Avión común (*Delichon urbicum*)

Estatus regional. Reproductor estival muy abundante (1.200.000 ejemplares en 2004-2006, 14% de España) con tendencia estable. Invernada muy escasa (¿50-200? ejemplares). Migrante numeroso con tendencia decreciente. Subespecie *D.u.urbicum*.

Criterio. Invierno, fechas extremas y de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,1% y un aumento poblacional de +4% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Registros en diciembre.** Uno en Montehermoso (CC) el 07/12/11 (J. Mahillo). Entre 1 y 3 en Alange (BA) durante todo diciembre de 2012 (J. Solana y J. Guerra). 5 en el Castillo de Benquerencia de la Serena (BA) el 10/12/12 (J. Muddeman). 2 en La Codosera (BA) el 31/12/12 (G. Schreur). Presencia regular de al menos 3 en Alange (BA) durante todo noviembre de 2013 y el 15/12/13 (J. Solana, J. Guerra y M. Gálvez). 5 en Badajoz capital el 26/12/13 (A. Fernández). 2 en Plasencia (CC) el 08/12/14 (J. Prieta) Varios en Alange durante diciembre de 2014 (M. Gálvez y J. Guerra).
- **Llegadas.** Los registros de enero pueden corresponder tanto a aves invernantes como a llegadas tempranas. 2 en el embalse de Alcántara (CC) el 30/01/09 (J. Prieta y S. Mayordomo). Uno en Arrocampo (CC) el 01/01/10 (M. Kelsey). 5 en Mérida (BA) el 08/01/10 (J. Solana). El 04/01/11, varios en Plasencia (CC) (M. Á. Muñoz y X. Piñeiro) y 4 en Alange (BA) (J. Solana). 5 en Trujillo (CC) el 9/01/11 (J. Porras). Presencia en Navalmoral de la Mata (CC) (J. Briz) y Coria (CC) (J. Prieta) el 11/01/11. 3 junto a aviones roqueros en La Zarza (BA) el 10/01/12 (J. Solana). 2 en La Codosera (BA) el 19/01/12 (G. Schreur). El

28/01/12, varios en Navalmoral de la Mata (CC) (J. Briz). En Alange (BA), 2 el 03/01/13 (J. Guerra y M. Martínez) y 5 el 09/01/13 (J. Solana, J. Guerra y M. Gálvez). 2 en Mérida (BA) el 10/01/13 (S. Pérez). Uno en Mérida (BA) el 03/01/14, 3 el 05/01/14 (J. Solana) y 2 el 09/01/14 (A. Calvo). 3 en La Codosera (BA) (P. Schreur) y presentes en Villanueva de la Serena (BA) (J. P. Prieto) el 09/01/14. Presentes en Alange (BA) durante todo enero de 2014 (M. Gálvez y J. Guerra).

- Últimos registros. 2 en Portaje (CC) el 09/10/09 (S. Mayordomo). 9 en La Codosera (BA) el 24/10/10 (G. Schreur). 5 en Plasencia (CC) el 11/11/10 (E. Palacios y S. Mayordomo) y el 12/11/10 (M. García del Rey). Uno con aviones roqueros en La Tajadilla, Monfragüe (CC), el 13/11/11 (M. Kelsey). 2 en Mérida (BA) el 14/11/11 (Á. Sánchez). Uno en la charca del Judío, Plasencia (CC), el 18/11/11 (J. Prieta). 8 en el puente del ferrocarril en La Zarza (BA) el 10/11/12. Uno en Alange (BA) los días 14/11/12 y 22/11/12 (J. Solana). Uno en Olivenza (BA) el 17/11/13 (A. Domínguez). 16 en la ciudad de Badajoz el 14/11/14 (J. Mazón y Á. T. Mejías). 2 en Plasencia (CC) el 24/11/14 (J. L. Bautista).

Bisbita de Richard (*Anthus richardi*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Valdehornillos en 1977.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Dos ejemplares en Valdehornillos en febrero de 1977 (A. Aguilar).

Bisbita campestre (*Anthus campestris*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (135 parejas estimadas en 2014) y localizado en alta montaña con tendencia desconocida, quizás negativa. Más frecuente y extendido en paso. Subespecie *A.c.campestris*.

Criterio. Todas las observaciones en época de cría, fenología en migración.

- Población reproductora. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Ortega *et al.* 2014). Con los resultados obtenidos se confirma la presencia de al menos tres poblaciones reproductoras: Sierra de Gredos cacereña (100 parejas estimadas), Las Hurdes (25) y Sierra de Gata (10). Dada la ausencia de datos previos no fue posible establecer tendencia alguna, pero se ha constatado la desaparición de pequeños núcleos en Gredos a menor altitud, tal vez a consecuencia del cambio climático.
- Época de cría. En el Puerto de Esperabán, Pinofranqueado (CC), uno el 24/07/11 (E. Palacios y S. Mayordomo); 2 los días 12/06/12 y 25/06/12, y

3 el 07/07/12 (A. Pacheco); una pareja el 15/06/13 (A. Pacheco); uno el 13/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 2 parejas el 27/06/14 (A. Pacheco). 7 en la apretura de Majá Robledo, Casares de Hurdes (CC), el 27/06/13 (A. Pacheco). Uno en la Panera, Aldeanueva de la Vera (CC), el 07/04/14 (A. Gil) y el 01/06/14 (J. Prieta). En Tornavacas (CC): una pareja en la Garganta de la Serrá (CC) el 08/06/14 (J. Prieta e I. Solana), uno en Castilfrío el 21/06/14 (J. Prieta) y un adulto y un joven en Cuerda Llana el 19/08/14 (GIA-Extremadura).

- Año 2009. Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 10/09/09 (M. Kelsey).
- Año 2010. Varias aves en Acedera, Orellana, Mérida, Los Canchales y La Serena (BA) entre el 21/09/10 y el 27/09/10 (Á. Sánchez).
- Año 2011. En Llanos de Cáceres, uno los días 25/08/11 y 30/08/11 (S. Mayordomo). 2 en Guijo de Coria (CC) el 29/08/11 (J. Prieta). 4 en San Vicente de Alcántara (BA) el 05/09/11 (J. Gordillo). En Torreorgaz (CC), 6 el 26/09/11 y 3 el 28/09/11, y 2 en Torremocha (CC) el 26/09/11 (S. Mayordomo). En Trujillo (CC), 2 el 03/10/11, 4 el 05/10/11 y uno el 07/10/11 (J. Muddeman).
- Año 2012. Uno en La Aldea del Obispo (CC) el 30/03/12 (M. Kelsey). Uno en La Serena (BA) el 15/04/12 (S. Villa). Uno en Cáceres el 30/04/12 (S. Mayordomo). Uno en Santiago del Campo (CC) el 05/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Torrequemada (CC) el 09/05/12 y otro en Torremocha (CC) el 11/05/12 (S. Mayordomo). Uno en Gabriel y Galán (CC) el 27/08/12 (A. Pacheco). En Portaje (CC), 5 el 01/09/12 (J. Prieta) y 8 el 04/09/12 (S. Mayordomo). Uno en Cerezo (CC) el 03/09/12 (A. Pacheco). En Guijo de Coria (CC); 2 los días 14/09/12 (J. Prieta) y 19/09/12 (J. Mahillo y C. Clemente). Uno en La Anguila, Serrejón (CC), el 16/09/12 (S. Mayordomo, J. L. Guisado y M. García del Rey).
- Año 2013. Uno en Trujillo (CC) el 06/04/13 (S. West). Uno en Zorita (CC) el 08/04/13 y otro en Trujillo (CC) el 09/04/13 (M. Kelsey). Uno en Hinojal el 11/04/13 (J. Prieta). Uno en Montehermoso (CC) el 22/04/13 y el 24/04/13 uno en Guijo de Coria (CC) y 2 en Calzadilla (CC) (C. Clemente y J. Mahillo). 2 en Guareña (BA) el 25/04/13 (M. Gálvez). Uno en Vegas Altas (BA) el 27/04/13 (M. Kelsey). 5 en Alange (BA) el 30/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Torremocha (CC) el 12/09/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). En los Llanos de Cáceres, 7 el 13/09/13 y 4 el 25/09/13 (GIA Extremadura). El 05/10/13, uno en Campo Lugar (CC) (J. Muddeman) y 4 en Don Álvaro (BA) (F. Crystal).
- Año 2014. Uno en Vallunosa, Mérida (BA), el 03/04/14 (Á. Sánchez). 3 en Medina de las Torres (BA) el 05/04/14 (F. Montaña) y 5 el 09/04/14 (J. A. Delgado y F. Montaña). Uno en Villalba de los Barros (BA) el

07/04/14 (J. Guerra). Uno en Villa del Rey (CC) el 08/05/14 (S. Mayordomo). Uno en Belén, Trujillo (CC), el 10/05/14 (N. Baeza, J. Cerezo y J. Á. Herrera). Uno en Jaraicejo (CC) el 16/05/14 (M. Kelsey). Uno en Almendralejo (BA) el 20/06/14 (J. G. Aparicio). 2 en La Aldea del Obispo (CC) el 12/09/14 y el 13/09/14 (N. Renwick). Uno en Villalba de los Barros (BA) el 15/09/14 (V. de Alba y A. Núñez). Uno en Campanario (BA) el 21/09/14 (J. P. Prieto). 5 en Trujillo (CC) el 23/09/14 (M. Kelsey). Uno en Campo Lugar (CC) el 24/09/14 (M. Kelsey). Uno en Torremejía (BA) el 24/09/14 (J. Guerra). 4 en Zafra (BA) el 24/09/14 y uno el 28/09/14 (F. Montaña). Uno en Hinojal (CC) el 25/09/14 (R. Montero). 2 en Guijo de Coria (CC) el 27/09/14 (J. Prieta). Uno en los Llanos de Cáceres el 27/09/14 (J. Muddeman).

Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus regional. Reproductor probable sin confirmar (¿0-25? parejas, <0% de España). Migrante común en paso postnupcial y raro en prenupcial, con tendencia decreciente. Subespecie *A.t.trivialis*.

Criterio. Todas las observaciones en época de cría, fenología en migración.

- **Tendencia.** En Europa, origen de las aves migradoras, la tendencia es “declive moderado” (-60%) en el periodo 1980-2012, en especial en el tramo 1980-1995 (PECBMS, 2015).
- **Registros en época de cría.** Un macho territorial cantando en la Dehesa de Abajo, Tornavacas (CC), el 10/05/11 (J. Prieta). Uno en el pinar de Casas del Monte (CC) el 27/06/13 (J. Prieta y S. Mayordomo).
- **Paso prenupcial.** Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 25/03/10 (D. Langlois). Uno en Campo Lugar (CC) el 29/03/10 (T. Naturalist). Uno en Trujillo (CC) el 24/03/11 (J. Muddeman). 2 en el paseo fluvial de Plasencia (CC) el 07/04/13 (R. Montero). Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 12/04/13 (J. Muddeman). En Navacebrea, Plasencia (CC), 2 el 14/04/13 (E. Palacios, J. Prieta, M. Á. Muñoz, F. Ramírez y S. Mayordomo) y uno los días 17/04/13 y 29/04/13 (S. Mayordomo). 2 en La Zarza (BA) el 19/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). 2 en Arrocampo (CC) el 24/04/13 (J. Muddeman). Uno en Alange (BA), el 02/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Plasencia (CC) el 20/03/14 (J. L. Bautista) y otro el 02/04/14 (S. Mayordomo). 2 en Arrocampo (CC) el 27/03/14 (M. Kelsey). 4 en Navacebrea, Plasencia (CC), (S. Mayordomo) y otro en Entrín Bajo (BA) (J. Guerra) el 03/04/14.
- **Paso postnupcial.** 2 en la cola del embalse del Jerte (CC) el 28/08/09 (J. Prieta). Uno en Monfragüe (CC) el 13/09/09 (S. Mayordomo). Más de 20 en el embalse del Jerte (CC) el 16/09/10 (J. Prieta). Uno en Villanueva de

la Vera (CC) el 17/09/10 (D. Langlois). En Piornal (CC), uno el 10/08/11 y varios el 17/08/11 (J. Prieta). 2 el 13/09/11 y 4 el 28/09/11 en Casas del Castañar (CC) (J. Prieta). Uno en Santa Amalia (BA) el 16/09/11, uno en Botoa (BA) el 20/09/11 y otro en Albuquerque (BA) (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Santa Amalia (BA) el 03/10/11 (J. Muddeman). En el embalse del Jerte (CC) 6 el 29/08/12, 2 el 11/09/12 (S. Mayordomo y E. Palacios), 4 el 19/09/12 y uno el 01/10/12 (J. Prieta). 2 en Piornal (CC) el 30/08/12 (J. Prieta). 3 en Piornal (CC) el 28/08/13, 2 en el puerto de Tornavacas (CC) el 18/09/13 y 5 en Piornal (CC) el 20/09/13 (J. Prieta). Uno en La Albuera (BA) el 21/09/13 (J. C. Paniagua). 7 en el embalse del Jerte (CC) el 24/09/13 (J. Prieta). Uno en Galisteo (CC) el 06/10/13 (S. Mayordomo). En olivares de Montehermoso (CC), uno los días 07/10/13 y 09/10/13 (C. Clemente). Uno en el embalse del Jerte (CC) el 27/08/14, en el puerto de Tornavacas (CC) el 30/08/14 y en Plasencia (CC) el 31/08/14 (J. Prieta). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 01/09/14 (D. Langlois). Uno en Alange (BA) el 01/09/14 (J. Guerra) y el 07/09/14 (M. Gálvez). Varios en Piornal (CC) el 02/09/14 (J. Prieta). Uno en Los Canchales (BA) el 03/09/14 (J. Guerra) y el 04/09/14 (M. Gálvez). Uno en Almendralejo (BA) el 08/09/14 (F. Macías). Uno en Esparragalejo (BA) el 21/09/14 (L. Alcántara). Uno en el embalse del Jerte (CC) el 02/10/14 (J. Prieta).

Bisbita pratense (*Anthus pratensis*)

Estatus regional. Invernante muy abundante (varios millones) con tendencia al aumento. Subespecies *A.p.pratensis* y *A.p.whistleri* (Irlanda y Escocia).

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +9% y total de +36% (SEO/BirdLife, 2013b). Este dato contrasta con los obtenidos en el conjunto de Europa, origen de las aves invernantes, con “declive moderado” (-70%) en el periodo 1980-2012, en especial a partir de 1995 (PECBMS, 2015).
- **Llegadas.** Decenas en Guijo de Coria (CC) el 14/10/09 (J. Prieta). En Galisteo (CC), 10 el 15/10/09 y 4 el 26/09/10 (S. Mayordomo). En el embalse del Jerte (CC), decenas el 29/09/10 y 3 el 28/09/11 (J. Prieta). Uno en Campo Lugar (CC) el 15/09/12 (A. Calvo). Uno en Galisteo los días 16/09/12 (C. Clemente) y 18/09/12 (S. Mayordomo). Uno en el embalse del Jerte (CC) el 24/09/13 (J. Prieta). Uno en Trujillo (CC) el 23/09/14 y otro en Campo Lugar (CC) el 24/09/14 (M. Kelsey). Varios en Guijo de Coria (CC) el 27/09/14 (J. Prieta) y 2 en Llanos de Cáceres (J. Muddeman).

- Últimos registros. Uno en Plasencia (CC) el 08/04/09 (S. Mayordomo). Varios en Guijo de Coria (CC) el 07/04/10 (J. Prieta). 2 en Arroyomolinos de la Vera (CC) el 09/04/10 (S. Mayordomo). 5 en Arrocampo (CC) el 7/04/11 (J. Prieta). 6 en Belén, Trujillo (CC), el 8/04/11 y 3 en Torreorgaz (CC) el 14/04/11 (S. Mayordomo). 2 en Plasencia (CC) el 15/04/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez y E. Palacios). 5 en Torrequemada (CC) el 17/04/12 y 2 en Torreorgaz (CC) el 18/04/12 (S. Mayordomo). 2 en Guareña (BA) el 14/04/13 (A. Núñez, F. Castro, F. Lopo, J. Solana, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Pérez y V. de Alba). Uno en Alange (BA) el 20/04/13 (L. Alcántara). Uno en Vegas Altas (BA) el 27/04/13 (M. Kelsey). Uno en Palazuelo (BA) el 10/04/14 (J. Muddeman, D. Tyldesley y D. Tyldesley). 3 en Saucedilla (CC) el 23/04/14 (H. Sánchez) y varios el 24/04/14 (J. Briz).

Bisbita gorgirrojo (*Anthus cervinus*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Guareña en abril de 2014.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro para Extremadura. En Guareña (BA) se observa uno los días 25/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y 27/04/13 (E. Charles, E. Palacios, F. Montaña, I. Flecha, J. G. Aparicio, J. Guerra, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Mayordomo y V. Resa).

Bisbita alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso (50-200 parejas en 2014) con tendencia estable. Migrante frecuente. Invernante común (¿5.000-20.000? ejemplares) con tendencia negativa. Subespecie *A.s.spinoletta*.

Criterio. Observaciones de cría, fenología y de interés.

- Población reproductora. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Ortega *et al.* 2014). Con los resultados obtenidos se confirma la presencia solamente en Gredos, con una población estimada en 300 individuos con un alto grado de incertidumbre. Se distribuye de modo disperso por turberas y cabecera de gargantas, con una población de más de 50 parejas en la garganta de La Serrá, Tornavacas.
- Tendencia. Desconocida en época reproductora. En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en España en el periodo 2008-2013 es “declive fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de -24% y total de -67% (SEO/BirdLife, 2013b).

- Época de cría. 2 nupciales en Piornal (CC) el 05/04/11 (J. Prieta). Uno en la Panera, Aldeanueva de la Vera (CC), el 07/04/14 (A. Gil). 21 territorios detectados y más de 50 parejas estimadas en la Garganta de la Serrá, Tornavacas (CC), el 08/06/14 (J. Prieta e I. Solana). 4 machos en Castilfrío y en la garganta de San Martín, Tornavacas (CC), el 21/06/14 (J. Prieta).
- Últimos registros de invernantes. Uno en Galisteo (CC) el 03/04/09 (S. Mayordomo). Uno en Santibáñez el Alto (CC) el 07/04/10 (J. Prieta). Uno en Galisteo (CC) el 16/04/10 (S. Mayordomo). Uno en Saucedilla (CC) el 07/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Galisteo (CC) el 13/04/12 (S. Mayordomo). En Riobobos (CC), 30 el 30/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo) y 5 el 02/04/13 (J. Prieta). Uno en El Batán (CC) el 02/04/13 (J. Prieta). Uno en Arrocampo (CC) el 07/04/14 (J. Muddeman)
- Llegadas de invernantes. 6 en Galisteo (CC) el 13/10/10 (J. Prieta). El 06/10/11, varios en Santa Amalia (BA) (Á. Sánchez) y 8 en el embalse del Jerte (CC) (J. Prieta). Uno en Palazuelo (BA) el 07/10/11 (J. Muddeman). Uno en el embalse del Jerte (CC) el 10/10/12 (J. Prieta). 5 en Galisteo (CC) el 16/10/12 (S. Mayordomo) y 35 el 29/10/12 (J. Prieta). Presente en Los Canchales (BA) el 20/10/12 (E. del Viejo y A. Cangas). 6 en las Vegas Altas (BA/CC) el 05/10/13 (J. Muddeman). 2 en el embalse del Jerte (CC) el 07/10/13 (J. Prieta). 2 en Galisteo (CC) el 18/10/13 (S. Mayordomo). Varios en el embalse del Jerte (CC) el 13/10/14 (J. Prieta). Varios en Vegas Altas (BA) el 25/10/14 (F. Martínez, Á. Sánchez, Á. L. Sánchez y J. Sánchez).

Lavandera boyera (*Motacilla flava*)

Estatus regional. Reproductora estival escasa (¿50-150? parejas, <0'1% de España) con tendencia al aumento. Escasa en paso prenupcial y abundante en paso postnupcial. Cría la subespecie *M.f.iberiae* y en las migraciones domina la subespecie *M.f.flava*, pero también se ven por orden de importancia: *M.f.flavissima*, *M.f.thumbergi* y *M.f.feldegg*. Invernada esporádica.

Criterio. Observaciones de cría e invernada, fenología. La raza *feldegg* se considera rareza.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +7,7% y un aumento poblacional de +168% (SEO/BirdLife, 2013a). En Europa, origen de las aves migradoras, la tendencia es “declive moderado” (-50%) en el

periodo 1980-2012, aunque se mantiene estable a partir de 1990 (PECBMS, 2015).

- Reproducción en Vegas Altas. 2 jóvenes en Casas de Hitos (BA-CC) el 02/06/14 y un joven en Palazuelo (BA) el 26/06/14 (M. Kelsey).
- Registros en diciembre-enero. Una en Arrocampo (CC) el 14/01/13 (J. Muddeman). Una en el río Guadalupejo, Alía (CC), el 12/12/14 (J. Á. Herrera). Una en Valdecañas (CC) el 24/12/14 (S. Mayordomo).
- Otras razas. *M. f. flavissima*: Una en el embalse de Talaván (CC) el 03/04/09 (S. Mayordomo). Una en Guijo de Coria (CC) el 14/09/10 (J. Prieta). Una en Torreorgaz (CC) el 26/09/10 (S. Mayordomo). Un macho en Usagre (BA) el 21/03/11 (Á. Sánchez). Un macho en Arrocampo (CC) el 25/03/11 (S. Mayordomo). Un macho en la laguna del Gañán, Guijo de Coria (CC), el 13/09/11 (J. Prieta). Varias en el embalse de Ahigal (CC) el 27/09/11 (A. Pacheco). 2 en Guijo de Coria (CC) el 29/09/11 (J. Prieta). Una en el embalse de Portaje (CC) el 15/09/12 (S. Mayordomo). Una en Badajoz (BA) el 22/09/12 (M. Rodríguez, J.C. Salgado y J. C. Paniagua). En la laguna de Galisteo (CC), una el 24/09/12 (S. Mayordomo) y 2 el 26/09/12 (J. Prieta). Una en Riobobos el 27/03/13 (S. Mayordomo). *M. f. thunbergii*: Una en Galisteo (CC) el 23/08/11 (S. Mayordomo). Una en Santa Amalia (BA) el 21/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en Galisteo (CC) el 29/09/12 (S. Mayordomo). Una en Guareña (BA) el 27/04/13 (E. Charles, E. Palacios, F. Montaña, I. Flecha, J. Gómez Aparicio, J. Guerra, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Mayordomo y V. Resa). Una en Vegas Altas (BA) el 02/05/13 (M. Kelsey). Una en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 08/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en el embalse de Portaje (CC) el 11/09/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). Una en Galisteo (CC) el 01/05/14 (S. Mayordomo). Una en La Aldea del Obispo (CC) el 15/09/14 (N. Renwick). *M. f. cinereocapilla*: Una en Riobobos el 27/03/13 (S. Mayordomo). "*M. f. superciliaris*": Una en Riobobos el 27/03/13 (S. Mayordomo) y el 02/04/13 (J. Prieta).
- Paso prenupcial. 3 en Galisteo (CC) el 07/03/09 (S. Mayordomo). 2 en Miajadas (CC) el 17/03/09 (S. Fletcher). Un macho en Galisteo (CC) el 11/03/10 (S. Mayordomo). Un macho en Santa Amalia (BA) el 13/03/10 (F. Yuste). Una en Oliva de Plasencia (CC) el 13/03/11 (A. J. Julián) y otro en Santa Marta de Magasca (CC) el 20/03/11 (M. Kelsey). En la Charca de Esparragalejo (BA), un macho *M. f. iberiae* el 24/03/12 (Á. Sánchez) y 3 machos, dos *M. f. iberiae* y uno *M. f. flavissima*, el 31/03/12 (SEO-Badajoz). 2 machos *M. f. iberiae* y una hembra en Galisteo (CC) el 28/03/12 (S. Mayordomo). 2 de *M. f. flava* en Casas de Hitos (BA-CC) el 17/03/13 (M. Kelsey). Una en Riobobos (CC) el 20/03/13 (R. Montero). Una *M. f. iberiae* en Plasencia (CC) el 22/03/13 (S. Mayordomo). Una en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 13/03/14 (J. Guerra).

Una en El Torviscal (BA) el 17/03/14 (M. Gálvez). Una en Valdefuentes, Galisteo (CC) el 19/03/14 (S. Mayordomo).

- Paso postnupcial. 4 en Charco Salado (CC) el 21/07/09 (S. Mayordomo). 3 en Galisteo (CC) el 21/10/10 (J. Prieta y S. Mayordomo). 6 en Charco Salado (CC) el 21/07/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). 90 en la laguna de Galisteo (CC) el 23/08/11 (S. Mayordomo). 2.000 en Badajoz (BA) el 11/09/11 (G. Silva). Cientos en Campo Lugar-Palazuelo (CC/BA) el 07/10/11 (S. Fletcher). Una en Galisteo (CC) el 15/10/11 (J. Prieta). Una en Charco Salado (CC) el 16/10/11 (S. Mayordomo). Una en Charco Salado (CC) el 15/07/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Un joven en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 20/07/12 (S. Mayordomo). Una en Los Canchales (BA) el 20/10/12 (E. del Viejo y A. Cangas). Un macho en Galisteo (CC) el 23/10/12 (S. Mayordomo). Una en las Vegas Altas el 27/10/12 (F. Montaña y A. Núñez). El 28/08/13, primeros grupos en Portaje (CC) y en Galisteo (CC) (S. Mayordomo). 3 en la laguna de Galisteo (CC) el 16/10/13 (S. Mayordomo). 2 en El Batán (CC) el 20/10/13 (J. Prieta y R. Montero). Una en Alange (BA) el 22/10/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en Arrocampo (CC) el 08/08/14 (S. Mayordomo). Una en La Albuera (BA) el 08/08/14 (F. Montaña y A. Núñez) y el 09/08/14 (F. Montaña). Una en Charco Salado (CC) el 15/08/14 (J. Briz y V. Risco).

Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus regional. Residente común (4.500 ejemplares en 2004-2006, 2% de España). Tendencia al aumento. Invernante común (¿10.000? ejemplares). Subespecie *M.c.cinerea*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,9% y un aumento poblacional de +205% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2% y total de +23%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b).

Lavandera blanca (*Motacilla alba*)

Estatus regional. Residente abundante (¿50.000? ejemplares en 2004-2006, 7% de España) con tendencia al aumento. La subespecie *M.a.alba* es muy abundante en invernada (varios millones) con tendencia al aumento. La

lavandera enlutada (*M.a.yarrelli*) es invernante común (¿3.000? ejemplares).

Criterio. Observaciones de interés. Fenología de la subespecie *M.a.yarrelli*.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,2% y un aumento poblacional de +77% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +10% y total de +49% (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de aves invernantes, la tendencia es “estable” en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- **Llegadas de *M. a. yarrelli*.** Una en El Borbollón (CC) el 24/10/10 (C. Clemente). Un macho en el Estanco, Oliva de Plasencia (CC), el 12/11/10 (S. Mayordomo). 2 en el vertedero de Mérida (BA) el 06/11/11 (Á. Sánchez). 3 en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 27/10/12 (S. Mayordomo). Un macho en Navalморal de la Mata (CC) el 03/11/12 (J. Briz). Una en el vertedero de Mérida (BA) el 07/11/13 (M. Gálvez). Una en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA) el 08/11/13 (J. Guerra). 8 en la gravera Viñuelas, Galisteo (CC), el 18/10/14 (S. Mayordomo). Una en el río Guadiana, Villagonzalo (BA), el 24/10/14 (M. Gálvez).
- **Últimos registros de *M. a. yarrelli*.** Una en el vertedero de Mirabel (CC) el 16/02/10 (J. Prieta). 2 en Moraleja (CC) y otra en Huélagá (CC) el 28/03/11 (C. Clemente). Una en Cáceres el 09/03/12 (M. Kelsey). Una en el embalse de Portaje (CC) el 16/03/12 (S. Mayordomo). Una hembra en Charco Salado (CC) el 23/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Una hembra en paseo fluvial de Plasencia (CC) el 27/03/13 (S. Mayordomo). Un macho en El Batán (CC) el 10/03/14 (S. Mayordomo y J. Prieta). Un macho en la laguna de Galisteo (CC) el 26/03/14 (S. Mayordomo).

Mirlo-acuático europeo (*Cinclus cinclus*)

Estatus regional. Residente escaso y localizado (¿100-500? parejas) con tendencia negativa. Efectúa movimientos de corto alcance. Subespecie *C.c.cinclus*.

Criterio. Citas fuera de su área habitual y de otro interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,9% y una reducción poblacional de -97% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Registros de interés.** Uno en la Garganta de San Martín, Tornavacas (CC), a unos 1.500 msnm el 31/07/10 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno

en la charca del pueblo, Robledillo de Trujillo (CC), el 05/11/11 (S. Fletcher). Reproducción en el río Jerte, casco urbano de Plasencia en 2012 (no se repite en otros años): pareja con 3 pollos y otro adulto diferente con ceba el 11/04/12 (S. Mayordomo) y 6 en al menos 4 posibles territorios, el 15/04/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez y E. Palacios). 2 territorios a 1.800-2.000 msnm en la Garganta de la Serrá, Tornavacas (CC), el 08/06/14 (J. Prieta e I. Solana).

Chochín común (*Troglodytes troglodytes*)

Estatus regional. Residente abundante (250.000 ejemplares en 2004-2006, 4% de España) con tendencia estable o moderadamente positiva. Subespecie *T.t.troglodytes*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3,3% y un aumento poblacional de +42% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4,4% y total de +27%, similares a las de primavera (SEO/BirdLife, 2013b).

Acentor común (*Prunella modularis*)

Estatus regional. Reproductor común (18.000 ejemplares en 2004-2006, <1% de España) con tendencia en declive. Más frecuente en invernada, con tendencia incierta, pero posiblemente en aumento. Cría la subespecie *P.m.mabbotti*, en invierno también llega *P.m.modularis*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Alta Montaña en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2% y una reducción poblacional de -25% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +6,2% y un aumento poblacional de +34%; es decir, con posible aumento (SEO/BirdLife, 2013b). Esto contrasta con los datos de Europa, origen de aves invernantes, con tendencia “declive moderado” (-40%) en el periodo 1980-2012, aunque con cierta estabilidad desde el año 2000 (PECBMS, 2015).
- **Registros de interés.** En Monfragüe (CC), varios el 18/10/10 (J. Prieta) y 2 en la Portilla del Tiétar el 04/10/11 (J. Muddeman). Uno en Morantes,

Badajoz, el 11/10/13 (J. L. Bautista). Varios en Mirabel (CC) el 12/10/13 (J. Prieta).

Acentor alpino (*Prunella collaris*)

Estatus regional. Residente muy escaso y muy localizado (¿0-20? parejas) en posible declive; en 2014 hubo dos observaciones en Gredos cacereño tras 13 años sin citas. Invernada escasa (¿500? ejemplares) con tendencia desconocida. Subespecie *P.c.collaris*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Época de cría. Una pareja a 2.300 msnm en neveros del pico Castilfrío, Tornavacas (CC), el 21/06/14 (J. Prieta). Una pareja en la cuerda de los Infiernillos, Tornavacas (CC), el 21/06/14 (I. Solana).
- Invierno 2008-2009. 10 en el castillo de Montanchez (CC) en enero de 2009 (A. Howes y C. Fernández). 2 en la Alcazaba de Reina (BA) el 22/02/09 (J. L. Anguita).
- Invierno 2009-2010. Varios en el castillo de Benquerencia (BA) el 23/01/10 (A. Ternero). 14 en la sierra de Aguafría, Monesterio (BA), el 07/02/10 (A. Pacheco).
- Invierno 2010-2011. En la sierra de Aguafría, Monesterio (BA), 3 el 27/11/10 y 22 el 26/12/10 (A. Pacheco). 2 en la Portilla de Jaranda, Guijo de Santa Bárbara (CC), el 06/03/11 (R. Guzmán).
- Invierno 2011-2012. En el puerto de Esparabán, Pinofranqueado (CC), uno el 17/11/11 y 17 el 08/12/11 (A. Pacheco). En el Pico Villuercas (CC), 3 el 03/12/11 (M. Kelsey) y 10 el 12/02/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). En la Sierra de Aguafría, Monesterio (BA), 2 el 03/12/11 y 19 el 23/12/11 (A. Pacheco). 5 en Zarza de Montánchez (CC) el 24/12/11 (A. Pacheco). 8 en Benquerencia de la Serena (BA) el 28/01/12 (S. Villa). Uno en el castillo de Montánchez (CC) el 31/01/12 y 2 el 13/03/12 (M. Kelsey).
- Invierno 2012-2013. El 22/11/12, 30-40 en la sierra del Ladrillar (CC) (A. Pacheco) y 4 en la sierra del Castellar, Zafra (BA) (F. Montaña y A. Núñez). En Pinofranqueado (CC), 7 en el puerto de Esparabán y 5 en la Bolla Chica el 06/12/12 (A. Pacheco); más de 15 en la Bolla el 14/02/13 (A. Pacheco). Uno en el castillo de Benquerencia de la Serena (BA) el 10/12/12 (J. Muddeman). Uno en el castillo de Alange (BA) el 03/01/13 (J. Guerra y M. Martínez), 2 el 28/02/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y 9 el 08/03/13 (F. Montaña). Uno en el pico Villuercas (CC) el 07/02/13 (J. Muddeman). 2 en la sierra del Castellar, Zafra (BA) el 12/02/13 (J. A. Delgado). 3 en la sierra de Cabezo, Las Hurdes (CC), el 21/03/13 (A.

Pacheco). 4 en la Bolla Grande, Robledillo de Gata (CC), el 04/04/13 (J. Serradilla).

- Invierno 2013-2014. 2 en la Sierra de Utrera, Oliva de Mérida (BA), el 09/11/13 (M. Gálvez). En la Sierra del Castellar, Zafra (BA), 2 el 12/11/13 (A. Núñez y F. Montaña), 2 el 17/11/13 (A. Núñez, C. Clemente, E. Palacios, F. Montaña, M. Á. Muñoz, F. Ramírez, S. Mayordomo y V. de Alba) y 6 el 25/11/13 (F. Montaña). Uno en el castillo de Hornachos (BA) el 29/11/13 (F. Crystal). En el castillo de Montánchez (CC) 2 el 01/02/14 (M. Kelsey) y uno el 08/03/14 (J. Nolan y G. Schreur). Uno en el castillo de Alange (BA) el 24/02/14 (M. Gálvez) y el 25/02/14 (J. Guerra). Uno en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 02/03/14 (V. de Alba, E. Charles, E. Juarros, S. Mayordomo, E. Palacios, J. Portillo y D. Santamaría). 4 en el Pico Villuercas (CC) el 09/03/14 (M. Kelsey). 2 en Casares de Hurdes (CC) el 22/03/14 (A. Pacheco).
- Invierno 2014-2015. En el pico Villuercas (CC), 2 el 01/11/14 (M. Gálvez, J. Guerra y J. Solana), uno el 10/11/14 (M. Kelsey), varios el 11/12/14 (J. Á. Herrera), 12 el 15/12/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y 3 el 30/12/14 (F. Montaña). Uno en Alange (BA) el 20/11/14 (J. Guerra). Uno en la sierra del Castellar, Zafra (BA), el 24/11/14 (J. A. Delgado) y 2 el 25/11/14 (F. Montaña). Uno en Magacela (BA) el 08/12/14 (J. M. García) y el 29/12/14 (B. Arenaz y M. Rodríguez). 4 en la sierra de Tentudía, Monesterio (BA), el 17/12/14 (A. Pacheco). Uno en el castillo de Montánchez (CC) el 27/12/14 (J. Solana) y 2 el 29/12/14 (F. Bernáldez).

Alzacola rojizo (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus regional. Reproductor estival común (20.000 ejemplares, el 8% de España) con tendencia decreciente. Subespecie *C.g.galactotes*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Llegadas. Uno en Ahigal (CC) el 28/04/10 y otro en La Granja (CC) el 30/04/10 (R. Montero). El 28/04/11, 3 parejas en Montehermoso (CC) (J. Mahillo) y uno en Ahigal (CC) (R. Montero). En Montehermoso (CC), uno el 24/04/12 y otro el 18/04/13 (J. Mahillo y C. Clemente). Uno en Ahigal (CC) el 19/04/13 (R. Montero). Un macho en Don Álvaro (BA) el 22/04/13 (F. Crystal). 2 en Almendralejo (BA) el 01/05/13 (L. Alcántara). El 07/05/14, uno en Montehermoso (CC) (C. Clemente y J. Mahillo) y otro en Almendralejo (BA) (L. Alcántara).
- Últimos registros. 3 en Montehermoso (CC) el 17/08/12 (H. Sánchez y C. Clemente). Uno en Almedralejo (BA) el 10/09/12 (L. Alcántara). Uno en Acehúche (CC) el 11/09/13 (M. Rodríguez). Uno en Almendralejo (BA) los días 29/09/13 y 30/09/13 (L. Alcántara). Uno en Montehermoso (CC)

el 01/10/13 (C. Clemente). Uno en Almendralejo (BA) el 26/09/14 (J. A. Román) y el 27/09/14 (F. Macías).

- Otros registros. Nuevas localidades en Villa del Campo (CC) y Guijo de Coria (CC) el 15/06/11 (S. Mayordomo). Registros en cerezales del valle del Jerte (CC), hábitat no descrito: una pareja en Rebollar el 09/06/12 y otra pareja en primavera de 2012 en Cabezuela del Valle (I. Solana); Uno en Monfragüe (CC) el 12/05/12 (M. Pujol y J. L. López). Uno expulsando a un alcaudón común en Calzadilla (CC), lejos del olivar más cercano, el 31/07/12 (S. Mayordomo). Uno en Pescueza (CC) el 16/06/13 (A. Rodríguez). Uno en Pozuelo del Zarcón (CC) el 20/06/13 (C. Clemente). Uno en Calzadilla (CC) el 17/08/13 (P. Gutiérrez). Uno en Mohedas de Granadilla (CC) el 13/05/14 (C. Clemente). Uno en Garrovillas (CC) el 14/05/14 (R. Moreno-Opo).

Petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*)

Estatus regional. Residente común (370.000 ejemplares en 2004-2006, 5% de España) con tendencia al aumento. Muy abundante en invernada (varios millones) con tendencia creciente. Subespecie *E.r.rubecula*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,9% y un aumento poblacional de +117% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3,5% y total de +8% (SEO/BirdLife, 2013b).
- Otros registros. Uno leucístico en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 05/04/12 (J. C. Paniagua y C. Clemente).

Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus regional. Especie estival muy abundante (670.000 ejemplares en 2004-2006, 6% de España). Tendencia al aumento. Subespecie *L.m.megarhynchos*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,9% y un aumento poblacional de +58% (SEO/BirdLife, 2013a).

- Llegadas. En Villanueva de la Vera (CC), 2 el 24/03/09 y 4 el 25/03/09; uno el 22/03/10; uno el 25/03/11 y 5 el 26/03/11 (D. Langlois). El 26/03/11, uno en Monfragüe (CC) (M. García del Rey) y otro en Mérida (BA) (S. Fletcher). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 23/03/12 y 2 el 24/03/12 (D. Langlois). Presente en Puebla de la Calzada (BA) el 20/03/13 (F. Lopo). El 28/03/13, uno en Pago de San Clemente (CC) (M. Kelsey) y otro en Torrefresneda (BA) (J. Solana). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 29/03/13 y 6 al día siguiente (D. Langlois). Uno en Brovales (BA) el 21/03/14 (F. Montaña). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 29/03/14 (D. Langlois) y otro en Alange (BA) (E. Amengual y M. Gálvez).
- Últimos registros. Uno en Monfragüe (CC) el 13/09/09 (S. Mayordomo). 2 en Piornal (CC) el 13/09/12 (J. Prieta). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 21/09/12 (D. Langlois). Uno en en Plasencia (CC) el 30/09/12 (R. Montero). 2 en Rena (BA) el 13/09/14 (GIA-Extremadura). Uno en Brovales (BA) el 22/09/14 (F. Montaña). 3 en Mérida (BA) el 23/09/14 (J. Guerra).

Ruiseñor pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus regional. Reproductor escaso (360 ejemplares en 2014) con tendencia desconocida, quizás en declive. Más frecuente en paso y en invernada, con tendencia negativa. Subespecie *azuricollis* en época de cría, *cyaneacula* (centro y norte de Europa) y *namnetum* (costa oeste de Francia) en paso e invernada.

Criterio. Reproducción, fenología, invernada y observaciones de interés.

- Población reproductora. En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en Extremadura (Ortega *et al.* 2014). Con los resultados obtenidos se confirma la presencia solamente en Gredos, con una población estimada en 360 individuos con un alto grado de incertidumbre. Se distribuye de modo disperso y parcheado en piornales a más de 2.000 metros, sobre todo en las cimas que contactan con la provincia de Ávila.
- Tendencia invernal. En Europa, origen de las aves invernantes y migradoras, la tendencia de la subespecie *cyaneacula* es “declive moderado” (-20%) en el periodo 1995-2012 (PECBMS, 2015).
- Época de cría. En Tornavacas (CC): uno en el Collado del Herido el 31/07/10 (E. Palacios y S. Mayordomo), una hembra en la Serrá el 08/06/14 (J. Prieta e I. Solana), 4 machos entre Cardiel y Castilfrío el 21/06/14 (J. Prieta) y en el collado Cardiel, 28 el 26/08/14 y 13 el 28/08/14 (GIA-Extremadura).

- Llegada de invernantes. En Galisteo (CC), un macho el 12/09/09 (S. Mayordomo), uno el 19/09/10 (C. Clemente, J. Briz, J. Mahillo y V. Risco) y una hembra el 31/08/11 (S. Mayordomo). Uno en Santa Amalia (BA) el 11/09/11 (E. Palacios, F. Yuste, J. C. Paniagua y S. Mayordomo). Uno en Gadiana del Caudillo (BA) el 11/09/12 (P. Herrador). 3 en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 12/09/12 (S. Mayordomo). En el río Salor, Cáceres, anillados un macho el 20/09/13 y una hembra el 24/09/13 (GIA Extremadura). Uno en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 28/09/13 (R. Montero). El 14/09/14, un macho en Galisteo (CC) (J. J. Aldehuela) y uno en Monfragüe (CC) (M. García del Rey).
- Últimos registros de invernantes. Un macho en Arrocampo (CC) el 23/04/09 (R. Montero). Uno en Casas de Hitos (BA-CC) el 19/03/10 (M. Kelsey). Uno en Los Barruecos (CC) el 25/03/11 (J. P. Prieto). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 06/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Arrocampo (CC) el 07/04/13 (J. Prieta). 2 hembras en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 27/03/14 (M. Gálvez).

Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus regional. Residente abundante (80.000 ejemplares en 2004-2006, 4% de España) con tendencia al aumento. Muy abundante en invernada, con tendencia creciente. Subespecie *P.o.gibraltarensis*.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +6% y un aumento poblacional de +480% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +8,2% y total de +38% (SEO/BirdLife, 2013b).
- Registros. Uno leucístico en Navalvillar de Pela (BA) el 04/12/12 (Á. L. Sánchez).

Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus regional. Reproductor estival común (¿500-2.000? ejemplares en 2004-2006, 1% de España) con tendencia incierta, quizás en ligero aumento. Común en paso postnupcial con tendencia positiva. Subespecie *P.p.phoenicurus*.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “incierta” aunque el cálculo obtenido arroja un porcentaje medio de cambio anual de +3% (SEO/BirdLife, 2013a). En Europa, origen de aves migradoras, la tendencia es “aumento moderado” (+25%) en el periodo 1980-2012; pues tras un fuerte declive hasta 1985 la especie está en aumento (PECBMS, 2015).
- Época de cría. En Villanueva de la Vera (CC), un macho el 30/04/09 y el 05/05/09; un macho el 14/04/11, 2 machos el 23/04/11; un macho el 28/04/12; un macho los días 04/04/13 y 09/04/13, 2 machos el 24/04/13, 4 machos el 19/05/13; y uno el 22/04/14 (D. Langlois). Un macho cantando en un eucalipto en Villanueva de la Sierra (CC) el 29/05/09 (S. Mayordomo). Un macho cantando en Gata (CC) el 30/05/09 (F. Buenaga). Una hembra con aspecto de macho en Guijo de Santa Bárbara (CC) el verano de 2009 (J. Calle). Un macho en La Codosera (BA) el 16/04/11 y el 06/05/11 (G. Schreur). En Santa Cruz de Paniagua (CC), una pareja el 17/04/11, un macho el 05/04/12 y una pareja el 06/04/12 (J. C. Paniagua). En Las Hurdes (CC): varias parejas en Pinofrankeado durante mayo de 2011; en el tramo urbano del río de los Ángeles, Pinofrankeado, 7 parejas el 06/05/12 y 14 machos cantando el 10/04/13; 8 machos en Riomalo de Arriba el 25/04/13; 2 machos en la sierra del Cabezo el 05/05/13; nuevas parejas nidificando en Riomalo de Abajo, una en una farola el 24/05/13 y otra en un poste el 31/05/13; 2 parejas en el río Hurdano, Arrolobos (CC), el 24/06/13; 3 en Riomalo de Arriba el 10/04/14 (A. Pacheco) y 3 en Ovejuela (CC) el 13/04/14 (J. Prieta). En el pinar de la Dehesa de Abajo, Tornavacas (CC), a 1.550 msnm, 2 machos el 10/05/11 (J. Prieta) y otro macho el 24/05/11 (I. Solana y J. Prieta). En el refugio El Brezo, Losar de la Vera (CC), un macho el 14/05/11 y 3 el 21/05/11; 2 machos el 06/05/12 (D. Langlois); un macho el 15/06/13 (C. Clemente, J. Prieta, M. García del Rey y J. L. Guisado); 6 machos el 27/04/14 (D. Langlois). 3 machos en la Sierra de Alor, Olivenza (BA), el 15/05/11 (J. C. Paniagua). Una pareja en alcornocal de Santa Catalina, Serradilla (CC), el 20/05/11 (A. Gómez). En La Lapa (BA), un macho el 01/04/12 y el 06/05/12 (F. Montaña); uno el 28/04/13, una pareja el 12/05/13 (F. Montaña), 5 machos el 26/05/13 (F. Montaña y G. Montaña); y presente el 28/04/14 (F. Montaña, F. Bernaldez y F. Macías). Un macho cantando en Garganta la Olla (CC) el 24/04/12 (J. Prieta). Un macho y una pareja en el camping de Gata (CC) el 13/05/12 (J. Prieta). En Cabezabellosa (CC) un macho cantando el 20/05/12 y una pareja el 07/07/13 (R. Montero). En Montehermoso (CC), 2 machos el 08/04/13 (J. Mahillo), una pareja los días 19/04/13 y 23/04/13 (C. Clemente y J. Mahillo) y un macho el 26/04/13 (C. Clemente y S. Mayordomo). 2 machos y una hembra entre Barcarrota y Valverde de

Leganés (BA) el 22/05/13 (M. Gálvez). Un macho en Hornachos (BA) el 16/06/13 (L. Alcántara). 2 familias en castañar de la sierra de Tentudía (BA) el 19/07/13 (A. Pacheco). Una hembra en Solana (CC) el 15/04/14 (M. Kelsey). Un macho cantando en Monfragüe (CC) el 26/04/14 (E. Palacios y S. Mayordomo).

- Paso prenupcial. Un macho en Cabezabellosa (CC) el 15/04/09 (R. Montero). Un macho en Villanueva de la Vera (CC) el 17/04/09 (D. Langlois). Un macho en Cáceres el 27/03/10 (B. Molina). Un macho en Mérida (BA) el 29/03/10 (R. Montero). En Villanueva de la Vera (CC), un macho los días 25/03/11 y 28/03/11 (D. Langlois). Uno en Plasencia (CC) el 29/03/11 (R. Montero). 2 en Jaraicejo (CC) el 28/03/12 (G. Schreur). Un macho en Vegas de Coria (CC) el 28/03/12 (A. Pacheco). Uno en Granja de Torrehermosa (BA) el 17/03/13 (G. Gahete). El 01/04/13, uno en Alange (BA) (J. Guerra) y un macho en Alconera (BA) (M. Kelsey). Uno en Palazuelo (BA) el 18/03/14 (A. Davies y R. Miller). 4 en Salvatierra de los Barros (BA) el 30/03/14 (F. Montaña).
- Paso postnupcial. 4 hembras en Valcorchero, Plasencia (CC), el 01/09/09 (S. Mayordomo). Uno en Casatejada (CC) el 12/09/09 (D. Langlois y S. Langlois). Una hembra en Valcorchero, Plasencia, el 08/10/09 (S. Mayordomo). 2 machos jóvenes el 20/08/10 en Cornalvo (BA) (J. Ledo). Un macho en Guijo de Coria (CC) el 06/10/10 (S. Mayordomo). Un macho joven el 13/08/11 en Mirandilla (BA) (J. Ledo). En San Vicente de Alcántara (BA), un macho el 18/08/11 y una hembra el 20/08/11 (J. Gordillo). Uno en Plasencia (CC) el 25/10/11 (R. Montero). En Piornal (CC), una hembra el 24/08/12 y 2 machos y 3 hembras el 30/08/12 (J. Prieta). Una hembra en Valcorchero, Plasencia (CC), el 29/08/12 (S. Mayordomo). Un macho en Jerte (CC) el 23/10/12 (J. L. Rivero). Uno en Oliva de Mérida (BA) el 28/10/12 (F. Crystal y E. del Viejo). Uno en Ahigal (CC) el 30/07/13 (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo). 8 en Piornal (CC) el 21/08/13 (J. Prieta). Un macho en Zafra (BA) el 12/10/13 (F. Crystal). Uno en el arroyo Bonhaval, Alange (BA), el 15/10/13 (M. Gálvez). Uno en Piornal (CC) el 24/08/14 (B. Fernández y J. Gutiérrez del Sol). Una pareja en Cornalvo (BA) el 26/08/14 (J. Ledo y Á. Sánchez).
- Registros en invierno. Un macho en Logrosán (CC) el 14/12/12 (E. Peña).

Tarabilla norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus regional. Muy abundante en paso postnupcial y rara en paso prenupcial, con tendencia decreciente. Presencia invernal esporádica. Monotípica.

Criterio. Paso prenupcial y fechas extremas en postnupcial.

- Tendencia. En Europa, origen de las aves migradoras, la tendencia es “declive moderado” (-40%) en el periodo 1980-2012, aunque con cierta estabilidad desde 1985 (PECBMS, 2015).
- Paso prenupcial. Una en Monroy (CC) el 15/03/09 (C. Proper). Una hembra en Talaván (CC) el 22/05/09 (S. Mayordomo). Una en Las Canteras, Trujillo (CC), el 28/03/10 (T. Naturalist). Una en los llanos de Cáceres el 02/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). Un macho en Aceituna (CC) el 11/04/10 (D. González). Una en Cerezo (CC) el 14/03/11 (A. Pacheco). Una hembra en Arrocampo (CC) el 09/05/11 (G. Schreur). Una hembra en Galisteo (CC) el 13/05/11 (S. Mayordomo). Una hembra en Cabezabellosa el 21/05/11 (E. Quin). Una en Arrocampo (CC) el 05/04/13 y otra en Fernando V, Madrigalejo (CC), el 13/04/13 (M. Kelsey). Una hembra en Navacebrea, Plasencia (CC), el 14/04/13 (E. Palacios, J. Prieta, M. Á. Muñoz, F. Ramírez y S. Mayordomo). Una en Retamal de Llerena (BA) el 18/04/13 (B. Iglesias, J. Guerra y M. Gálvez). Una en Toril (CC) el 19/04/13 (S. Mayordomo). El 21/04/13, un macho en Campo Lugar (CC) (A. Calvo) y una en Casas de Hitos (BA-CC) (M. Kelsey). Entre Puebla de Alcocer-Talarrubias (BA), 3 machos el 23/04/13 (Á. L. Sánchez). El 24/04/13 se ven 2 machos en Guijo de Coria (CC) (C. Clemente y J. Mahillo) y 3 en Talaván (CC) (J. Guerra, M. Gálvez y S. Mayordomo). Una en Guareña el 27/04/13 (E. Charles, E. Palacios, F. Montaña, I. Flecha, J. Gómez Aparicio, J. Guerra, L. Alcántara, M. Gálvez, S. Mayordomo y V. Resa). Un macho en Santiago del Campo (CC) el 09/04/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Un macho en Casas de Hitos (BA-CC) (M. Kelsey, J. Muddeman, D. Tyldesley y D. Tyldesley) y otro en Palazuelo (BA) (J. Muddeman, D. Tyldesley y D. Tyldesley) el 10/04/14. Una hembra en llanos de Cáceres el 12/04/14 (C. Clemente y S. Mayordomo).
- Paso postnupcial. 2 en Casas de Belvís (CC) el 03/09/09 (J. Briz). 2 en Talaván (CC) el 04/09/09 (S. Mayordomo). Una el 20/08/10 en Talaván (CC) y otra en Calzadilla (CC) el 21/08/10 (S. Mayordomo). Una en el embalse del Jerte (CC) el 20/10/10 (J. Prieta). Una en Galisteo (CC) el 21/10/10 (S. Mayordomo). Una en Cáceres el 29/08/11 (S. Mayordomo) y 3 en el Puerto de Tornavacas (CC) el 30/08/11 (J. Prieta). Una en El Batán (CC) el 20/10/11 (J. Prieta). Una en Galisteo (CC) el 22/10/11 (C. Clemente). Una en Piornal (CC) el 27/08/12 (J. Prieta). 3 en Galisteo (CC) el 28/08/12 (S. Mayordomo). Una en Belén, Trujillo (CC), el 19/10/12 (M. Kelsey). Una en Moheda Alta (BA) el 27/10/12 (F. Montaña y A. Núñez). Una en Los Cerralbos, Trujillo (CC), el 18/11/12 (M. Kelsey). Una en Riobos (CC) el 27/07/13 (E. Palacios y M. Á. Muñoz). El 28/08/13 se observa una en Piornal (CC) (J. Prieta) y otra en

La Roca de la Sierra (BA) (J. L. Bautista). Una en Galisteo (CC) el 31/08/13 (R. Montero). El 20/10/13 se observa una en El Batán (CC) (J. Prieta y R. Montero) y otra en La Serena (BA) (C. Clemente, E. Palacios y S. Mayordomo). El 27/10/13 se observa una en La Serena (BA) (A. Núñez y V. de Alba) y otra en Talaván (CC) (P. Herrador). Una en Almendralejo (BA) el 21/08/14 (J. G. Aparicio). 2 en Piornal (CC) el 24/08/14 (B. Fernández, J. Gutiérrez del Sol y J. Prieta). Una en Huélagá (CC) el 21/11/14 (C. Clemente).

Tarabilla europea (*Saxicola rubicola*)

Estatus regional. Residente abundante (670.000 individuos en 2004-2006, 9% de España) con tendencia decreciente. Migración e invernada moderadas de aves foráneas con tendencia incierta, quizás negativa. Subespecie *S.r.rubicola*, quizás en invierno *S.r.hibernans* (islas británicas).

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,8% y una reducción poblacional de -38% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1% y total de -12%; es decir, aparente declive (SEO/BirdLife, 2013b).

Collalba gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus regional. Reproductora estival común (¿1.000-2.500? ejemplares, en 2004-2006 <0'1% de España) con tendencia estable. Común en paso prenupcial y muy abundante en paso postnupcial con tendencia decreciente. Cría la subespecie *O.o.libanotica* y en migración *O.o.oenanthe* y *O.o.leucorhoa* (Groenlandia).

Criterio. Cría fuera del Sistema Central, fechas extremas.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Alta Montaña en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,8% y total de -10% (SEO/BirdLife, 2013a). En Europa, origen de aves migradoras, la tendencia es “declive moderado” (-50%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- **Registros invernales.** Una en Santa Marta de Magasca (CC) el 12/01/12 (M. Jewitt y C. Jewitt). Una en Alcántara (CC) el 07/12/14 (A. Rodríguez, Á. Rodríguez y M. Rodríguez). Una en Alange (BA) los días 12/12/14, 14/12/14 y 16/12/14 (M. Gálvez y J. Guerra).

- Época de cría, a baja altitud. En Guijo de Coria (CC), una pareja con 2 jóvenes el 18/07/09; 2 machos el 08/06/10 y una pareja y un joven en Calzadilla (CC) el 30/07/10 (S. Mayordomo); 4 machos el 02/05/12 (J. Prieta), 2 territoriales el 12/05/12 y el 31/05/12 (S. Mayordomo); y una pareja el 03/05/13 (S. Mayordomo). Una pareja en Santa Marta de Magasca (CC) el 19/05/11 (M. Kelsey). Una en Hinojal (CC) el 17/06/11 (S. Mayordomo). Un macho en El Gordo (CC) el 20/06/11 (J. Prieta y S. Mayordomo). Una hembra en Santiago del Campo (CC) el 05/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Un joven en los llanos de Cáceres el 22/06/14 y el 02/08/14 (J. Gutiérrez del Sol).
- Paso prenupcial. Una en La Aldea del Obispo (CC) y otra en Santa Marta de Magasca (CC) el 15/03/09 (C. Proper). Un macho en La Serena (BA) el 28/02/11 (R. Romero). Una en Montehermoso (CC) el 15/02/12 (A. Pacheco). Un macho en Santa Marta de Magasca (CC) el 11/03/13 (M. Kelsey). El 20/03/13, una en Brozas (CC) (H. Dalmau, I. Parsons y P. Eden) y dos en Cabeza del Buey (BA) (J. Guerra y M. Gálvez). Una hembra en La Aldea del Obispo (CC) el 02/03/14 (N. Renwick). Una en Los Cerralbos, Trujillo (CC) el 08/03/14 (M. Kelsey).
- Paso postnupcial. Una en Oliva de Plasencia (CC) el 19/07/09 y una en Ahigal (CC) el 08/08/09 (S. Mayordomo). Una el 28/08/10 en Casar de Cáceres (CC) (S. Mayordomo). Una en Galisteo el 31/08/10 (J. Prieta). El 01/11/10 una en Villanueva de la Vera (CC) (D. Langlois) y 5 en Acehúche (CC) (E. Palacios y M. A. Muñoz). Una en Guijo de Coria (CC) el 02/11/10 (J. Prieta). Una en Cornalvo (BA) el 27/07/11 (Á. Sánchez, I. González y J. Sánchez). Una en Mohedas de Granadilla (CC) el 01/08/11 (A. Pacheco). El 09/11/11, una en Palazuelo (BA) y otra en Puebla de Alcollarín (BA) (J. P. Prieto y S. Mayordomo). Una en Mirandilla (BA) el 20/11/11 (J. Solana). 3 en Guijo de Coria (CC) el 21/08/12 (C. Clemente). Varias en Gabriel y Galán (CC) el 27/08/12 (A. Pacheco). Una en El Gordo (CC) el 02/11/12 (V. Risco y J. Briz). Una en La Pulgosa, Cáceres, el 09/11/12 (M. Kelsey). Una en Piornal (CC) el 28/08/13 (J. Prieta). Una en Membrío (CC) el 30/08/13 (I. Parsons). Una en Saucedilla (CC) el 01/09/13 (J. Briz y V. Risco). Una entre Villanueva de la Serena y Magacela (BA) el 04/11/13 (J. P. Prieto y W. Haworth). Una en Casas de Belvís (CC) el 10/11/13 (J. Briz). 2 en llanos de Cuatro Lugares (CC) el 21/08/14 (Á. Sánchez). Una en Campo Lugar (CC) el 26/08/14 (M. Kelsey). Una en La Aldea del Obispo (CC) hasta el 17/11/14 (N. Renwick).

Collalba rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus regional. Reproductor estival común (18.000 ejemplares en 2004-

2006, 1'6% de España) con tendencia al declive. Subespecie *O.h.hispanica*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,9% y una reducción poblacional de -15% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros de interés. En Garganta la Olla, un macho territorial canta a 1.600 msnm, máxima altitud citada en Extremadura (J. Prieta).
- Llegadas. Un macho en Guijo de Coria (CC) el 08/03/09 (J. Prieta) y otro el 10/03/09 (J. Prieta y S. Mayordomo). Una en Monesterio el 13/03/10 (A. Pacheco). Una en Santa Marta de Magasca (CC) el 27/03/10 (M. Kelsey). Una en Acehúche (CC) el 20/03/11 (J. Julián). El 21/03/11, una pareja en Usagre (BA) (Á. Sánchez) y una en Cerezo (CC) (A. Pacheco). Un macho el 26/03/12 en Mohedas de Granadilla (CC) (A. Pacheco). Un macho en Galisteo (CC) el 28/03/12 (S. Mayordomo). Una hembra en Sierra de Fuentes (CC) el 09/03/13 (F. J. Caballero). El 17/03/13, un macho en el Trasquilón, Cáceres (J. Solana), y una pareja en Granja de Torrehermosa (BA) (G. Gahete). Un macho en Trujillo (CC) el 11/03/14 (J. Muddeman). Un macho en Peraleda de la Mata (CC) el 15/03/14 (S. Mayordomo y E. Palacios).
- Últimos registros. Varias en Mohedas de Granadilla el 16/09/11 (A. Pacheco). Una en Pinofranqueado (CC) el 01/09/12 (A. Pacheco). 5 en Peraleda de la Mata (CC) el 11/09/12 (V. Risco y J. Briz). Una en Montehermoso (CC) el 01/10/13 (C. Clemente). Una en Piornal (CC) el 12/09/14 (A. Redondo y L. Rivas).

Collalba negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus regional. Residente escaso (¿250-500? parejas) con tendencia decreciente. Subespecie *O.l.leucura*.

Criterio. Nuevas localidades de cría y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “declive” con un porcentaje medio de cambio anual de -4,3% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Declive en Gredos cacereño. La collalba negra prácticamente ha desaparecido de las comarcas de La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz, pues no se conocen registros en los últimos años. En el Atlas 1998-2002 se constató su presencia en varias cuadrículas donde en la actualidad está ausente.

- Tajo Internacional. Un estudio específico realizado en el Parque Natural del Tajo Internacional encuentra una densidad de 1'01 territorios/km, superior a cualquiera obtenida antes en Extremadura (Ortega, 2009).
- Registros. En Monfragüe (CC), en el Salto del Gitano una el 10/09/09 y el 22/06/10 (M. Kelsey) y una en la Portilla del Tiétar el 07/11/10 (D. Langlois y S. Langlois). En el Salto del Gitano una los días 18/02/11, 29/04/11 (R. Montero) y 30/04/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). Varias en el Pitolero, El Torno (CC), el 20/09/09 (E. Palacios). Una en Losar de la Vera (CC) el 07/02/10 (J. Calle) y cantando el 06/05/10 (D. Langlois y S. Langlois). Una en Mérida (BA) el 26/03/11 (S. Fletcher). Una en la garganta del Fraile, Serradilla (CC), el 27/04/14 (J. Prieta).

Roquero rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (¿100-500? ejemplares) con tendencia provisional negativa. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “negativa” con un porcentaje medio de cambio anual de -4,6% (SEO/BirdLife, 2013a).

- **Época de cría**

2009. Un macho en el pico Villuercas (CC) el 05/05/09 (J. Muddeman) y otro en Jálama, Acebo (CC), el 31/05/09 (C. Clemente).

2010. Uno en Guijo de Santa Bárbara (CC) el 10/04/10 (D. Langlois y S. Langlois). 2 machos en el puerto de Castilla, Gata (CC), a unos 1.100 msnm el 13/06/10 (S. Mayordomo).

2011. Uno en Garganta la Olla (CC) el 20/04/11 (G. Schreur). En el puerto de Esperabán, Pinofranqueado (CC), una pareja el 05/05/11 y uno el 08/06/11 (A. Pacheco). 2 machos y una hembra en el Pico Villuercas (CC) el 13/05/11 (F. Crystal y J. P. Prieto). En el Pitolero, Cabezabellosa (CC), una pareja el 21/05/11 (E. Quin) y un macho el 22/05/11 (R. Montero). Una hembra y 4 machos en La Canchera, El Gasco (CC), el 16/06/11 (A. Pacheco).

2012. 2 machos en Cabezabellosa (CC) el 01/05/12 (R. Boitenwerg y H. Hindrik). En el Puerto de Esperabán, Pinofranqueado (CC), un macho los días 06/05/12 y 23/05/12, 2 machos y un macho joven el 12/06/12, un macho el 25/06/12, 2 machos y una hembra el 10/07/12 y un macho y 3 jóvenes el 01/09/12 (A. Pacheco). Presencia como reproductor en Avellanar, Pinofranqueado (CC), en junio 2012 a 850-900 msnm, quizás la altitud más baja citada en Extremadura (A. Pacheco).

2013. Un macho en Pico Villuercas (CC) el 10/05/13 (S. West). Un macho en el Pitolero, Cabezabellosa (CC), el 11/05/13 (J. Prieta). 5 machos en la sierra del Ladrillar, Las Hurdes (CC), el 14/05/13 (A. Pacheco). Una pareja y un macho en La Panera, Cabezuela del Valle (CC), el 22/05/13 (I. Solana, J. Prieta y S. Mayordomo). Una pareja en el puerto de Esperabán (CC) el 15/06/13 (A. Pacheco). 3 machos y una hembra en, Cabezuela del Valle (CC), el 23/06/13 (J. Prieta). Un macho en la apretura Majá-Robledo, Casares de Hurdes (CC), el 27/06/13 (A. Pacheco). Un macho en La Mesa, Piornal (CC), el 06/07/13 (J. Prieta).

2014. 2 en la garganta de La Serrá, Tornavacas (CC) el 23/05/14 (I. Solana) y 5 machos y 2 hembras el 08/06/14 (J. Prieta e I. Solana). Un macho en el pico Villuercas (CC) el 26/05/14 (M. Kelsey). 2 machos en El Gasco (CC) el 05/06/14 (C. Clemente). Un macho en el puerto de Esperaban (CC) el 13/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 3 machos el 27/06/14 y el 01/09/14 (A. Pacheco). 11 en la ruta al pico Castilfrío, Tornavacas (CC), el 21/06/14 (J. Prieta). 3 en el pico Estecillo, Guijo de Santa Bárbara (CC), el 20/08/14 (GIA-Extremadura). Uno en el puerto de Honduras (CC) el 22/08/14 (J. Prieta).

- **Migración**. Uno en el Lancho, Arroyo de la Luz (CC), el 04/04/10 (R. Parra). 12 en las sierras centrales de Badajoz el 16/04/11 (Á. Sánchez). 3 en la Sierra del Castellar, Zafra (BA), los días 17/04/12 (J. Vázquez) y 19/04/12 (J. Vázquez y F. Montaña). Un macho en Valcorchero, Plasencia (CC), el 04 y 06/05/12 (J. Rodríguez). El 28/04/13, uno en Alconera (BA) (F. Montaña). En la sierra del Castellar, Zafra (BA), un macho y 2 hembras el 28/04/13 (E. Charles, F. Montaña, I. Flecha, J. Guerra y M. Gálvez), una hembra el 29/04/13 (J. Vázquez); una hembra el 20/04/14 y una pareja el 21/04/14 (F. Montaña). Un macho en Magacela (BA) el 11/04/14 (W. Haworth).
- **Últimos registros**. 2 parejas en El Gasco (CC) el 24/09/11 (A. Pacheco). Un macho joven capturado para anillamiento en la sierra de Magacela (BA) el 02/10/12 (GIA-Extremadura). Un macho en el puerto de Esperabán, Pinofranqueado (CC), el 16/09/13 (A. Pacheco). Un macho y 2 jóvenes en Montánchez (CC) el 24/09/13 (N. Rodríguez). Uno en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 02/10/13 (H. Sánchez). Uno en Piornal (CC) el 12/09/14 (A. Redondo y L. Rivas).

Roquero solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus regional. Residente común (¿5.000? parejas) con tendencia decreciente. Pequeños desplazamientos invernales. Subespecie *M.m.monticola*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,9% y una reducción poblacional de -16% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1% y total de +44%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b).
- Registros de interés. Reproducción en el casco urbano de Zafra (BA), una pareja con un joven el 15/05/10 (A. Núñez). Invernada en Plasencia (CC), una pareja el 07/12/10 y un macho el 13/12/10 (S. Mayordomo).

Mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus regional. Migrante escaso, sobre todo en el postnupcial. Hay algunas citas de invernada, que podrían ser aves en paso tardío. Subespecies: *T.t.torquatus* y *T.t.alpestris*.

Criterio. Todas las observaciones.

- 2009. Uno en el embalse de Llerena (BA) el 18/01/09 (A. Núñez). Uno en Ahigal (CC) el 29/12/09 (J. C. Paniagua).
- 2010. Sin registros.
- 2011. Un macho en Los Canchales (BA) el 06/04/11 (J. Muddeman). Uno en Guadalupe (CC) el 12/11/11 (E. Costillo).
- 2012. Uno en Valcorchero, Plasencia, a finales de marzo de 2012 (M. A. Sánchez). Uno en Montánchez (CC) el 31/03/12 (I. Sánchez) y días anteriores (J. M. Benítez). Uno en Guijo de Santa Bárbara (CC) el 08/04/12 (J. Calle).
- 2013. En Mérida (BA) 4 el 14/10/13 (J. Guerra y M. Gálvez), se ven 2-3 los días 15, 16 y 17/10/13 (Á. Sánchez, Á. L. Sánchez, F. Montaña, L. Alcántara y M. Gálvez). En la Sierra del Castellar, Zafra (BA), 2 el 11/11/13 (A. Núñez) y 2-4 del 12 al 25/11/13 (A. Cangas, A. Núñez, C. Clemente, E. del Viejo, E. Palacios, F. Crystal, F. Montaña, J. Vázquez, J. A. Delgado, M. Á. Muñoz, F. Ramírez, S. Mayordomo y V. de Alba). 2 en el castillo de Hornachos (BA) el 29/11/13 y uno en San Bernabé, Don Álvaro (BA), el 23/12/13 (F. Crystal).
- 2014. Una pareja en Arrazauces, Quintana de la Serena (BA), el 15/04/14 (V. M. Quintana). Un macho en la sierra del Castellar, Zafra (BA), el 05/10/14 (J. A. Delgado), el 08/10/14 (J. A. Delgado y F. Montaña) y el 17/10/14 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). Un macho en Castuera (BA) el 10/11/14 (S. Daly).

Mirlo común (*Turdus merula*)

Estatus regional. Residente muy abundante (1.100.000 ejemplares en 2004-2006, el 6% de España). Tendencia al aumento. En invierno llegan relativamente pocos ejemplares foráneos. Subespecie *T.m.merula*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,6% y un aumento poblacional de +39% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,3% y total de +0,3% (SEO/BirdLife, 2013b).
- Registros. Un volandero en Cáceres ciudad el 01/02/05 (C. Fernández).

Zorzal real (*Turdus pilaris*)

Estatus regional. Escaso y fluctuante en paso e invernada (¿50-1.000? ejemplares), con tendencia incierta. Pasa inadvertido entre otros zorzales más numerosos. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Tendencia. En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -13% y total de -8%; es decir, aparente declive. En la serie estudiada se produjo un pico de abundancia el año 2010 (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “estable” en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- 2009. Uno en la Tajadilla, Monfragüe (CC), el 20/03/09 (S. Mayordomo).
- 2010. Sin registros.
- Año 2011. Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 01/12/11 (D. Langlois).
- Año 2012. Uno en Monfragüe (CC) el 09/10/12 (Ó. Díaz y J. M. Jiménez). 2 en la Vinosilla, Plasencia (CC), el 22/12/12 (M. Á. Muñoz, E. Palacios y C. Espadero).
- Año 2013. Varios en Villanueva de la Vera (CC) el 23/01/13 (P. Gómez). 3 cobrados por un cazador en Puebla de Sancho Pérez (BA) el 28/01/13 (F. Montaña). En Galisteo (CC), 10 los días 13/02/13 (C. Clemente y J. Mahillo) y 15/02/13 (S. Mayordomo), 8 el 16/02/13 (J. Prieta y J. C. López), 5 el 06/03/13 (S. Mayordomo), 2 el 10/03/13 (E. Palacios y S.

Mayordomo) y 3 el 13/03/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Uno en Valverde de la Vera (CC) el 16/02/13 (P. Gómez). Uno entre Malpartida de Cáceres y Aliseda (CC) el 01/03/13 (Á. Sánchez y J. Caldera).

- Año 2014. Sin registros.

Zorzal común (*Turdus philomelos*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso (¿10-100? parejas), aparentemente en aumento y expansión (tendencia muy positiva en España). Invernada muy abundante (varios millones de ejemplares), con tendencia al aumento. Subespecie *T.p. philomelos*.

Criterio. Época de cría, fechas extremas.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +7% y un aumento poblacional de +360% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +6% y total de +36%. En la serie estudiada hubo un pico de abundancia el año 2012 (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de aves invernantes, la tendencia es “aumento moderado” (+10%) en el periodo 1980-2012, pero más pronunciado a partir de 1985, cuando se estima en el 40% (PECBMS, 2015).
- Registros en época de cría. En Jerte (CC), 2 el 23/05/13 (M. Gálvez), uno cantando y un nido el 16/06/13 (Á. Sánchez y J. L. Rivero); uno cantando el 17/04/14 (B. Molina), un adulto y 2 volantones el 19/04/14 (H. Sánchez) y adultos con pollos el 19/05/14 (G. Schreur). En Villanueva de la Vera (CC), uno el 30/05/13 (D. Langlois); uno cantando el 08/04/14 (D. Langlois), una pareja con 4 pollos el 14/04/14 (P. Gómez) y uno cantando el 16/05/14 y el 23/05/14 (D. Langlois). En Alía (CC), uno el 30/04/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera y N. Baeza); uno el 18/04/14 y el 17/05/14 (J. Á. Herrera y N. Baeza). Uno cantando en Rebollar (CC) y otro en Valdastillas (CC) el 25/04/14 (J. Prieta).
- Últimos registros. 2 en Valcorchero, Plasencia (CC), el 31/03/09 (S. Mayordomo). Uno en Arroyomolinos de la Vera (CC) el 09/04/10 (S. Mayordomo). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 16/04/10 (D. Langlois). Uno en Toril (CC) el 05/04/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Trujillo (CC) el 10/04/12 (M. Kelsey). Uno capturado por un gavilán en el río Ladrillar (CC) el 02/04/13 (A. Pacheco). 2 en Jaraicejo (CC) el 07/04/13 (M. Kelsey). Uno en Alange (BA) el 17/04/14 (M. Díaz-Infantes, J. G. Aparicio y J. Guerra). 2 en La Parra (BA) el 26/04/14 (V. de Alba).

- Llegadas. 2 en Valdecañas de Tajo (CC) el 06/10/11 (J. Muddeman). 2 en Galisteo (CC) el 08/10/11 y uno en Piornal (CC) el 13/10/11 (J. Prieta). Uno en el Jerte, Plasencia (CC), el 02/10/12 (S. Mayordomo). El 13/10/12, más de 10 en Casas del Castañar (CC) (J. F. Sánchez) y uno en Valcorchero, Plasencia (CC) (S. Mayordomo). 2 en el puerto de Tornavacas (CC) el 18/09/13 (J. Prieta).

Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus regional. Migrante e invernante común, fluctuante (¿10.000-100.000? ejemplares), con tendencia reciente muy negativa. Subespecie *T.i.iliacus* y quizás *T.i.coburni* (Islandia).

Criterio. Observaciones de interés, fechas extremas.

- Tendencia. En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “declive fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de -31% y total de -71%. En la serie estudiada hubo un pico de abundancia en 2008, otro menor en 2010, cifras medias en 2009 y 2012 y bajas en 2011 (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “declive moderado” (-20%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Registros. Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 24/10/09 y el 01/11/10 (D. Langlois). Uno en Plasencia (CC) el 22/10/11 (J. Prieta). 5 en Villanueva de la Vera (CC) el 20/11/12 (D. Langlois). Uno en el río Jerte en Plasencia (CC) el 22/11/12 (J. Sánchez). Uno en Mérida (BA) el 14/10/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y 2 el 16/10/13 (F. Montaña). 2 en Trujillo (CC) el 31/10/13 (M. Kelsey). Uno en Pago de San Clemente (CC) el 12/03/14 (M. Kelsey). 5 en el pico Villuercas (CC) el 06/11/14 (M. Kelsey). Uno en Hornachos (BA) el 09/11/14 (M. Gálvez y J. Guerra). Uno en La Lapa (BA) el 11/11/14 (F. Montaña).

Zorzal charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus regional. Residente común (32.000 ejemplares en 2004-2006, 4% de España) con tendencia al aumento. Realiza trashumancias invernales con llegada de aves foráneas y tendencia positiva. Subespecie *T.v.viscivorus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3,8% y un aumento poblacional de +138% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento

moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +8% y total de +27% (SEO/BirdLife, 2013b).

Cetia ruiseñor (*Cettia cetti*)

Estatus regional. Residente abundante (110.000 ejemplares en 2004-2006, 3’5% de España). Tendencia al aumento. Muy sedentario. Subespecie *C.c.cetti*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,8% y un aumento poblacional de +10% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,1% y total de -2,3%; es decir, aparentemente estable (SEO/BirdLife, 2013b).

Cisticola buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus regional. Residente abundante y fluctuante (110.000 ejemplares en 2004-2006, 9% de España). Tendencia estable. Migrante parcial que en invierno se desplaza al sur (¿10.000? ejemplares), donde la tendencia es positiva. Subespecie *C.j.cisticola*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,2% y total de -23% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,5% y total de +62%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b).

Buscarla pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus regional. Migrante escasa en ambos pasos. Tendencia estable. Muy pocos registros (25), debido a su difícil detección, que no reflejan la realidad. Subespecie *L.n.naevia*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Tendencia. En Europa, origen de las aves migradoras, la tendencia es “estable” en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Paso prenupcial. Una en Villanueva de la Vera (CC) el 28/03/09 (D.

- Langlois). Una en Valcorchero, Plasencia (CC), el 21/04/09 (S. Mayordomo). Una en Arrocampo (CC) el 01/04/10 (D. Langlois y S. Langlois). Una en Villanueva de la Vera (CC) el 06/04/10 y otra el 16/04/10 (D. Langlois). Una en Ibahernando (CC) el 21/03/11 (S. Fletcher). Una en Villanueva de la Vera (CC) el 26/03/11 (D. Langlois). Una en Valcorchero, Plasencia (CC), el 13/04/11 (E. Palacios y S. Mayordomo). Una en el Guadiana, Badajoz, el 15/04/11 (J. C. Paniagua). Una en el embalse del Jerte (CC) el 22/04/11 (J. Prieta). Una en Villanueva de la Vera (CC) el 31/03/12 y el 07/04/12 (D. Langlois). Una en Plasencia (CC) el 01/04/12 (J. Prieta). Una en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 05/04/12 (J. C. Paniagua y C. Clemente). Una en Valdeastillas (CC) el 25/04/12 (J. Prieta). Una en el paseo fluvial, Plasencia (CC), el 01/04/13 (S. Mayordomo) y el 06/04/13 (J. Prieta). El 02/04/13, una en Villanueva de la Vera (CC) y otra el 30/04/13 (D. Langlois). Una en Galisteo (CC) el 30/04/13 (J. Prieta). 2 en Villanueva de la Vera (CC) el 05/04/14 y otra el 14/04/14 (D. Langlois). Una en el Guadiana (BA) el 05/04/14 (J. Guerra). Una en Galisteo (CC) el 06/04/14 y otra el 19/04/14 (S. Mayordomo). Una en Santa Cruz de Paniagua (CC) el 13/04/14 (J. C. Paniagua). Una en Casas de Belvís (CC) el 03/05/14 (J. Briz).
- Paso postnupcial. Una en Talaván (CC) el 15/08/10 (F. Rojo y S. Molano). Una muerta por impacto con una cristalera en Zafra (BA) el 30/08/11 (F. Montaña). Una anillada en el río Gargáligas, Rena (BA), el 26/08/12 (GIA Extremadura). Una en el paseo fluvial, Plasencia (CC), el 02/10/12 (S. Mayordomo). Una en Casar de Cáceres (CC) el 06/09/13 (A. Sánchez). Una insertada por un alcaudón real en el embalse de Talaván (CC) el 16/09/13 (J. Porras). Una en Piornal (CC) el 20/09/13 (J. Prieta). 2 en Arrocampo (CC) el 22/09/13 (A. Pacheco). Una anillada en el río Salor, Cáceres, el 24/09/13 (GIA Extremadura). Una en el río Almonte (CC) el 18/08/14 (J. Porras). Una en la garganta de la Serrá, a 1.900 msnm, Tornavacas (CC), el 20/08/14 (GIA Extremadura). Una en Alange (BA) el 02/09/14 (M. Gálvez). Una en Cornalvo (BA) el 21/09/14 (J. M. Benítez). Una en Arrocampo (CC) el 30/09/14 (J. Porras).

Buscarla unicolor (*Locustella luscinioides*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (100 parejas), de aparición reciente, muy localizado (embalse de Arrocampo) y con tendencia positiva. Subespecie *L.l.luscinioides*.

Criterio. Todas las observaciones, en Arrocampo sólo fenología.

- Registros fuera de Arrocampo. Una en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 03/09/10 (S. Mayordomo). Una cantando en la laguna de Galisteo (CC) el 24/06/11 (S. Mayordomo). Una en el Arroyo Rivillas,

Badajoz, el 30/08/11 (J. C. Paniagua). Una en el río Guadiloba, Cáceres, el 17/03/14 y 2 en Plasencia (CC) el 18/03/14 (J. L. Bautista).

- Llegadas a Arrocampo (CC). Una el 06/03/09 (S. Mayordomo). Varias cantando el 18/03/10 (J. Briz y V. Risco). Varias el 19/03/11 (J. Briz y Ó. J. González). Una el 08/03/12 (S. Langlois, M. García del Rey, I. Gallardo y D. Langlois). Una el 09/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Una el 13/03/14 (M. Kelsey).
- Últimos registros. Una en Arrocampo (CC) el 01/10/11 (J. Muddeman).

Zarcero bereber (*Iduna opaca*)

Estatus regional. Reprodutor muy escaso (¿20-150? parejas), no confirmado hasta 2008. Se conocen poblaciones muy pequeñas en sotos del Guadiana, sus afluentes y río Alagón.

Criterio. Todas las observaciones.

- Revisión. Aunque debe ser un reproductor habitual en Extremadura, por su escasez y difícil identificación ha pasado inadvertido: primeras citas en 1985 y 1990 (dos capturas para anillamiento; Adenex); 5 registros en 1995-2007 y primera cría confirmada en 2008 (Entrín, Badajoz). En sotos del río Guadiana, desde 2009 se observa regularmente en Badajoz y desde 2012 en Mérida (2-3 machos por localidad). En 2014 se confirma la cría por vez primera en Cáceres y en la cuenca del Tajo: 3 machos y juveniles en el río Alagón en Coria. Es probable que el área de cría sea bastante mayor, sobre todo en la cuenca del Guadiana.
- Nuevos registros. En el río Guadiana, Badajoz, 2 el 26/06/09 (J. Guerra y M. Gálvez); 2 el 30/08/10 (J. C. Paniagua); anillados un joven y 2 adultos los días 18 y 19/07/11 (A. D. Pérez); un joven que podría haber nacido en la localidad anillado el 14/07/12 (Á. T. Mejías); uno territorial el 27/05/13 y 28/05/13 (J. C. Paniagua), hasta 3 en junio de 2013 (A. Fernández, E. Palacios, J. C. Paniagua y S. Mayordomo), un adulto y un joven anillados el 10/08/13 (Á. T. Mejías, I. Jerez, J. L. Bautista y P. Herrador); un adulto y un joven el 21/06/14 y uno el 05/07/14 (J. C. Paniagua). En Mérida (BA), 2 en el embalse de Montijo, el 30/05/12 (F. Montaña, E. del Viejo y A. Ruiz), uno en el Guadiana el 13/05/13 (S. Pérez), el 14/05/13 (L. Alcántara, M. Gálvez y S. Pérez), el 30/06/13 (C. Clemente y M. García del Rey) y el 03/07/13 (A. Núñez y J. Solana); uno el 01/06/14 (F. Montaña y G. Montaña) y el 10/06/14 (M. Kelsey). 3 machos cantando en un pequeño tramo del río Alagón en Coria (CC) el 18/05/14 (J. Prieta, J. Mahillo, S. Mayordomo y E. Palacios) y 3 adultos y un joven el 02/06/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). 2 en el río Jerte, Plasencia (CC), el 24/05/14 (J. L. Bautista). Uno anillado en el río

Gargáligas, Rena (BA), el 21/06/14 (GIA-Extremadura). Uno en el embalse de Llerena (BA) el 05/07/14 (M. Corvillo).

Carricerín real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso (0-3 parejas) y muy localizado (graveras de Mérida) al menos hasta 2005. Quizás extinguido, pues no se conocen registros en la última década. Actualmente sólo llegan de modo ocasional aves en dispersión. Subespecie *A.m.melanopogon*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Río Guadiana. Uno en el Puente Viejo, Badajoz, el 02/04/11 (J. C. Paniagua).
- Arrocampo. Uno el 21/06/09 (J. J. Ramos). Uno el 17/02/11 (H. Sánchez y R. Lozano). Uno el 22/04/13 (J. Olsson, P. Wohlin, S. Carlström y T. Magnusso). Uno desde el 06/12/14 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez), al 21/12/14 (S. Mayordomo, M. Kelsey, I. Solana, C. Clemente, E. Palacios, M. R. Esteban, J. Mahillo).
- Vegas Altas. Uno en Puebla de Alcollarín (BA) el 08/01/14 (A. Gil). Uno en el arroyo Budión, Rena (BA), el 21/01/14 (L. Lozano).

Carricerín cejudo (*Acrocephalus paludicola*)

Estatus regional. Migrante muy escaso. Tres registros de aves capturadas para anillamiento en paso postnupcial en Vegas Altas del Guadiana entre 1965 y 2000. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Aves anilladas: 2 en Villanueva de la Serena en el periodo 1965-1998 (Oficina Anillamiento) y una en la década 2000 en Arroyo Budión, Rena (L. Lozano).

Carricerín común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus regional. Migrante común, más numeroso en paso prenupcial, con tendencia estable. Monotípica.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- Tendencia. En Europa, origen de las aves migradoras e invernantes, la tendencia es “estable” en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Paso prenupcial. Uno en Arrocampo (CC) el 08/03/09 (D. Langlois, I. Gallardo, M. García del Rey y S. Langlois). Uno en Talaván (CC) el

13/03/09 (S. Mayordomo). 2 en el río Gargáligas (BA) el 18/03/09 (C. Proper). Uno en Plasencia (CC) el 01/04/09 (S. Mayordomo). Uno en Arrocampo (CC) el 16/03/10 (M. Kelsey). Uno desde el puente Viejo, Badajoz, el 20/03/10 y otro el 28/03/10 (J. C. Paniagua). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 16/04/10 (S. Mayordomo). Uno en Valdefuentes, Galisteo (CC), el 20/04/10 (R. Montero). En Arrocampo (CC), uno los días 18/03/11 (S. Mayordomo), 20/03/11 (D. Langlois, J. Briz, Ó. J. González y S. Langlois) y 25/03/11 (S. Mayordomo). El 30/03/11, uno en Zorita (CC) (M. Kelsey) y 3 en Valdefuentes, Galisteo (CC) (S. Mayordomo). Uno en trugal de Campo Lugar (CC) el 7/04/11 (M. Kelsey). En el Guadiana, Badajoz, uno el 14/04/11 y dos el 23/04/11 (J. C. Paniagua). Uno en cultivo de avena en Torrequemada (CC) el 15/04/11 (S. Mayordomo). Uno en el puente romano de Mérida (BA) el 11/05/11 (M. Kelsey). Uno en Arrocampo (CC) el 29/02/12 (G. Schreur), 3 el 04/03/12 (S. Langlois y D. Langlois), uno los días 08/03/12 (S. Langlois, M. García del Rey, I. Gallardo y D. Langlois) y 13/03/12 (V. Risco, M. García del Rey, J. Briz, I. Gallardo y E. Pérez-Balsalobre), 6 el 14/03/12 (S. Mayordomo, M. Gómez y J. Prieta) y el 31/03/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Plasencia (CC) los días 14/03/12 (J. Prieta) y 22/03/12 (S. Mayordomo). En el Guadiana, Badajoz, 10 el 16/03/12 y 4 el 18/03/12 (J. C. Paniagua). En Valdefuentes, Galisteo (CC), 2 el 18/03/12 (J. Mahillo) y uno el 19/03/12 (S. Mayordomo). 2 en el Guadiana, Badajoz, los días 01/05/12 y 05/05/12 (J. C. Paniagua). Uno en Arrocampo (CC) el 04/05/12 (J. Muddeman). Presente en Morantes (BA) el 06/05/12 (P. Herrador y J. L. Bautista). 4 en Arrocampo (CC) el 05/04/13 (M. Kelsey, S. Mayordomo y S. Fletcher) y uno los días 07/04/13 (J. Prieta), 09/04/13 (J. Briz), 14/04/13 (C. Clemente y J. Mahillo), 18/04/13 (J. Prieta) y 19/04/13 (S. Mayordomo). Uno en Guareña (BA) el 25/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno anillado en el río Matachel, Alange (BA), el 07/05/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en el embalse de Brovales (BA) el 16/05/13 (F. Montaña). Uno en Arrocampo el 09/06/13 (E. Palacios y J. Mahillo). 4 en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 18/03/14 (J. Guerra) y el 27/03/14 (M. Gálvez), 2 el 28/03/14 (V. de Alba, F. Lopo, F. Montaña, A. Núñez y J. Solana) y 3 el 31/03/14 (C. Camacho, M. Gálvez y M. Kelsey). Uno en Viñuelas, Galisteo (CC) el 19/03/14 (S. Mayordomo). Uno en el Gargáligas entre Obando y Acedera (BA) el 21/03/14 (W. Haworth) y el 26/03/14 (M. Kelsey). Uno en las balsas de Sierra de Fuentes (CC) el 17/04/14 (C. Andrés). Uno en el río Jerte, Plasencia (CC), el 21/04/14 (R. Montero). Uno en el río Almonte (CC) el 02/05/14 (J. Muddeman).

- Paso postnupcial. El 12/08/09, uno en Casas de Hitos (BA-CC), (M. Kelsey) y otro en Arrocampo (CC) (S. Mayordomo). Uno en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC) el 08/08/10 y uno en Talaván (CC) el

27/08/10 (S. Mayordomo). Uno en Valdefuentes, Galisteo (CC) el 03/09/10 (E. Palacios). 2 en La Granja (CC) el 10/10/10 (R. Montero). En Valdefuentes, Galisteo (CC), 2 el 29/07/11 y uno los días 13/08/11, 31/08/11 (S. Mayordomo) y 15/10/11 (J. Prieta). Aves anilladas en el arroyo Budi3n, Rena (BA): 2 el 15/07/12, 6 el 28/07/12 y 3 el 12/08/12 (GIA Extremadura). En Valdefuentes, Galisteo (CC), 2 el 03/08/12 y uno el 27/08/12 (S. Mayordomo). Uno en la laguna de Galisteo (CC) los d3as 21/08/12, 28/08/12 y 11/09/12 (S. Mayordomo). 2 anillados en el arroyo Budi3n, Rena (BA), el 21/07/13 (GIA Extremadura). Uno en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 04/08/13 (E. Palacios, J. Prieta y S. Mayordomo). Presente en el Guadiana, Badajoz, el 08/09/13 (J. C. Paniagua). 2 anillados en el r3o Salor, C3ceres, el 27/09/13 y otros 2 el 02/10/13 (GIA Extremadura). Uno en la laguna de Galisteo (CC) el 28/07/14 (S. Mayordomo y E. Palacios) y el 05/08/14, y 2 el 17/08/14 (S. Mayordomo). Uno en Plasencia (CC) el 14/10/14 (S. Mayordomo).

Carricero com3n (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus regional. Reproductor estival com3n ($\approx 1.000-10.000?$ ejemplares en 2004-2006, $>0'1\%$ de Espa3a) con tendencia creciente y expansi3n en la cuenca del Tajo. M3s frecuente en paso, sobre todo en el postnupcial, con tendencia decreciente. Subespecie *A.s.scirpaceus*.

Criterio. Fechas extremas, cr3a en C3ceres (salvo Arrocampo).

- **Tendencia.** Seg3n el programa SACRE, la tendencia en la Regi3n Mediterr3nea Sur en el periodo 1998-2013 es "incremento moderado", con un porcentaje medio de cambio anual de $+2\%$ y un aumento poblacional de $+84\%$ (SEO/BirdLife, 2013a).
- **3poca de cr3a en la cuenca del Alag3n.** Un macho cantando en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 03/07/11 (S. Mayordomo).
- **Registro invernal.** Uno en la gravera Vi3uelas, Galisteo (CC), el 05/12/14 (S. Mayordomo).
- **Llegadas.** En Arrocampo (CC) uno el 01/03/09 (M. Kelsey y G. Schreur), el 21/03/10 (J. Briz) y el 20/03/11 (D. Langlois y S. Langlois). El 20/03/11 uno en Badajoz (J. C. Paniagua) y uno en Torviscal (BA) (L. Lozano). Varios en el embalse de Montijo (BA) el 20/03/12 (3. S3nchez). Uno en Badajoz el 27/03/12 (J. C. Paniagua). Uno en Arrocampo (CC) el 31/03/12 (S. Mayordomo). 3 en Galisteo (CC) el 01/04/12 (J. Prieta). 2 en Arrocampo (CC) el 04/04/13 (C. Clemente, M. de Gabriel y S. Briones). Uno en Monfrag3e (CC) el 18/04/13 (C. Clemente, GIA Le3n y S. Mayordomo). Uno en Zafra (BA) el 19/04/13 (F. Monta3o). 2 en Valverde de M3rida (BA) el 13/03/14 (M. G3lvez). Uno anillados en

Rena (BA) el 15/03/14 (GIA Extremadura). 2 entre Obando y Acedera (BA) el 21/03/14 (W. Haworth).

- Últimos registros. Uno Talaván (CC) el 09/10/09 y otro el 22/10/10 (S. Mayordomo). 3 en Arrocampo (CC) el 06/10/11 (J. Muddeman). En Galisteo (CC), 2 el 15/10/11 (J. Prieta), 2 el 08/10/12 y 3 el 13/10/12 (S. Mayordomo). En Plasencia (CC), uno el 17/10/13 (R. Montero y S. Mayordomo) y otro el 31/10/13 (S. Mayordomo).

Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (21.000 ejemplares en 2004-2006, 3'2% de España) con tendencia negativa. Poco frecuente en paso. Subespecie *A.a.arundinaceus*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,9% y un aumento poblacional de -13,5% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Llegadas. Uno en Arroyo de la luz (CC) el 18/04/09 (C. Fernández). 2 en Arrocampo (CC) el 10/04/10 (M. Kelsey). El 30/03/11, uno en Palazuelo (BA) (M. Kelsey) y otro en Galisteo (CC) (S. Mayordomo). En Galisteo (CC), 2 el 01/04/12 (J. Prieta) y uno el 03/04/12 (J. Mahillo y C. Clemente). Uno en Arrocampo (CC) el 04/04/12 (S. Mayordomo y J. L. Guisado). Uno en Mérida (BA) el 05/04/12 (M. Kelsey). 2 en Arrocampo (CC) el 07/04/13 (M. Á. Muñoz y F. Ramírez). Uno en Guareña (BA) el 12/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Presente en Mérida (BA) el 15/04/13 (C. Fernández, F. Montaña, J. Vázquez y V. González). Uno en Fernando V (CC) el 01/04/14 (M. Kelsey). 7 en Medina de las Torres (BA) el 09/04/14 (J. A. Delgado y F. Montaña). Uno en Montijo (BA) el 15/04/14 (P. Herrador y J. L. Bautista) y otro en Mérida (BA) (M. Gálvez, P. Goñi y J. L. Guisado).
- Últimos registros. Uno en Santa Amalia (BA) el 03/10/11 (J. Muddeman). Presente en Galisteo (CC) el 20/09/12 (J. Prieta). Uno en Arrocampo (CC) el 12/09/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Brovales (BA) el 10/09/14 (F. Montaña y J. Vázquez).

Zarcero polígota (*Hippolais polyglotta*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (250.000 ejemplares en 2004-2006, 6% de España). Tendencia creciente. Invernada excepcional (un caso). Monotípica.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4,1% y un aumento poblacional de +101% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Llegadas.** Un macho en Cañaveral (CC) el 25/04/09 (J. Prieta). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 29/04/09 (D. Langlois). Uno en Arrocampo (CC) el 05/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 16/04/10 (D. Langlois). Uno en Navalvillar de Pela (BA) el 08/04/11 (J. Muddeman). Uno en Valencia de Alcántara (CC) el 10/04/11 (J. Prieta). Uno en Mérida (BA) el 23/04/12 (G. Schreur). 2 en Valdestillas (CC) el 25/04/12 y otros 2 en Plasencia (CC) el 26/04/12 (J. Prieta). Uno en Madrigalejo (CC) el 13/04/13 (M. Kelsey). El 14/04/13, dos en Plasencia (CC) (E. Palacios, J. Prieta, M. Á. Muñoz, F. Ramírez y S. Mayordomo) y uno en Zafra (BA) (F. Montaña). Uno en Zarza de Granadilla (CC) el 13/04/14 (C. Mills y R. Montero). 2 en Montijo (BA) el 15/04/14 (P. Herrador y J. L. Bautista).
- **Últimos registros.** Uno en Torrecillas de la Tiesa (CC) el 05/10/11 (J. Muddeman). Uno en Monfragüe (CC) el 19/09/12 (S. Mayordomo). El 22/09/12, dos en Los Canchales (BA) (F. Montaña, E. Costillo y A. Núñez) y uno en Plasencia (CC) (J. Prieta). Uno en Cáceres el 23/09/13 (C. Clemente, N. Rodríguez y S. Mayordomo). Uno en Monfragüe (CC) el 25/09/13 (M. García del Rey). 2 en Brovales (BA) el 22/09/14 (F. Montaña).

Curruca rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus regional. Residente abundante (115.000 ejemplares en 2004-2006, 9% de España) con tendencia estable. En invierno llegan aves foráneas y la tendencia es negativa. Cría la subespecie *S.u.toni*, posible la invernada de *S.u.undata* y *S.u.dartfordiensis*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,5% y total de -21% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -7,5% y total de -27% (SEO/BirdLife, 2013b).

Curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus regional. Reproductora estival común (¿5.000? ejemplares) con tendencia al aumento. Subespecie *S.c.conspicillata*.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,2% y un aumento poblacional de +186% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros de interés. Un macho territorial en La Codosera (BA) el 29/04/12 (G. Schreur). Una en Piornal (CC) el 10/05/12 (J. Prieta). 2 parejas en los Llanos de Cáceres el 14/05/12 (S. Mayordomo). Una en Tierra de Barros (BA) el 18/05/12 (S. Fletcher, M. Kelsey y J. Porrás). 12 machos en La Mesa, Piornal (CC) el 19/05/12 (J. Prieta). Presente en Cabezabellosa (CC) el 20/05/12 (R. Montero), en el Puerto de Esperabán, Pinafranqueado (CC), el 23/05/12 (A. Pacheco) y en el Puerto de Tornavacas (CC) el 26/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios). Un macho en Ovejuela (CC) el 16/06/12 (A. Pacheco). 2 machos en El Brezo, Losar de la Vera (CC), el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. L. Guisado, J. Prieta y C. Clemente). 10 machos en el Pitolero, Cabezabellosa (CC), el 22/06/12 (J. Prieta). Una hembra en Piornal (CC) el 29/07/12 (L. Alcántara). El 07/04/13, dos en Jaraicejo (CC) (M. Kelsey) y 2 en Arrocampo (CC) (M. Á. Muñoz y F. Ramírez). Una pareja en Plasencia (CC) el 09/04/13 (J. Prieta). 3 en Robledillo de Gata (CC) el 21/04/13 (P. Gutiérrez).
- Llegadas. Presente en Jaraicejo (CC) el 11/04/09 (M. Kelsey). 2 machos y una hembra en Jaraicejo (CC) el 01/04/10 (T. Naturalist). Una en Zorita (CC) el 30/03/11 (M. Kelsey). 2 en Jaraicejo (CC) el 24/03/12 (J. Hawkins). Un macho en Plasencia (CC) el 29/03/12 (J. Prieta). 2 en Monfragüe (CC) el 28/03/13 (J. Porrás). Un macho entre Trujillo y Santa Marta de Magasca (CC) el 07/03/14 (J. Nolan y G. Schreur). Un macho en Monfragüe (CC) el 05/04/14 (S. Mayordomo).
- Últimos registros. Una en Monfragüe (CC) el 16/09/09 (S. Mayordomo). Una en Piornal (CC) el 13/09/12 (J. Prieta). 5 en La Aldea del Obispo (CC) el 29/08/14 (N. Renwick).

Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus regional. Reproductora estival abundante (340.000 ejemplares en 2004-2006, 6% de España). Tendencia al aumento. Subespecie *S.c.cantillans*.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3,6% y un aumento poblacional de +97% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Llegadas.** 5 machos en Monfragüe (CC) el 08/03/09 (S. Mayordomo). Un macho en Tentudía (BA) el 03/03/10 (A. Pacheco y J. Salcedo). Un macho en Monfragüe (CC) el 26/02/11 (R. Vicente). Una en Monfragüe (CC) el 14/03/12 (G. Schreur) y abundante el 16/03/12 (J. Prieta). Una en Mérida (BA) el 18/03/12 (J. Sánchez, Á. L. Sánchez y Á. Sánchez). Un macho en Monfragüe (CC) el 10/03/13 (S. Mayordomo). Una en Mérida (BA) el 12/03/13 (J. Muddeman). Una en Cáceres el 13/03/13 (J. L. Bautista). Una en Plasencia (CC) el 10/03/14 (R. Montero). Una en Monfragüe (CC) (M. Kelsey) y 2 en el puerto de Miravete (CC) el 11/03/14 (J. Nolan y G. Schreur).
- **Últimos registros.** Una en Badajoz (BA) el 02/10/10 (J. C. Paniagua). Una en Galisteo (CC) el 01/10/12 (S. Mayordomo). Una en Valdemedel, Alange (BA), el 09/10/13 (F. Crystal). Una anillada en el Azud de Badajoz el 19/10/13 (SEO-Badajoz). Un macho en Zarza de Montánchez (CC) el 05/10/14 (GIA-Extremadura).

Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus regional. Residente abundante (430.000 ejemplares en 2004-2006, 4% de España). Tendencia al aumento. Subespecie *S.m.melanocephala*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,7% y un aumento poblacional de +10% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,5% y total de +17% (SEO/BirdLife, 2013b).

Curruca mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (53.000 ejemplares en 2004-2006, 17% de España). Tendencia incierta. Monotípica.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incierta”, con un

porcentaje medio de cambio anual de +3,8% y total de -12% (SEO/BirdLife, 2013a).

- Llegadas. Una en la Portilla del Tiétar, Monfragüe (CC), el 16/03/09 y otra en Jaraicejo (CC) el 20/03/09 (M. Kelsey). 2 machos en Plasencia (CC), el 31/03/09 (S. Mayordomo). Una en Galisteo (CC) el 30/03/10 (J. Prieta). Una en Cornalvo (BA) el 10/04/10 (S. Mayordomo). Una en Montehermoso (CC) el 31/03/11 (J. Mahillo). 2 en Jaraicejo (CC) el 01/04/11 (M. Kelsey). Una en Monfragüe (CC) el 29/03/12 (J. Prieta). Una en Toril (CC) el 04/04/12 (S. Mayordomo). Un macho en Monfragüe (CC) el 05/04/13 (S. West). El 06/04/13, una en Jaraicejo (CC) (G. Schreur) y en Villarreal de San Carlos (CC) (C. Clemente y GIA-León). Una en Montehermoso (CC) el 08/04/13 (J. Mahillo). Una en Plasencia (CC), el 03/04/14 (S. Mayordomo). Una en La Albuera (BA) el 06/04/14 (L. Alcántara). Una en Monfragüe (CC) el 07/04/14 (M. Kelsey).
- Últimos registros. 2 en Ahigal (CC) el 10/09/09 (S. Mayordomo). Un macho en Valcorchero, Plasencia (CC), el 05/09/11 (S. Mayordomo).

Curruca zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus regional. Reproductor estival común (¿5.000? ejemplares, 2% de España) con tendencia estable. Poco común en paso prenupcial y abundante en postnupcial. Subespecie *S.c.communis*.

Criterio. Época de cría, fenología.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Alta Montaña en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,6% y total de +53% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Paso prenupcial. 2 machos en Piornal (CC) el 02/04/09 (J. Prieta). Un macho en Las Canteras, Trujillo (CC), el 29/03/10 y una en Arrocampo (CC) el 01/04/10 (T. Naturalist). Una en Mérida (BA) el 06/04/11 (J. Muddeman). 2 en Belén, Trujillo (CC), el 08/04/11 (S. Mayordomo). Una en el río Viar (BA) el 07/04/12 (J. Salcedo y A. Pacheco). Una en Plasencia (CC) el 15/04/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez y E. Palacios). Una en Cáceres el 21/03/13 (J. L. Bautista). Una en Malpartida de Plasencia (CC) el 29/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Una en Valdemedel, Alange (BA), el 16/04/14 (S. Díaz-Infantes, M. Gálvez, J. Guerra y M. Oro). Una en Peñas Blancas, Alange (BA), el 17/04/14 (S. Díaz-Infantes, J. G. Aparicio y J. Guerra).
- Paso postnupcial. Varias en Casas de Belvís (CC) el 19/08/09 (J. Briz). 2 en Monfragüe (CC) el 21/08/09 (J. Prieta). Una en Plasencia (CC) el 23/09/09 (S. Mayordomo). Una el 06/08/10 en Ahigal (CC) (S. Mayordomo). 2 en Casas de Hitos (BA) el 12/08/10 (M. Kelsey). Una en

Galisteo (CC) el 31/07/11 (S. Mayordomo). Una en Trujillo (CC) el 02/10/11 (J. Muddeman). Una en Badajoz el 11/11/11 (J. C. Paniagua). En Galisteo (CC), una el 01/08/12 y 2 el 11/08/12; 2 en Arrocampo (CC) el 16/08/12 (S. Mayordomo). Una en Plasencia (CC) el 02/10/12 (S. Mayordomo). Una en Belén, Trujillo (CC), el 19/10/12 (M. Kelsey). El 20/10/12, una en Alange (CC) (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez) y otra en Badajoz (J. C. Paniagua). Una en Alía (CC), el 13/08/13 (J. A. Herrera y N. Baeza). Una en Piornal (CC) el 21/08/13 (J. Prieta). El 04/10/13, una en Piornal (CC) (J. Prieta) y otra en Galisteo (CC) (C. Clemente y J. Mahillo). 3 en El Batán (CC) el 05/10/13 (R. Montero). Una en Alange (BA) el 07/10/13 (M. Gálvez). 2 en Alcollarín (CC) el 22/08/14 (S. Mayordomo). 2 en Campo Lugar (CC) el 26/08/14 (M. Kelsey).

Curruca mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus regional. Reproductora estival esporádica (¿0-50? ejemplares; sólo se conocen dos casos de cría probable en Piornal en 2006 y 2007). Escasa en paso prenupcial y abundante en el postnupcial, con tendencia decreciente. Subespecie *S.b.borin*.

Criterio. Época de cría, fenología.

- **Tendencia.** En Europa, origen de aves migradoras, la tendencia es “declive moderado”, disminuyendo el -20% en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- **Paso prenupcial.** Una en Villanueva de la Vera el 21/04/09, 2 el 23/04/09 y 3 el 26/04/09 (D. Langlois). Una en Monesterio (BA) el 23/03/2010 (A. Pacheco). Una el 20/05/10 en Villanueva de la Vera (CC) (D. Langlois). 2 en Vegas Altas (BA) el 12/04/11 (M. Kelsey). En Villanueva de la Vera (CC), una los días 16/04/11 y 17/04/11 (D. Langlois y S. Langlois); 13/04/12, 17/04/12 y 20/04/12, 2 los días 25/04/12 y 30/04/12 y una el 10/05/12 (D. Langlois). 4 en Plasencia (CC) el 15/04/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez y E. Palacios) y una el 08/05/12 (S. Mayordomo). 3 en Mérida (BA) el 12/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en La Zarza (BA) el 13/04/13 (J. Solana, J. Guerra, M. Gálvez y S. Pérez). Una en Villanueva de la Vera (CC) el 19/05/13 (D. Langlois). 4 en Alange (BA) el 13/04/14 (M. Gálvez y J. Guerra). 4 en Villanueva de la Vera el 14/04/14, una el 15/04/14 y el 22/05/14 (D. Langlois). Una en el arroyo Bonhaval (BA) el 15/04/14 (F. Bernáldez y F. Macías).
- **Paso postnupcial.** Una el 21/08/09 en Monfragüe (CC) y otra en Casas de Belvís (CC) (J. Briz). 3 en Galisteo (CC) el 29/08/09 (S. Mayordomo). Una en Pago de San Clemente (CC) el 02/11/09 (M. Kelsey). Una el 20/08/10 en Monfragüe (CC) (S. Mayordomo). 4 en Plasencia (CC) el

26/08/10 (E. Palacios y S. Mayordomo). 2 en Las Mestas (CC) el 15/08/11 (F. Martín). 2 en Tentudía (BA) el 21/08/11 (A. Pacheco). Una en Monroy (CC) el 02/10/11 (J. Muddeman). Una anillada en Mérida (BA) el 17/08/12 (DGMA). 2 anilladas en Rena (BA) el 26/08/12 (GIA Extremadura). Una en Galisteo (CC) el 08/10/12 (S. Mayordomo). Una en Alange (BA) el 15/10/12 (M. Gálvez y J. Guerra). Una en Tornavacas (CC) el 26/08/13 (J. Prieta). El 31/08/13 se observan 2 en Pago de San Clemente (CC) (M. Kelsey), una en Logrosán (CC) (C. Clemente y S. Mayordomo) y se anillan 3 en Rena (BA) (GIA-Extremadura). El 03/10/13 se anillan 2 en Cáceres (GIA-Extremadura) y se observan 4 en Alange (BA) (M. Gálvez). Una en Alía (CC) el 05/10/13 (J. Á. Herrera y N. Baeza). 2 en Barquilla de Pinares (CC) el 20/10/13 (D. Langlois y S. Langlois). Una en Pago de San Clemente (CC) el 06/08/14 (M. Kelsey). 3 en La Lapa (BA) el 31/08/14 (F. Montaña). Varias en Plasencia (CC) el 31/08/14 (J. Prieta).

Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus regional. Reproductor abundante (310.000 ejemplares en 2004-2006, 6% de España) con tendencia creciente. Muy abundante durante la invernada (varios millones), con tendencia muy positiva. Cría la subespecie *S.a.heineken*, aunque *S.a.atricapilla*, invernante, también podría criar en las zonas más altas de Cáceres.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,3% y un aumento poblacional de +133% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +14% y total de +67% (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de aves invernantes, la tendencia es “aumento moderado” (+125%) y constante en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).

Mosquitero bilistado (*Phylloscopus inornatus*)

Estatus regional. Accidental. Dos registros de un ave en Madroñera en noviembre de 2012 y dos en Mérida en noviembre de 2014.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- **Primera y segunda cita para Extremadura.** Uno en Madroñera (CC) el 12/11/12 (J. C. Molina y C. Jewitt).

Uno en Mérida (BA) el 06/11/14 (M. Gálvez y J. Guerra), el 07/11/14 (V. de Alba, J. L. Bautista, M. Gálvez, J. Guerra, J. R. Hidalgo, S. Mayordomo, F. Montaña, A. Núñez, R. Pielfort, Y. Simón y J. Solana), posiblemente 2 el 08/11/14 (L. Alcántara, F. Bernáldez) y uno 09/11/14 (J. L. Bautista, F. Bernáldez, F. Castro, E. Donaire, P. Herrador, M. Kelsey, F. Lopo, F. Macías, F. Montaña, G. Montaña e I. Sánchez).

Mosquitero de Hume (*Phylloscopus humei*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en febrero de 2006 en Villuercas.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

- Registro previo. Uno en Cabañas del Castillo el 4/02/06 (B. Small, C. Lodge y otros). Primera cita homologada en España.

Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus regional. Reproductor estival común (50.000 ejemplares en 2004-2006, 1'1% de España) con tendencia al aumento. Monotípica.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4,4% y un aumento poblacional de +140% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Llegadas. Uno en Piornal (CC) el 02/04/09 (J. Prieta). El 04/04/09, dos en Torre de Don Miguel (CC) (S. Mayordomo) y uno en Villanueva de la Vera (D. Langlois). 2 en Piornal (CC) el 05/04/10 (J. Prieta). En Villanueva de la Vera (CC) uno el 06/04/10 y el 31/03/11 (D. Langlois). Uno en Monfragüe (CC) el 25/03/12 (S. Mayordomo). 5 machos en Piornal (CC) el 02/04/12 (J. Prieta). Uno en Alange (BA) el 07/04/13 (L. Alcántara). Uno en Piornal (CC) el 12/04/13 (J. Prieta). Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 07/04/14 (J. Muddeman, D. Tyldesley y D. Tyldesley). Uno en Piornal (CC) el 08/04/14 (J. Prieta). Uno en Portanchito, Cáceres, el 09/04/14 (A. Cebrián).
- Inicio del paso postnupcial. 2 en Ahigal (CC) el 18/07/09 y 4 en Plasencia (CC) el 25/04/09 (S. Mayordomo). En Cornalvo (BA) uno el 18/07/10 (J. Ledo) y dos los días 09/07/11 y 10/07/11 (J. Ledo). En Tentudía (BA) 2 el 14/07/11 y uno el 16/07/12 (A. Pacheco). Uno capturado en un jardín en Mérida (BA) el 18/07/12 (DGMA). 3 en La Lapa (BA) el 17/07/13 (A. Núñez, F. Montaña y V. de Alba). 2 en Casar de Cáceres (CC) el 03/08/13 (A. Cebrián). 2 en Trujillanos (BA) el 20/07/14 (J. M. Benítez).

Uno anillado en Cornalvo (BA) el 26/07/14 (GIA Extremadura). Uno en La Albuera (BA) el 27/07/14 (A. Cangas, E. del Viejo, M. del Viejo y F. Montaña).

- Últimos registros. Uno en Riomalo de Abajo (CC) el 28/09/11 (A. Pacheco). Uno en Monfragüe el 19/09/12 (S. Mayordomo). Uno en Aldea del Cano (CC) el 06/09/13 (S. Mayordomo). Uno en Zafra (BA) el 11/09/14 (F. Montaña y J. Vázquez) y el 16/09/14 (F. Montaña, A. Núñez y J. Vázquez).

Mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus regional. Accidental. Tres registros publicados, el último de 1999. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Citado en Monfragüe (F. Pulido). Uno anillado por ADENEX en 1989 (J. A. Román). Uno en Alcollarín el 25/08/99 (R. Martín y S. Ramiro).

Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus regional. Reproductor escaso (¿50-500? ejemplares, <1% de España), con tendencia desconocida. Muy abundante en paso postnupcial y en invernada (más de un millón) y común en prenupcial. Tendencia invernal muy positiva. Subespecie *Ph.c.collybita*, aunque no se descarta que *abietinus* y *tristis* aparezcan accidentalmente.

Criterio. Todas las observaciones de abril a julio, fechas extremas y de interés.

- Tendencia. En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +10% y total de +34%. En 2011 se detectó un pico de abundancia por encima de lo habitual (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves invernantes y migradoras, la tendencia es “aumento moderado” (+100%) en el periodo 1980-2012, aunque con cierta estabilidad a partir de 1990 (PECBMS, 2015).
- Cantos en época de cría. En Villanueva de la Vera (CC), uno el 05/05/10, el 08/05/10 y el 19/05/10; uno a 1.300 msnm el 19/05/13; uno el 04/05/14 y el 08/05/14 (D. Langlois). Uno en el pinar de Serradilla (CC) el 19/05/10 y el 27/05/12, donde por quinto año no consecutivo se oyen machos (J. Prieta). Un macho en encinas, Arroyo Fresnedoso, Talayuela (CC), el 04/05/11 y uno en el pinar de la Dehesa de Abajo, Tornavacas

(CC), el 10/05/11 (J. Prieta). En el Guadiana, Badajoz, 3 el 01/05/12 y uno el 06/05/12 (J. C. Paniagua). Uno en Barrado (CC) el 27/05/13 (J. Prieta). 2 machos en el pinar de los Poyales, Losar de la Vera (CC), el 15/06/13 (C. Clemente, J. Prieta, M. García del Rey y J. L. Guisado). En Plasencia (CC), uno en el río Jerte el 04/05/14 (J. Prieta) y otro en Valcorchero el 07/05/14 (S. Mayordomo). Uno en Villanueva de la Sierra (CC) el 15/05/14 (C. Clemente). Uno en Ladrillar (CC) el 05/06/14 (A. Pacheco). Uno en la sierra de Tentudía entre Calera de León y Cabeza la Vaca (BA) el 10/06/14 (F. Crystal).

- Últimos registros. 2 en Villanueva de la Vera (CC) el 13/04/09 y uno el 18/04/09 (D. Langlois). Uno en Plasencia (CC) el 10/04/10 (J. Prieta). Uno en Monfragüe (CC) el 17/04/10 (SEO Cáceres). Un macho cantando en la isla del embalse de El Borbollón (CC) el 12/04/11 (J. Montero, J. Prieta y S. Mayordomo). 2 cantando en el río Guadiana, Badajoz, el 29/04/12 (J. C. Paniagua). Uno en Plasencia (CC) el 14/04/13 (E. Palacios, J. Prieta, M. Á. Muñoz, F. Ramírez y S. Mayordomo). Uno en Las Corchuelas, Monfragüe (CC), el 24/04/13 (S. Mayordomo). Uno en Alange (BA) el 28/04/13 (M. Gálvez). Uno en Alía (CC) el 17/04/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera). Uno en Serradilla (CC) el 27/04/14 (J. Prieta). Uno en Monfragüe (CC) el 30/04/14 (S. Mayordomo).
- Llegadas. Uno en Valcorchero, Plasencia (CC), el 08/10/09 (S. Mayordomo). Presente en el Azud del Guadiana, Badajoz, el 17/10/09 (J. C. Paniagua). Uno en Santa Amalia (BA) el 03/10/11 (J. Muddeman). Varios en Casas del Castañar (CC) el 06/10/11 y paso intenso por Piornal (CC) el 13/10/11 (J. Prieta). 2 en Peraleda de la Mata (CC) el 11/09/12 (V. Risco y J. Briz). Uno en Ahigal (CC) el 26/09/12 (S. Mayordomo). Uno anillado en el río Gargáligas, Rena (BA), el 28/09/13 (GIA Extremadura). El 05/10/14 varios en Zarza de Montánchez (CC) (GIA Extremadura) y uno en Oliva de Plasencia (CC) (J. Prieta). 3 en Plasencia el 06/10/14 (S. Mayordomo).

Mosquitero ibérico (*Phylloscopus ibericus*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso y localizado (¿50-250? parejas, <0'5% de España) con tendencia incierta, posiblemente en aumento. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Población reproductora. Revisión. Consideraba especie diferente desde 1996. Primera cita en Extremadura en Plasencia (CC), un ejemplar en paso en abril de 1997 (J. Prieta). Primer caso de reproducción probable en Piornal (CC), una pareja en 2001 y 2002 (J. Prieta); no se vuelve a ver en

esta localidad. En 2002 se localiza un pequeño núcleo en la Sierra de Tentudía (BA; municipios de Monesterio, Calera de León y Cabeza la Vaca), que es continuación del más extenso de Sierra Morena en Huelva (J. Prieta). Citas de machos solitarios cantando en mayo y junio en Gredos, Monfragüe y entorno y Villuercas, sin constatar reproducción ni existencia de poblaciones. En 2013 se anilló un macho adulto, posible reproductor, en La Lapa (centro de Badajoz) (GIA-Extremadura). En 2014 se localizan 3 pequeños núcleos próximos en valles de Las Hurdes, Gata y sierra de Risco Viejo, con varios machos cantando en cada uno (C. Clemente).

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +6,6% y total de +35% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Registros en época de cría. Un macho cantando en el puerto de Miravete (CC) el 24/05/11 (M. Kelsey) y otro en La Garganta (CC) el 05/06/11 (R. Montero). Un macho adulto reproductor (protuberancia cloacal marcada) es anillado en La Lapa (BA) el 05/06/13 (H. Gómez-Tejedor). 2 en Robledillo de Gata (CC) el 14/05/14 (C. Clemente) y uno dudoso con mosquitero común el 18/05/14 (A. Pacheco). 3 en Villanueva de la Sierra (CC) el 15/05/14 (C. Clemente). Uno en el Gasco (CC) el 05/06/14 (C. Clemente). Uno dudoso con mosquitero común en la sierra de Dios Padre, Santa Cruz de Paniagua (CC), el 02/07/14 (S. Mayordomo y J. C. Paniagua).
- Año 2009. En Villanueva de la Vera (CC) uno el 28/03/09, el 31/03/09 y el 02/08/09 (D. Langlois). En Monfragüe (CC) uno el 28/03/09 (Á. Díaz) y el 21/08/09 (J. Prieta) y 3 el 30/08/09 (S. Mayordomo).
- Año 2010. Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 20/03/10 (D. Langlois). Uno cantando en Galisteo (CC) el 03/09/10 (S. Mayordomo).
- Año 2011. En Villanueva de la Vera (CC), uno el 22/03/11 y 23/03/11 y 3 el 24/03/11 (D. Langlois y S. Langlois). En Monfragüe (CC), uno el 27/03/11 (E. Palacios, R. Montero y S. Mayordomo) y el 29/03/11 (J. Prieta, L. S. Cano y S. Mayordomo). Uno en el río Rucas, Palazuelo (BA), el 30/03/11 (M. Kelsey). Uno en Valdecañas (CC) el 8/04/11, otro en Casas de Hitos (BA-CC) el 24/04/11 (M. Kelsey). Uno en Galisteo (CC) el 27/07/11 (S. Mayordomo). Uno en el río Jerte, Plasencia (CC), el 28/08/11 (J. Prieta). Uno en Valdesalor (CC) los días 18/09/11 y 19/09/11 (S. Mayordomo). Uno en Ahigal (CC) el 21/09/11 (J. Prieta y S. Mayordomo).
- Año 2012. En Villanueva de la Vera (CC), uno los días 19/03/12, 21/03/12, 17/04/12 y 26/04/12 (D. Langlois). 3 en el río Jerte en Plasencia

(CC) el 22/03/12 (S. Mayordomo) y uno el 15/04/12 (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez y E. Palacios). Uno en San Vicente de Alcántara (BA) el 16/04/12 (G. Schreur). Uno en el embalse de Alange (BA) el 16/08/12 (L. Alcántara). Uno en Monfragüe (CC) el 18/08/12 (S. Mayordomo) y presente el 01/09/12 y 02/09/12 (M. Carregal y G. F. Arrojo). Posibles ejemplares en el puerto de Esperabán, Pinofranqueado (CC), el 01/09/12 (A. Pacheco). Uno en Piornal (CC) el 25/09/12 (J. Prieta).

- Año 2013. En Montehermoso (CC), uno los días 15/03/13 (J. Mahillo), 20/03/13 y 22/03/13 (C. Clemente y J. Mahillo). En Villanueva de la Vera (CC), uno el 18/03/13, el 21/03/13 y 25/03/13, 3 el 28/03/13, 5 el 30/03/13, uno el 01/04/13 y 2 el 04/04/13 (D. Langlois). En Villagonzalo (BA), uno los días 21/03/13 (M. Gálvez) y 26/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez). En Plasencia (CC), 2 el 22/03/13 (S. Mayordomo), uno el 24/03/13 (J. Prieta), 3 el 27/03/13 (S. Mayordomo), 5 los días 05/04/13 (J. Prieta) y 06/04/13 (E. Palacios y S. Mayordomo), y uno el 11/04/13 (S. Mayordomo). 2 en el Azud del Gadiana (BA) el 27/03/13 (J. P. Prieto). Uno en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 31/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Alange (BA) el 01/04/13 (J. Guerra). Uno en Mérida (BA) el 12/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en el río Ruecas, Madrigalejo (CC) el 13/04/13 y otro en Arrocampo (CC) el 14/04/13 (M. Kelsey). Uno en Plasencia (CC) el 15/08/13 (S. Mayordomo). 3 en Piornal (CC) el 21/08/13 (J. Prieta). Uno en Pago de San Clemente (CC) el 31/08/13 (M. Kelsey). Uno anillado en La Lapa (BA) el 01/09/13 (H. Gómez-Tejedor). Uno en Acehúche (CC) el 07/09/13 (M. Rodríguez). En la sierra de La Mosca, Cáceres, uno anillado el 23/09/13 y otro el 26/09/13 (GIA Extremadura). 2 anillados en el río Gargáligas, Rena (BA), el 28/09/13 (GIA Extremadura). El 04/10/13, uno en Arrocampo (CC) (J. Muddeman) y otro en Santa Marta de Magasca (CC) (M. Kelsey). Uno en Toril (CC) el 16/10/13 y otro en Galisteo (CC) el 31/10/13 (J. Prieta). Uno en Galisteo (CC) el 03/11/13 (J. Prieta y S. Mayordomo). Uno en Alange (BA) el 06/11/13 y el 13/11/13 (M. Gálvez).
- Año 2014. En Villanueva de la Vera (CC), 3 el 15/03/14, uno el 20/03/14 y el 24/03/14, y 2 el 03/04/14 (D. Langlois). 2 en Navacebreda, Plasencia (CC), el 20/03/14 (S. Mayordomo). 2 en el río Gargáligas, Vegas Altas (BA) el 26/03/14 (M. Kelsey). Uno en la gravera del Soto, Valverde de Mérida (BA), el 27/03/14 (M. Gálvez). Uno en Vegas Altas (BA) el 01/04/14 (M. Kelsey). Uno en Palazuelo (BA) el 05/04/14 (M. Kelsey). Uno en Garganta la Olla (CC) el 04/08/14 (F. Montaña). Uno en Arrocampo (CC) el 08/08/14 (S. Mayordomo).

Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus regional. Migrante común en paso prenupcial y muy abundante en paso postnupcial con tendencia decreciente. La subespecie mayoritaria es *Ph.t.trochilus*, pero por España también migran *Ph.t.acredula* y *Ph.t.yakutensis*.

Criterio. Fechas extremas, paso primaveral y observaciones de interés.

- **Tendencia.** En Europa, origen de las aves invernantes y migradoras, la tendencia es “declive moderado” (-40%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- **Paso prenupcial.** Uno en el embalse de Talaván (CC) el 13/03/09 (S. Mayordomo). En Villanueva de la Vera (CC) se observa del 19/03/09 al 03/05/09 con máximo de 18 los días 28/03/09 y 31/03/09 (D. Langlois). Uno en Jaraicejo (CC) el 15/03/10 (M. Kelsey). En Villanueva de la Vera (CC) se observa del 27/03/10 al 06/05/10 con máximo de 30 el 16/04/10 (D. Langlois). Uno en Casatejada (CC) el 18/03/11 (S. Mayordomo). En Villanueva de la Vera (CC) se observa del 25/03/11 al 30/04/11 con máximo de 7 el 30/03/11 (D. Langlois). Uno en Trujillo (CC) el 13/03/12, otro en el embalse de Talaván (CC) el 15/03/12 y 2 en Los Barruecos (CC) el 16/03/12 (G. Schreur). Uno en Villanueva de la Vera el 30/04/12 (D. Langlois). Uno en La Codosera (BA) el 12/03/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en el embalse de Talaván (CC) el 17/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno anillado en el río Gargáligas, Rena (BA), el 01/05/13 (J. García). 3 en Garganta la Olla (CC) el 06/05/13 (J. Prieta). Uno en Plasencia (CC) (S. Mayordomo) y otro en Valverde de Mérida (BA) el 13/03/14 (M. Gálvez). Uno en Arrocampo (CC) el 16/03/14 (S. Mayordomo y E. Palacios). Uno en Alía (CC) el 18/04/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera).
- **Paso postnupcial.** Uno en Talaván (CC) el 07/08/09 (G. Prescott y S. Mayordomo). 3 en Piornal el 11/08/09 (J. Prieta). Uno en El Borbollón (CC) el 31/10/09 (S. Mayordomo). 2 el 01/08/10 en Arroyo de la Luz (CC) (F. Carrero). Una en Monesterio (BA) el 03/08/10 (A. Pacheco). 2 en Talaván (CC) el 01/11/10 (A. Ceballos). Uno en Cornalvo (BA) el 27/07/11 (Á. Sánchez, I. González y J. Sánchez). Presente en Esparragalejo el 22/10/11 (J. C. Paniagua). Uno en Badajoz (BA) el 07/11/11 (J. C. Paniagua). El 02/08/12, uno en el puerto de Tornavacas (CC) (J. Prieta) y otro en Arrocampo (CC) (S. Mayordomo y J. Prieta). 3 en Piornal (CC) el 03/08/12 (J. Prieta). El 13/10/12, uno en Galisteo (CC) (S. Mayordomo) y otro en Arrocampo (CC) (M. Rodríguez y J. C. Salgado). Uno en Plasencia (CC) el 26/10/12 (S. Mayordomo). Uno en Plasencia (CC) el 22/11/12 (J. Sánchez). El 08/08/13, uno en Portaje (CC) (J. Prieta y S. Mayordomo) y otro en Vegas de Coria (CC) (A. Pacheco).

4 en Piornal (CC) el 09/08/13 (J. Prieta). En Alange (BA), 5 el 15/10/13 (M. Gálvez) y 2 el 22/10/13 (J. Guerra y M. Gálvez). Uno en Los Santos de Maimona (BA) el 08/11/13 (A. Núñez y V. de Alba). Uno en Cáceres el 01/08/14 (S. Mayordomo). Uno en Alía (CC) el 02/08/14 (N. Baeza y J. Á. Herrera). Varios en Piornal (CC) el 04/08/14 (J. Prieta). Uno en Ahigal (CC) el 01/11/14 (J. C. Paniagua).

Reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus regional. Invernante escaso y fluctuante (entre cientos y algunos miles de ejemplares) con tendencia incierta, quizás positiva. Subespecie *R.r.regulus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,7% y total de +37%; es decir, aparente aumento. En la serie estudiada se detectan picos de mayor abundancia en los años 2008 y 2012 (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de aves invernantes, la tendencia es “declive moderado” (-30%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- **Registros.** En Piornal (CC), primeros el 30/10/09 (J. Prieta); 2 el 26/10/10; 2 el 16/10/11, varios el 15/12/11; 2 el 24/02/12 (J. Prieta), 2 el 09/03/12 (G. Schreur); 2 el 26/10/12 (J. Prieta) y el 27/10/12 (M. Á. Muñoz y E. Palacios), 4 el 01/11/12 (J. Sánchez); 5 el 24/11/14 y presencia habitual durante diciembre 2014 (J. Prieta). Uno en Huerta del Cano, Calera de León (BA) el 22/02/09 (J. L. Anguita y J. Salcedo). Uno en el puerto de Perales (CC) el 22/11/09 (S. Mayordomo). En bosque mediterráneo en Monfragüe (CC), 2 el 06/11/10 (S. Mayordomo). Abundante en pinares de Las Hurdes (CC) en la 2ª semana de noviembre 2010 (A. Pacheco). 3 en Cabezabellosa (CC) el 09/11/10 (R. Montero). 2 en bosque mediterráneo en Canchos de Ramiro (CC) el 22/12/10 (R. Montero). 3 en la presa de Valdesalor (CC) el 26/12/10 (A. Ceballos). 2 en Riomalo de Abajo (CC) el 10/11/11 (A. Pacheco). Varios en un rodal de abeto en Navaconcejo (CC) el 10/12/11 (J. L. Rivero). Al menos uno en el río Ibor, Alía (CC), el 06/11/12 (N. Baeza, J. Á. Herrera y J. Cerezo). En Riomalo de Arriba (CC), 2 el 02/11/12 y 12 el 27/11/12 (A. Pacheco). 7 en La Tenzuela, Madroñera (CC), el 13/11/12 (S. Fletcher y C. Jewitt). 2 en Moheda Alta (BA) el 18/11/12 (Á. Díaz). Uno en Matallana, Alía (CC), el 08/12/12 (N. Baeza, J. Á. Herrera y J. Cerezo). 4 en Mérida (BA) el 16/12/12 (J. Solana). 2 en Zafra (BA) el 18/12/12 y el 21/11/13 (F. Montaña). En La Garganta (CC), uno los días 06/01/13 (R. Vicente) y 13/01/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M.

Á. Muñoz y S. Mayordomo) y 2 el 10/12/14 (S. Mayordomo). Uno en Zorita (CC) el 11/01/13 (J. Muddeman). 2 en Las Cansinas, Monfragüe (CC), el 15/01/13 (S. Mayordomo). 2 en Cornalvo (BA) el 26/01/13 (S. Pérez). 2 en Las Hurdes el 29/01/13 (A. Pacheco). 2 en Montehermoso (CC) el 02/02/13 (C. Clemente y J. Mahillo). Uno en el Puente de Hierro, Plasencia (CC), el 24/02/13 (S. Mayordomo). Uno en Vegas de Coria (CC) el 24/10/13 (A. Pacheco). Uno en un jardín de Don Álvaro (BA) el 01/11/13 (F. Crystal). Uno en la sierra del Ladrillar (CC) el 02/12/13 (A. Pacheco). 2 en el pinar de Granadilla (CC) el 20/01/14 (S. Mayordomo). Uno en Guadalupe (CC) el 23/11/14 (N. Renwick), el 15/12/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y el 27/12/14 (F. Bernáldez, J. Guerra y F. Macías).

Reyezuelo listado (*Regulus ignicapilla*)

Estatus regional. Reprodutor común (3.000 ejemplares en 2004-2006, <0'1% de España) con tendencia al aumento. Común en paso postnupcial y abundante en invernada (> 50.000 ejemplares) con tendencia incierta, quizás con ligero declive. Subespecie *R.i.ignicapilla*.

Criterio. Observaciones de reproducción, fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,5% y un aumento poblacional de +80% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,5% y total de -10%; es decir, aparente declive. En la serie estudiada se detectan picos de mayor abundancia alternos en los años 2008, 2010 y 2012 (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de aves invernantes, la tendencia es “estable” en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- **Reproducción.** 3 en la Almenara, Gata (CC), el 04/04/09 y uno en Valcorchero, Plasencia (CC), el 08/04/09 y el 15/04/13 (S. Mayordomo). Varios en Villanueva de la Vera (CC) el 17/04/09 y el 20/05/10 (D. Langlois). Varios adultos con pollos volantones en el puerto Nuevo, Descargamaría (CC) el 07/06/09 (S. Mayordomo). Un macho cantando en el Pinar de Serradilla (CC) el 27/05/12; primera reproducción probable en la comarca de Monfragüe (J. Prieta). Uno cantando en un pinar de Hervás (CC) el 03/06/12 (E. Palacios y S. Mayordomo). 3 en el pinar de los Poyales, Losar de la Vera (CC), el 17/06/12 (C. Clemente, J. Prieta, J. L. Guisado y S. Mayordomo). Uno en pinar en Alía (CC) el 28/04/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera y N. Baeza). Varios en el pinar de La Muela, La Garganta (CC), el 22/06/13 (J. Prieta). 3 en el pinar de Casas del Monte

(CC) el 27/06/13 (J. Prieta y S. Mayordomo).

- Últimos registros. 2 en Santibáñez el Bajo (CC) el 14/03/09 (S. Mayordomo). En Monfragüe (CC), uno el 15/03/12 (G. Schreur) y el 09/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo).
- Llegadas. 2 en Riomalo de Abajo (CC) el 08/09/10 (E. Palacios y S. Mayordomo). Uno en Casas del Castañar (CC), el 23/09/11 (J. Prieta). 2 en Valcorchero, Plasencia (CC) el 29/08/12 (S. Mayordomo).

Papamoscas gris (*Muscicapa striata*)

Estatus regional. Reproductor estival común (¿1.000-5.000? ejemplares en 2004-2006, 1'5% de España) con tendencia al aumento. Migrante común en paso prenupcial y abundante en paso postnupcial con tendencia decreciente. Subespecie *M.s.striata*.

Criterio. Observaciones de cría, fechas extremas y observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,7% y un aumento poblacional de +65% (SEO/BirdLife, 2013a).
- Llegadas. Uno en Valcorchero, Plasencia (CC), el 06/05/09 (S. Mayordomo). Presente en Montehermoso (CC) el 29/04/11 (C. Clemente) y el 01/05/11 (J. Muddeman). Uno en el río Almonte, Trujillo, el 09/05/11 (M. Kelsey). Uno en Valdesalor, Cáceres, el 22/04/12 (C. Fernández). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 25/04/12 (D. Langlois). El 29/04/12, uno en Badajoz (J. C. Paniagua) y en Majadas (CC) (S. Mayordomo y E. Palacios). 2 en Zafra (BA) el 14/04/13 (F. Montaña). Uno en la Rivera de Nogales, Torre de Miguel Sesmero (BA), el 22/04/13 (M. Gálvez). Uno en La Lapa (BA) el 23/04/13 (F. Montaña y J. Solana). Uno en La Serena (BA) el 01/05/14 (P. Bernaldez, M. Gálvez y F. Macías). Varios en Alange (BA) el 03/05/14 (M. Gálvez y J. Guerra). 2 en Higuera de Llerena (BA) el 04/05/14 (F. Montaña).
- Primeros en paso postnupcial. Uno en Piornal (CC) el 11/08/09 (J. Prieta). Uno en Cornalvo (BA) el 15/08/13 (J. Ledo y Á. Sánchez). 2 en Piornal (CC) el 21/08/13 (J. Prieta). Uno en el Puerto de Tornavacas (CC/AV) el 26/08/13 (J. Prieta). 2 en Piornal (CC) el 24/08/14 (J. Prieta). Uno en el río Jerte, Plasencia (CC), el 30/08/14 (S. Mayordomo) y varios el 31/08/14 (J. Prieta). 2 en La Lapa (BA) el 31/08/14 (F. Montaña).
- Últimos registros. Uno en Hervás (CC) el 17/10/09 (J. Prieta). Uno en Portaje (CC) el 11/10/10 (S. Mayordomo). Uno en Monfragüe (CC) el 04/10/11 y otro en Trujillo el 05/10/11 (J. Muddeman). Uno en Alange

(BA) el 20/10/12 (V. de Alba, F. Montaña y A. Núñez). Uno en Casas de Belvís (CC) el 10/11/12 (J. Briz). En Alange (BA) se observan 2 el 15/10/13 (M. Gálvez) y otros 2 el 16/10/13 (J. Guerra). Uno en Guijo de Granadilla (CC) el 26/10/13 (S. Mayordomo). Uno en Valuengo, Jerez de los Caballeros (BA), el 24/10/14 (A. Núñez).

Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus regional. Reproductor estival escaso (¿500-1.000? ejemplares) con tendencia incierta. Migrante escaso en paso prenupcial y muy abundante en paso postnupcial, con tendencia decreciente. Cría la subespecie *F.h.iberiae* y migra *F.h.hypoleuca*.

Criterio. Observaciones de cría, paso primaveral, fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “incierta” aunque el cálculo obtenido arroja un porcentaje medio de cambio anual de -4,4% (SEO/BirdLife, 2013a). En Europa, origen de las aves migradoras, la tendencia es “declive moderado” (-20%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- **Registros de cría.** Uno en el puerto de Honduras, Cabezuela del Valle (CC), y otro en Piornal el 23/04/10. En Garganta la Olla (CC), uno el 06/05/10; un macho el 15/04/11; un macho el 24/04/12; y 2 machos territoriales el 06/05/13 (J. Prieta). En Villanueva de la Vera (CC), 6 machos y una hembra el 08/05/10 (D. Langlois); 10 machos territoriales el 23/04/11 (D. Langlois y S. Langlois); una hembra el 30/04/12; 7 machos territoriales el 15/05/13 y 15 el 19/05/13 (D. Langlois). En Losar de la Vera (CC), 5 parejas en cajas-nido del pinar de los Poyales, el 17/06/12 (S. Mayordomo, J. L. Guisado, J. Prieta y C. Clemente); abundante el 11/05/13 (D. Langlois y S. Langlois) y 3 machos y una hembra el 15/06/13 (C. Clemente, J. Prieta, M. García del Rey y J. L. Guisado). Una hembra en Navaconcejo (CC) el 01/05/13 (I. Solana). Un macho cerca del Collado del Madroño, Alía (CC), el 07/05/13 (J. Cerezo, J. Á. Herrera y N. Baeza). *Reproducción a baja altitud en la sierra de la Mosca, Cáceres*: Una hembra con ceba el 09/06/14 y cebando un par de pollos volanderos el 15/06/14 (J. M. Benítez).
- **Paso prenupcial.** Un macho en Villanueva de la Vera (CC) el 11/04/09 (D. Langlois). Presente en Cabezabellosa (CC) el 21/04/09 (R. Montero). Uno en Valcorchero, Plasencia (CC), el 06/05/09 (S. Mayordomo). En La Isla, Plasencia (CC), uno el 04/04/10, 3 el 08/04/10 y uno el 09/04/10 (R. Montero). Un macho en Mérida (BA) el 6/04/11 (J. Muddeman). Un

macho en el Parque del Príncipe, Cáceres, el 10/04/11 (R. Montero). Uno en Mérida (BA) el 05/04/12 (M. Kelsey) y una pareja en La Serena (BA) el 15/04/12 (S. Villa). Un macho en Alía (CC) el 31/03/13 (J. Cerezo, J. Ángel y N. Baeza). Una hembra en Monfragüe (CC) el 05/04/13 (S. West) y el 07/04/13 (J. C. López). Uno en el paseo fluvial de Plasencia (CC) el 07/04/13 (R. Montero). Uno en Mérida (BA) el 12/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). El 14/04/13 se observa un macho en Zafra (BA) (F. Montaña) y una hembra en el cordel de Navacebrea, Plasencia (CC) (E. Palacios, J. Prieta, M. Á. Muñoz, F. Ramírez y S. Mayordomo). En el río Matachel, Alange (BA), 2 el 17/04/13 (B. Iglesias, J. Guerra y M. Gálvez) y uno el 25/04/13 (J. Guerra). En Plasencia (CC), una hembra en el camino de Gargüera el 23/04/13 y 2 machos y 3 hembras en el cordel de Navacebrea el 29/04/13 (S. Mayordomo). Uno en Rivera del Bronco, Montehermoso (CC), el 26/04/13 (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo). El 28/04/13, uno en La Lapa (BA) (F. Montaña) y 3 en Alange (BA) (M. Gálvez). Una hembra en Navaconcejo (CC) el 30/04/13 (I. Solana). 2 machos en Sierra de San Pedro (BA/CC) el 01/05/13 (J. L. Bautista y P. Herrador). Uno anillado en el río Gargáligas, Rena (BA), el 01/05/13 (GIA Extremadura). Uno en Madrigalejo (CC) el 10/04/14 (J. Muddeman, D. Tyldesley y D. Tyldesley). Un macho en Alange (BA) el 13/04/14 (M. Gálvez). Uno en el arroyo Bonhaval (BA) el 15/04/14 (F. Bernáldez y F. Macías).

- Llegadas postnupciales. Uno en Cabeza la Vaca (BA) el 01/08/09 (J. Salcedo). Uno en Piornal (CC) el 11/08/09 (J. Prieta). El 16/08/10 uno en Plasencia (CC) (J. Prieta) y otro en Jerte (CC) (B. Molina). Un macho nupcial en Cornalvo (BA) el 09/07/11 (J. Ledo). En Piornal (CC), 3 el 10/08/11 y 5 el 17/08/11 (J. Prieta). Uno en Tornavacas (CC) el 19/08/11 (B. Molina y J. Prieta). En zonas bajas, primeros el 27/08/11 en Plasencia (J. Prieta) y en Casas de Belvís el 29/08/11 (J. Briz). Uno en Piornal (CC) el 03/08/12 (J. Prieta). Uno en Pinofranqueado (CC) el 05/08/12 (A. Pacheco). Varios en Pago de San Clemente (CC) el 12/08/12 (M. Kelsey). Uno en el puerto de Tornavacas (CC) el 08/08/13 (B. Molina). Uno en Piornal (CC) el 09/08/13 (J. Prieta). El 15/08/13, uno en Plasencia (CC) (S. Mayordomo) y un macho en Cornalvo (BA) (Á. Sánchez, Á. L. Sánchez y J. Ledo). Uno en Vegas de Coria (CC) el 13/08/14 (A. Pacheco). Varios en Piornal (CC) el 19/08/14 (J. Prieta). Varios en Cornalvo (BA) el 26/08/14 (J. Ledo y Á. Sánchez).
- Últimos registros postnupciales. Varios en Hervás (CC) el 17/10/09 (J. Prieta). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 18/10/09 (D. Langlois). Varios en Plasencia (CC) el 15/10/10 (E. Palacios y S. Mayordomo) y 4 en La Albuera (BA) el 23/10/10 (J. C. Paniagua). Uno en Plasencia (CC) el 25/10/11 (R. Montero). Uno en Oliva de Mérida (BA) el 28/10/12 (F.

Crystal y E. del Viejo). Uno en Mohedas de Granadilla (CC) el 10/11/12 (F. Ruedas). Uno anillado en el río Gargáligas, Rena (BA), el 18/11/12 (GIA Extremadura). En Alange (BA), 3 el 15/10/13 (M. Gálvez) y varios el 16/10/13 (J. Guerra). 2 en Cáceres el 23/10/13 (M. Gálvez).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus regional. Reproductor estival muy escaso (2-10 parejas) de reciente aparición y limitado al embalse de Arrocampo, con primera cita en 2002 y donde tienen lugar todas las observaciones posteriores. Tres registros entre 1966 y 1996. Subespecie *P.b.biarmicus*.

Criterio. Todas las observaciones, excepto Arrocampo (sólo de interés).

- Registros previos. Tres en Arroyo de la Luz en 12/1966 (F. Bernis). Quince en Villanueva de la Serena en 02/1967 (J. L. Pérez Chiscano). Un macho y dos hembras en Mérida el 06/03/96 (J. M. Benítez).
- Embalse de Arrocampo. Observación habitual en este embalse durante todo el año aunque en bajo número; el grupo mayor observado era de 5 ejemplares. Una hembra entra con ceba a un macizo de espadañas cerca del observatorio nº 4 del embalse de Arrocampo (CC) el 03/06/11 (J. Hawkins). *Se trata de la primera observación de cría segura en la localidad.*

Mito común (*Aegithalos caudatus*)

Estatus regional. Residente muy abundante (500.000 ejemplares en 2004-2006, 7% de España). Tendencia estable. En invierno llegan pocos ejemplares de fuera. Subespecie *A.c.irbii*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,4% y total de +21% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de cero% y total de +11%; es decir, aparente estabilidad (SEO/BirdLife, 2013b).

Herrerillo capuchino (*Lophophanes cristatus*)

Estatus regional. Residente común (25.000 ejemplares en 2004-2006, 1,2% de España) con tendencia estable. Invernada moderada con tendencia

estable. Cría la subespecie *P.c.weigoldi*, en invierno podrían llegar otras razas (*mitratus* del norte ibérico, *cristatus* de Centroeuropa).

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1% y total de +15% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2% y total de +3%; es decir, aparente estabilidad (SEO/BirdLife, 2013b).

Carbonero garrapinos (*Periparus ater*)

Estatus regional. Residente común (6.300 ejemplares en 2004-2006, <0'1% de España) con tendencia al aumento. Invernada moderada con tendencia incierta, posiblemente negativa. Cría la subespecie *P.a.vierae*, en invierno podría llegar *P.a.ater*.

Criterio. Observaciones fuera del Sistema Central y Villuercas y de otro interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Alta Montaña en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,6% y un aumento poblacional de +14% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -3,4% y total de -14% (SEO/BirdLife, 2013b).
- **Registros de invernada en Badajoz.** Uno en el pinar de los Valencines, La Zarza (BA), el 18/11/14 (M. Gálvez).

Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*)

Estatus regional. Residente muy abundante (2.500.000 ejemplares en 2004-2006, 19% de España). Séptima especie de ave más numerosa. Tendencia al aumento. Efectúa movimientos de corto alcance. Cría la subespecie *P.c.ogliastrae*, en invierno podría aparecer *P.c.caeruleus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,2% y total de -2% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2% y total de +5%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b).

Carbonero común (*Parus major*)

Estatus regional. Residente muy abundante (1.100.000 ejemplares en 2004-2006, 10% de España). Tendencia creciente. Efectúa movimientos de corto alcance. Cría la subespecie *P.m.corsus*, en invierno podría aparecer *P.m.major*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,8% y un aumento poblacional de +41% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,5% y total de +1,5% (SEO/BirdLife, 2013b).

Trepador azul (*Sitta europaea*)

Estatus regional. Residente abundante (130.000 ejemplares en 2004-2006, 12% de España). Tendencia al aumento. Subespecie *S.e.hispaniensis*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4,4% y un aumento poblacional de +120% (SEO/BirdLife, 2013a).

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Estatus regional. Invernante muy escaso (<50 ejemplares). 20 registros, siete de ellos en Villuercas y cinco en Monfragüe, entre octubre y marzo. Subespecie *T.m.muraria*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. En el Salto del Gitano, Monfragüe, uno el 25/10/89 (J. A. Ojalvo) y el 11/01/89 (A. Parker). Uno en Alange en 03/1991 (G. Schreur). Uno el 20/10/99 en Hornachos (G. Schreur). Uno atropellado y anillado en Picos de Europa en Cañamero el 1/01/05 (D. Peña y GIA-León). En Puerto Peña, sin fecha (A. Fernández). Uno en Navezuelas el 9/02/04 (J. Cerezo) y 4 en Valencia de Alcántara el 29/02/04 (F. Ferri y F. Mateos). En 01/2007, uno en Villuercas (DGMA). En el Pico Villuercas: uno el 7/01/08 y 19/01/08 (M. Kelsey), dos el 21/03/08 (R. Cabo) y un macho el 30/03/08 (J. Muddeman). Uno el 7/11/08 en el Castillo de Trujillo (I. Yúfera y J. Saiz).
- Nuevos registros. Un ave en Monfragüe (CC) el 11/10/10 (T. Marbett y

G. Marbett). 2 en Puerto Peña (BA) el 27/11/11 (A. Vivas). Uno en Puerto Roque, Valencia de Alcántara (CC), el 13/03/12 (J. C. Jiménez). Uno en el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 10/01/13 (J. L. Rivero) y otro el 28/02/13 (R. Belenguer). Uno en Oliva de Mérida (BA) el 31/12/14 (J. Elías).

Agateador europeo (*Certhia brachydactyla*)

Estatus regional. Residente muy abundante (650.000 ejemplares en 2004-2006, 14% de España) con tendencia estable o positiva. En invierno efectúa movimientos altitudinales y quizá haya migración parcial. Subespecie *C.c.brachydactyla*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,7% y un aumento poblacional de +64% (SEO/BirdLife, 2013a).

Pájaro-moscón europeo (*Remiz pendulinus*)

Estatus regional. Residente escaso (¿500-1.000? parejas) con tendencia regional posiblemente estable y aumento en Cáceres. Común en paso e invernada (¿10.000? ejemplares), con llegada de aves foráneas. Subespecie *R.p.pendulinus*.

Criterio. Nuevas localidades de cría y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “creciente” con un porcentaje medio de cambio anual del 7,8% (SEO/BirdLife, 2013a).

Oropéndola europea (*Oriolus oriolus*)

Estatus regional. Reproductor estival abundante (220.000 ejemplares en 2004-2006, 10% de España). Tendencia creciente. Presencia invernal excepcional. Subespecie *O.o.oriolus*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,9% y un aumento poblacional de +48% (SEO/BirdLife, 2013a).

- Llegadas. Una en Villanueva de la Vera (CC) el 11/04/09 (D. Langlois). 2 en Serradilla (CC) el 14/04/09 (J. Prieta). Una en la Portilla del Tiétar, Monfrüe (CC), el 02/04/10 y otra en la sierra de San Pedro (BA/CC) el 03/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). 2 en Villanueva de la Vera (CC) el 11/04/11 (D. Langlois). Una en Casas del Castañar (CC) el 13/04/11 (J. Prieta). El 15/04/12, una en Villanueva de la Vera (CC) (D. Langlois) y 2 en Casas del Castañar (CC) (S. Mayordomo, M. Á. Muñoz, J. Prieta, F. Ramírez y E. Palacios). 3 en Valencia de Alcántara (CC) el 16/04/12 (G. Schreur). Una en Aceituna (CC) el 06/04/13 (A. Pacheco). Una en Villanueva de la Vera (CC) el 07/04/13 (D. Langlois). Una en Plasencia (CC) el 13/04/13 (J. Prieta). 2 en Alange (BA) el 29/03/14 (E. Amengual y M. Gálvez). Un macho en La Lapa (BA) el 30/03/14 (F. Montaña).
- Últimos registros. 2 machos en Valdesalor (CC) el 13/09/09 (C. Fernández). Un macho en Casas del Castañar (CC) el 03/09/10 (J. Prieta). Una en Toril (CC) el 11/09/11 (J. Porras). Una en Plasencia (CC) el 10/09/12 (S. Mayordomo). Un macho en Valuengo (BA) el 05/09/13 (J. C. Delgado). Una en Acehúche (CC) el 11/09/13 (M. Rodríguez). Una en Jerez de los Caballeros (BA) el 18/09/13 (J. A. Román). Una en Villanueva de la Vera (CC) el 01/09/14 (D. Langlois). Un macho en Plasencia (CC) el 12/09/14 (S. Mayordomo y E. Palacios).

Alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus regional. Reproductor muy escaso de reciente aparición (10-20 parejas), en aumento y con tendencia expansiva. Primera cita en 1985, primera reproducción en Extremadura en 2012. Excepcional en migración. Subespecie *L.c.collurio*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Tendencia. En aumento en Extremadura. Desde el descubrimiento de un núcleo en el puerto de Tornavacas ha colonizado nuevas zonas en el entorno del pueblo La Garganta y en la Garganta de la Serrá (Tornavacas), con citas sin indicios de cría en otros cuatro puntos del Valle del Jerte y La Vera. Esto contrasta con el declive detectado por el programa SACRE para el conjunto de España y en concreto en la Región Alta Montaña (-63%) donde se englobarían las poblaciones extremeñas (SEO/BirdLife, 2013a).
- Reproducción. En el Puerto de Tornavacas (AV/CC), un macho el 20/05/09 (J. Prieta), 2 parejas y 5 jóvenes el 25/07/09 (D. Langlois y S. Langlois) y 2 parejas y 6 jóvenes el 27/07/09 (F. Carrero); un macho el 06/06/10 (D. Langlois y S. Langlois) y 1 macho, 2 hembras y 8 jóvenes el

31/07/10, uno joven en territorio cacereño (E. Palacios y S. Mayordomo); una hembra el 01/06/11 (I. Solana), una pareja el 25/06/11 (E. Palacios y S. Mayordomo), 7 juveniles, 3 en el lado cacereño, el 19/08/11 (B. Molina y J. Prieta) y 3 jóvenes en el lado cacereño el 30/08/11 (J. Prieta); una pareja el 26/05/12 (S. Mayordomo y E. Palacios) y 3 territorios el 02/08/12, uno con 2 jóvenes en el lado cacereño, donde podría estar el nido y los otros en el lado abulense, con 2 jóvenes y una pareja de adultos respectivamente (J. Prieta); una pareja el 15/05/13 (C. Clemente y S. Mayordomo), un macho el 24/05/13 (M. Gálvez) y el 25/05/13 (M. Kelsey), presente el 26/05/13 (Á. Sánchez), 2 machos el 15/06/13 (E. Palacios y S. Mayordomo), 2 parejas y un pollo el 26/06/13 (C. Clemente y J. Mahillo) y 2 machos el 16/07/13 (L. Alcántara); un macho el 29/05/14 (M. Kelsey), un macho el 21/06/14 (J. Prieta) y una pareja con pollos el 26/07/14 (F. Bernáldez, F. Macías y R. Montero). *Nueva localidad*: un macho en el castañar del Lomo, La Garganta (CC), el 16/06/11 (R. Coastwoth y R. Montero); un macho el 07/06/13 (C. Clemente), 2 machos y una hembra el 22/06/13 (J. Prieta), presente el 02/07/13 (R. Montero) y se observan 2 hembras, un macho y al menos 10 jóvenes el 22/07/13 (C. Clemente, J. C. Paniagia y S. Mayordomo); un macho el 08/06/14 (S. Mayordomo y E. Palacios), el 15/06/14 (R. Montero), el 21/06/14 (V. de Alba y A. Núñez) y el 28/06/14 (F. Bernáldez, F. Macías y R. Montero), y un adulto y un pollo el 25/07/14 (F. Bernáldez, F. Macías y R. Montero). Dehesa de las Angosturas, Tornavacas (CC), a 1.700 msnm una pareja de adultos el 05/08/04 (A. Gil) y un macho y un joven del año el 14/08/14 (GIA Extremadura). Una hembra en la sierra de Tormantos, Piornal-Navaconcejo (CC), el 22/05/13 (I. Solana, J. Prieta y S. Mayordomo). Presente en la garganta de San Martín, Tornavacas (CC), el 26/05/13 (I. Solana). Un macho en el Trabuquete, Guijo de Santa Bárbara (CC) el 05/08/14 (F. Montaña).

Alcaudón real (*Lanius meridionalis*)

Estatus regional. Residente abundante (250.000 ejemplares en 2004-2006, 26% de España). Tendencia decreciente. Subespecie *L.m.meridionalis*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,8% y una reducción poblacional de -6% (SEO/BirdLife, 2013a).

Alcaudón común (*Lanius senator*)

Estatus regional. Reproductor estival muy abundante (1.500.000 ejemplares en 2004-2006, 33% de España) con tendencia en declive. Subespecie *L.s.rutilans*.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de $-2,6\%$ y una reducción poblacional de -34% (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Citas entre octubre y enero.** Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 18/11/09 (M. Kelsey). Uno en el embalse del Salor (CC) el 25/11/12 (A. Ceballos). Uno en Casatejada (CC) el 26/01/13 (D. Langlois y S. Langlois). Uno en Cáceres el 30/01/13 (Á. Sánchez). Un adulto en Los Canchales (BA) el 10/10/13 (S. Pérez) y otro adulto en los llanos de Cáceres el 20/10/13 (C. Fernández). Un adulto en Monfragüe (CC) el 16/10/14 (M. García del Rey). Un adulto en Los Barruecos (CC) el 25/10/14 (S. Molano).
- **Llegadas.** Uno en Arrocampo (CC) el 08/03/09 (D. Langlois y S. Langlois). Uno en Plasencia (CC) el 13/03/09 (J. Prieta). Uno en Santa Amalia (BA) el 07/02/10 (F. Yuste). Uno en Badajoz el 07/03/10 (J. C. Paniagua). En Esparragalejo (BA), uno el 10/03/11 y el 12/03/11 (Á. L. Sánchez). Uno en Cáceres el 13/03/11 (F. J. Caballero). En Cáceres, uno los días 03/03/12 (J. Porrás y G. Schreur) y 11/03/12 (G. Schreur). Uno en Hinojosa del Valle (BA) el 11/03/12 (V. de Alba y A. Núñez). Uno en Monroy (CC) el 13/03/12 (G. Schreur). Uno entre Cáceres y Trujillo (CC) el 07/03/13 (M. Kelsey). Uno en Montehermoso (CC) el 12/03/13 (C. Clemente y J. Mahillo). El 14/03/13, un macho en Monfragüe (CC) (M. García del Rey y S. Mayordomo) y otro en Cáceres (J. Muddeman). Uno en Acehúche (CC) el 09/03/14 (M. Rodríguez). Uno en La Albuera (BA) el 10/03/14 (A. Cama, M. Gálvez, J. Guerra y M. Pauly). Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 11/03/14 (J. Muddeman).
- **Últimos registros.** Un joven en Portaje (CC) el 19/09/09 (C. Clemente y J. Mahillo). Un joven en Toril (CC) el 12/09/10 (E. Palacios). 2 jóvenes en Zorita (CC) el 16/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). 2 en Valdesalor (CC) el 18/09/11 (S. Mayordomo). 2 jóvenes en Plasencia (CC) el 17/09/12 y otro en Galisteo (CC) el 18/09/12 (S. Mayordomo). Un joven en Toril (CC) el 26/09/12 (M. García del Rey). Un joven en Fregenal de la Sierra (BA) el 06/09/13 (J. C. Delgado). Un joven anillado en el río Salor, Cáceres, el 10/09/13 (GIA Extremadura). Un joven en Oliva de Plasencia (CC) el 15/09/13 (J. Prieta). Un joven en Alcollarín (CC) el 13/09/14 (C. Clemente y S. Mayordomo). Un joven en Los Canchales (BA) el 17/09/14 (M. Gálvez y J. Guerra).

Arrendajo euroasiático (*Garrulus glandarius*)

Estatus regional. Residente abundante (180.000 ejemplares en 2004-2006, 7% de España). Tendencia al aumento. Subespecie *G.g.fasciatus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,1% y un aumento poblacional de +25% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, el cambio en el periodo 2008-2013 es de +24%, igual al de primavera (SEO/BirdLife, 2013b).

Rabilargo ibérico (*Cyanopica cooki*)

Estatus regional. Residente muy abundante (2.200.000 ejemplares en 2004-2006, 35% de España). Octava especie de ave más numerosa. Tendencia creciente. Subespecie *C.c.cooki*.

Criterio. Observaciones de interés, dormideros.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,4% y un aumento poblacional de +46% (SEO/BirdLife, 2013a).

Urraca común (*Pica pica*)

Estatus regional. Residente abundante (300.000 ejemplares en 2004-2006, 5% de España). Tendencia estable. Subespecie *P.p.melanotos*.

Criterio. Observaciones de interés, dormideros.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,3% y un aumento poblacional de +4,4% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,6% y total de -6% (SEO/BirdLife, 2013b).

Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus regional. Residente escasa y localizada (150-400 parejas). Tendencia posiblemente creciente. Subespecie *P.p.erythroramphos*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3,1% y un aumento poblacional de +81%. En zonas de alta montaña el aumento es incluso mayor (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Año 2009.** 8 en el castillo de Monfragüe (CC) el 13/02/09 (S. Mayordomo). 2 en Malcocinado (BA) el 13/02/09 (R. Montero). 2 en sierra de Gata (CC) el 30/05/09 (SEO Cáceres) y 4 el 31/05/09 (C. Clemente).
- **Año 2010.** 4 en Los Ibores (CC) el 12/10/10 (J. Briz y V. Risco). 4 en Llerena (BA) el 18/10/10 (A. Núñez). Una en el vertedero de Mirabel (CC) el 07/11/10 (S. Mayordomo). Una en San Vicente de Alcántara (BA) el 28/11/10 (J. Gordillo).
- **Año 2011.** 5 en Puebla del Maestre (BA) el 18/02/11 (A. Pacheco). 2 en Puerto Peña (BA) el 26/02/11 (R. Romero). 2 en Llerena (BA) el 06/03/11, el 04/09/11 (A. Núñez) y el 26/11/11 (A. Núñez, J. Solana y V. de Alba). 2 parejas en Usagre (BA) el 21/03/11 (Á. Sánchez). 10 en Ahillones (BA) el 13/10/11 (A. Núñez). 8 en el Pitolero, Cabezabellosa (CC), el 21/11/11 (R. Montero).
- **Año 2012.** En Montemolín (BA), 2 en la mina de la Albuera, el 8/01/12 y 2 en la Senda el 20/12/12 (A. Pacheco). 6 en Llerena (BA) el 19/02/12 y 2 el 21/02/12 (A. Núñez y V. de Alba).
- **Año 2013.** 2 en La Garganta (CC) el 06/01/13 (R. Vicente). 2 en Llerena (BA) el 24/03/13 (A. Núñez y V. de Alba). Una en Monesterio (BA) el 02/05/13 (A. Pacheco). Más de 40 en Hornachos (BA) el 16/06/13 (L. Alcántara). 2 en Villanueva de la Vera (CC) el 15/10/13 (D. Langlois). Una en sierra de Gata (CC) el 19/11/13 (G. Naharro).
- **Año 2014.** Una en Alcántara (CC) el 27/01/14 (G. Schreur y J. Tarrío). Una pareja en Montemolín (BA) el 01/05/14 (A. Pacheco). Grupo de 112 en Hornachos (BA) el 08/08/14 (R. Vicente). 32 en Llerena (BA) el 10/10/14 (F. Montaña y A. Núñez).

Grajilla occidental (*Corvus monedula*)

Estatus regional. Residente abundante (¿50.000? ejemplares). Tendencia decreciente con reducción del área de ocupación. Subespecie *G.m.spermologus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un

porcentaje medio de cambio anual de $-0,1\%$ y una reducción de -4% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto” (SEO/BirdLife, 2013b).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus regional. Accidental. Invernante regular extinguida. Dos citas recientes en febrero: 1997 (Oliva de Mérida) y 2008 (Trujillo).

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Grupo en Oliva de Mérida el 13/02/97 (Á. Zarallo, F. Montañó y R. Vázquez). Nueve en vuelo al norte en Trujillo el 15/02/08 (C. Jewitt y M. Jewitt).

Corneja negra (*Corvus corone*)

Estatus regional. Residente común (≈ 500 ejemplares, $<1\%$ de España) con tendencia estable. Subespecie *C.c.corone*.

Criterio. Todas las observaciones (en Gredos y Hurdes, sólo de interés).

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de $-0,7\%$ y total de -15% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de $+4\%$ y total de -3% ; es decir, aparentemente estable (SEO/BirdLife, 2013b).
- Badajoz: 2 en Albuquerque (BA) el 03/04/10 (J. Guerra y M. Gálvez). Una en Calamonte (BA) el 23/12/12 (J. Guerra). Posible reproducción en Cornalvo (BA) en abril de 2013 (D. Recio). Una en Alange (BA) el 15/10/13 (J. Guerra). 3 en el río Matachel (BA) el 11/01/14 (A. Núñez y V. de Alba). 2 en Mérida (BA) el 27/02/14 y una en Valverde de Mérida (BA) el 18/03/14 (J. Guerra). Una portando material en el prado de Lácara (BA) el 19/04/14 (J. G. Aparicio). 5 en Gévora, Badajoz, el 20/12/14 (P. Mendoza y J. C. Paniagua).
- Centro y sur de Cáceres: Una en Madrigalejo (CC) el 28/02/09 (M. Á. Muñoz y F. Ramírez). Una en Santa Marta de Magasca (CC) el 18/11/09 (M. Kelsey). Una en Valencia de Alcántara (CC) el 21/05/13 (F. Crystal). 2 en Cáceres el 25/09/13 (N. Rodríguez). Una entre Cedillo y Herrera de Alcántara (CC) el 18/01/14 (G. Schreur y P. Schreur). Una en Trujillo (CC) el 29/04/14 (G. Schreur).
- Norte de Cáceres (registros de interés): Una pareja aportando material a un nido en el pinar de Talayuela (CC) el 15/03/11 (J. Prieta y S.

Mayordomo). 30 en una carroñada en Riomalo de Abajo (CC) el 07/02/12 y **42** el 21/03/12 (A. Pacheco); *mayor grupo registrado en Extremadura*. Una en la Raña, Alía (CC), el 17/08/12. (N. Baeza, J. Á. Herrera y J. Cerezo); *primera cita para las Villuercas*.

Cuervo grande (*Corvus corax*)

Estatus regional. Residente común (36.000 ejemplares en 2004-2006, 15% de España). Tendencia al aumento. Subespecie *C.c.hispanus*.

Criterio. Observaciones de interés y cifras destacadas.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2% y un aumento poblacional de +96% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,8% y total de +15%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b).
- Registros de interés. Dormidero con unos 300 en Tentudía (BA) el 21/08/11 (A. Pacheco).

Estornino negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus regional. Residente muy abundante (9.400.000 ejemplares en 2004-2006, 18% de España). Segunda especie de ave más numerosa. Tendencia creciente. Monotípica.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,9% y un aumento poblacional de +38% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +12% y total de +30% (SEO/BirdLife, 2013b).

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus regional. Invernante abundante (¿50.000-200.000? ejemplares) con tendencia muy positiva. Citas estivales esporádicas. Subespecie *S.v.vulgaris*.

Criterio. Fenología y observaciones de interés.

- **Tendencia.** En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +20% y total de +170% (SEO/BirdLife, 2013b). Este dato contrasta con los obtenidos en Europa, origen de las aves invernantes, con tendencia “declive moderado” (-40%) en el periodo 1980-2012, aunque con cierta estabilidad desde 1990 (PECBMS, 2015).
- **Llegadas.** Varios en Guijo de Coria (CC) el 14/10/09 (J. Prieta). 15 en Guijo de Coria (CC) el 13/10/10 (J. Prieta). 3 en Plasencia (CC) el 22/10/11 (J. Prieta). 3 en Galisteo (CC) el 31/10/11 (S. Mayordomo). 2 en Arrocampo (CC) el 11/10/12 (R. Vicente). Uno en La Isla, Plasencia (CC), el 22/10/12 (S. Mayordomo). Uno en Arrocampo (CC) el 10/10/13 (J. Sánchez y J. L. Bautista). Uno en Valverde de Mérida (BA) el 12/10/13 (F. Crystal). Uno en Plasencia (CC) el 15/10/13 (J. Prieta). 3 en Los Canchales (BA) el 06/09/14 (M. Gálvez, J. Guerra, M. Infantes y M. Oro).

Estornino rosado (*Pastor roseus*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en de mayo de 1971 en Cáceres. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Registro previo.** Un macho en Cáceres en mayo de 1971 (P. Weickert, C. König, J. M. Rubio y M. Leal).

Gorrión común (*Passer domesticus*)

Estatus regional. Residente muy abundante (21.000.000 ejemplares en 2004-2006, 13% de España). Especie más numerosa. Tendencia en ligero declive. Subespecie *P.d.balearoibericus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,8% y declive poblacional de -2,6% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,1% y total de +7% (SEO/BirdLife, 2013b).

Gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus regional. Residente muy abundante (2.200.000 ejemplares en 2004-2006, 70% de España). Novena especie de ave más numerosa. Tendencia positiva. Subespecie *P.h.hispaniolensis*. Hibrida con *P.domesticus* (2% de la población).

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,9% y un aumento poblacional de +15% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +4% y un aumento poblacional de +6%; es decir, con posible aumento (SEO/BirdLife, 2013b).

Gorrión molinero (*Passer montanus*)

Estatus regional. Residente abundante (57.000 ejemplares en 2004-2006, 1'3% de España). Tendencia decreciente tanto en primavera como en invierno. Subespecie *P.m.montanus*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2,8% y un aumento poblacional de -14% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de -8% y total de -32%; es decir, aparente declive (SEO/BirdLife, 2013b).

Gorrión chillón (*Petronia petronia*)

Estatus regional. Residente abundante (170.000 ejemplares en 2004-2006, 5% de España) con tendencia al aumento. Subespecie *P.p.petronia*.

Criterio. Nueva localidades de cría y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,5% y un aumento poblacional de +82% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con

un porcentaje medio de cambio anual de +3% y total de -9% (SEO/BirdLife, 2013b).

- Registros de interés. 2 parejas a 1.050 msnm en el Pitolero, Cabezabellosa (CC) el 11/05/13 (J. Prieta). Dormidero urbano en el recinto ferial de Plasencia (CC), ocupando plátanos de sombra, con más de 500 ejemplares en diciembre-enero de 2013-2014 y 2014-2015 (J. Prieta).

Gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus regional. Accidental. Un registro en Acebo en febrero de 2014.

Criterio. Todas las citas recibidas.

- Primer registro para Extremadura. Uno en el pico Jálama, Acebo (CC), el 19/02/14 (A. Gil) y el 23/02/14 (C. Clemente y S. Mayordomo).

Obispo coronigualdo (*Euplectes afer*)

Estatus regional. Especie exótica naturalizada. Colonizador reciente. Pequeña población inicial cerca de Badajoz capital en expansión hacia el Este siguiendo las vegas del Guadiana (al menos hasta Montijo). Mayor registro de un grupo de 200 ejemplares en Badajoz. La población regional actual se estima en varios cientos. Raza desconocida. También denominado “tejedor amarillo”.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros. En el Puente de Palmas, río Guadiana, Badajoz (BA), se observan 12 el 18/09/11, 20 el 24/09/11 y un macho el 05/07/14 (J. C. Paniagua). En los arrozales entre Gévora y Valdeboítoa (BA), 2 machos el 18/08/12 y un macho y 2 hembras el 23/08/12 (A. Fernández). Un macho en Montijo (BA) el 19/08/12 (Á. Sánchez). Uno en los arrozales de Guadiana del Caudillo (BA) el 11/09/12, el 19/10/12 (P. Herrador), un macho el 10/06/14 y el 11/09/14, y 7 el 30/11/14 (J. L. Bautista).

Estrilda común (*Estrilda astrild*)

Estatus regional. Especie exótica naturalizada. Residente común (>10.000 ejemplares) con tendencia positiva y expansiva. De las 16 subespecies descritas se considera que *E.a.jagoensis* es la introducida en Europa. También denominado “pico de coral común”.

Criterio. Nuevas localidades de cría y observaciones de interés.

- Expansión al norte del río Tajo. 2 en la laguna del Gañán, Guijo de Coria (CC) el 08/08/09 y el 28/10/10 (S. Mayordomo). 20 en Ahigal (CC) el 02/01/10 y 15 el 06/08/11 (J. C. Paniagua). 4 en La Granja (CC) el 05/04/10 y el 30/04/10 (R. Montero). Primeras observaciones en Galisteo (CC): 6 en el arrozal y 2 en la laguna el 22/08/10 (M. García del Rey y S. Mayordomo), varios en la gravera Valdefuentes el 19/10/10 (R. Montero) y 50 el 15/11/12 (J. Prieta). En el río Jerte, Plasencia (CC), 6 el 01/10/10 (R. Montero) y otros 6 en la cola del embalse del Jerte (CC) el 10/09/14 (J. Prieta). En Montehermoso (CC) 30 en retamar-olivar el 21/01/12 y 40 en regadíos el 11/10/12 (J. Mahillo), 30 el 26/01/13 (C. Clemente y J. Mahillo) y 15 el 27/03/13 (C. Clemente). 5 en Arrocampo (CC) el 05/08/12 (M. García del Rey y J. Briz). Uno en Torrejuncillo (CC) el 06/05/14 y 6 en el río Eljas, Eljas (CC), el 28/05/14 (S. Mayordomo).
- Otros registros de interés. Nueva zona de cría: En la Ribera de los Limonetes-Nogales, Torre de Miguel Sesmero (BA), se observan 9 el 15/09/11, 7, uno de ellos con material para el nido, el 18/09/11 y 3, uno con material, el 20/09/11 (J. Guerra y M. Gálvez). 8 en el embalse de Talaván (CC) el 25/09/13 (M. Kelsey), 5 el 25/09/14 (R. Montero) y 7 el 27/09/14 (J. M. Jiménez).

Bengalí rojo (*Amandava amandava*)

Estatus regional. Especie exótica naturalizada. Residente común (>15.000 ejemplares) con tendencia positiva y expansiva. Subespecie *A.a.amandava*.

Criterio. Nuevas localidades y observaciones de interés.

- Registros de interés. Citas en Jerez de los Caballeros (BA), un macho, hembra y posible joven, en regadíos de Valuengo el 07/12/13 (J. C. Delgado) y 6 adultos en el embalse de Brovales el 23/12/13 (F. Montaña). Un juvenil en Puebla de Alcollarín (BA) el 12/01/14 (L. Alcántara).

Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus regional. Residente muy abundante (2.100.000 ejemplares en 2004-2006, 11% de España) con tendencia creciente. Décima especie de ave más numerosa. Migrador parcial con llegada numerosa de invernantes (varios millones) con tendencia muy positiva. Cría la subespecie *F.c.balearica*, en invierno *F.c.coelebs*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3,6% y un aumento

poblacional de +110% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +14% y total de +66% (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de aves invernantes, la tendencia es “aumento moderado” (+10%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).

Pinzón real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus regional. Invernante irregular, a veces irruptivo (500 a >5.000 ejemplares), con tendencia decreciente. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Tendencia. En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “declive moderado” (-40%) en el periodo 1980-2012 (PECBMS, 2015).
- Invierno 2008-2009. 7 en Valdeñigos (CC) el 09/01/09 (J. Prieta). Presente en Garciaz (CC) el 26/01/09 y varios en Monfragüe (CC) el 19/02/09 (M. Kelsey). 2 machos en Piornal (CC) el 28/02/09 (M. J. Valencia y X. Piñeiro) y uno el 10/03/09 (R. Montero).
- Invierno 2009-2010. Uno en Valdeñigos (CC) el 25/11/09 (J. Prieta). Un macho en Valdivia (BA) el 07/01/10 (J. L. Anguita). 3 en Valdeobispo (CC) el 01/02/10 (J. Prieta) y 2 el 06/02/10 (C. Clemente y J. Mahillo). Varios en un pinar de Badajoz el 04/05/10 (J. P. Prieto).
- Invierno 2010-2011. Una hembra en Cornalvo (BA) el 12/11/10 (J. Ledo). 2 en Moheda de Granadilla (CC) el 21/01/11 (A. Pacheco). 4 en Hervás (CC) el 22/01/11 (R. Montero). **25** en Cabrero (CC) el 28/01/11 y uno en Tejada del Tiétar (CC) el 30/01/11 (J. Prieta). Varios en Monfragüe (CC) el 3/02/11 (J. Collado). 8 en Riobobos (CC) el 15/02/11 (J. Prieta). En el pinar del puerto de Piornal, 2-4 aves los días 4/02/11, 11/02/11 y 18/02/11 (J. Prieta). 2 en La Garganta (CC) el 08/03/11 (R. Montero) y unos 20 en paso por el Salto del Gitano, Monfragüe (CC), el 12/03/11 (E. Palacios y S. Mayordomo).
- Invierno 2011-2012. Uno en Zarza de Montánchez (CC) el 28/12/11 (S. Fletcher). 2 en Tentudía (BA) el 04/02/12 (J. Salcedo y A. Pacheco).
- Invierno 2012-2013. En la Raña de Alía (CC), 3 el 04/11/12 y 4 el 07/11/12 (N. Baeza, J. Á. Herrera y J. Cerezo). Uno en Pago de San Clemente (CC) el 07/11/12 (M. Kelsey). Bando de **400** en Galisteo (CC) el 17/11/12 (R. Montero). Uno en el río Jerte, Plasencia (CC), el 22/11/12 (J. Sánchez). Uno en Jarandilla de la Vera (CC) el 25/11/12 (J. García). 3 en Robledillo de Gata (CC) el 06/12/12 (A. Pacheco). Una hembra en Villar de Plasencia (CC) el 07/12/12 (H. Sánchez). 10 en Galisteo (CC) el 23/12/12 (J. Prieta). Varios en Cuacos de Yuste (CC) el 31/12/12 (M.

Nieto). 5 en el río Rucas, Madrigalejo (CC), el 03/01/13 (M. Jiménez y P. Tapia). Varios en Cabrero (CC) el 11/01/13 y una hembra el 15/02/13 (J. Prieta). 4 en La Albuera (BA) el 22/01/13 (F. Montaña y J. Vázquez). Más de **50** en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 28/01/13 (S. Mayordomo), 15 el 13/02/13 (C. Clemente y J. Mahillo), 17 el 15/02/13 (S. Mayordomo) y 5 el 16/02/13 (J. Prieta). En Piornal (CC) se observan varios el 09/02/13 (E. Palacios y M. Á. Muñoz) y unos **40** el 15/02/13 (A. Redondo y L. Rivas).

- Invierno 2013-2014. Uno en Cornalvo (BA) el 09/12/13 (M. Gálvez). Un macho en la rivera de Gata (CC) el 26/01/14 (S. Mayordomo).
- Invierno 2014-2015. Uno en Don Álvaro (BA) el 03/11/14 (F. Crystal). Uno en La Zarza (BA) el 11/11/14 y otro en Alange (BA) el 13/11/14 (J. Guerra). Uno en el pinar del Puerto de Piornal (CC) el 20/12/14 (A. Redondo, G. Rivas y L. Rivas) y 3 el 21/12/14 (C. Clemente, J. Mahillo, S. Mayordomo, R. Montero y E. Palacios). Unos **50** en Guareña (BA) el 20/12/14 (M. Gálvez y J. Guerra) y uno el 21/12/14 (L. Alcántara). Varios en el pinar del pueblo de Piornal (CC) el 23/12/14 (R. Montero, J. Torfs y M. Viskens). Varios en el puerto de Honduras, Cabezuela del Valle (CC), el 24/12/14 (R. Montero).

Serín verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus regional. Residente muy abundante (1.300.000 ejemplares en 2004-2006, 4% de España) con tendencia en declive. Migrador parcial con llegada numerosa de invernantes (varios millones) con tendencia al aumento. Monotípica.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de -2% y una reducción poblacional de -21% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +12% y total de +67% (SEO/BirdLife, 2013b).

Verderón común (*Chloris chloris*)

Estatus regional. Residente abundante (470.000 ejemplares en 2004-2006, 3% de España) con tendencia creciente. Migrador parcial con importante llegada de invernantes y tendencia estable. Cría la subespecie *C.c.aurantiventris* y en invierno llega *C.c.chloris*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +2,1% y un aumento poblacional de +81% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,7% y total de -6% (SEO/BirdLife, 2013b).

Verderón serrano (*Carduelis citrinella*)

Estatus regional. Invernante muy escaso, fluctuante e irregular (0-500 ejemplares). Un caso de reproducción publicado pero sin confirmar. Subespecie *C.c.citrinella*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Alta Montaña en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -3,3% y total de -44%; es decir, aparente declive (SEO/BirdLife, 2013b). Se conocen picos de abundancia en el año 2009 y sobre todo en el invierno 2014-2015, cuando ha tenido lugar una pequeña irrupción en la provincia de Cáceres.
- **Nuevos registros.** En Piornal (CC), 3 en el Pinar del Puerto el 05/02/13 (J. Prieta) y 6 en el Pinar del Pueblo el 08/02/13 (J. Prieta y S. Mayordomo). Varios en el pinar de Serradilla (CC) el 27/11/13 (D. Cobos). Al menos 18 en el pico Villuercas, Guadalupe (CC), el 30/10/14 (M. Kelsey, P. O’Grady y A. Winter) y 2-21 entre el 01/11/14 y el 30/12/14 (V. de Alba, F. Bernáldez M. Gálvez, J. Guerra, M. Kelsey, F. Macías, F. Montaña, G. Montaña, A. Núñez, N. Renwick y J. Solana). En el pinar del puerto de Piornal (CC), más de 20 el 20/12/14 (A. Redondo, G. Rivas y L. Rivas) y el 21/12/14 (C. Clemente, J. Mahillo, S. Mayordomo, R. Montero y E. Palacios) y unos 15 el 23/12/14 (M. Kelsey y J. Prieta). Uno en el pinar de Cuerda Pelada, Piornal (CC) el 21/12/14 (R. Montero) y 3 el 22/12/14 (R. Montero, J. Torfs y M. Viskens). En el pinar del pueblo de Piornal (CC), 30 el 22/12/14 y varios el 23/12/14 (R. Montero, J. Torfs y M. Viskens) y el 29/12/14 (J. Prieta). Unos 10 en un grupo con pinzones vulgares y reales en cerezos y robles del Puerto de Honduras, Cabezuela del Valle (CC), el 24/12/14 (R. Montero).

Jilguero europeo (*Carduelis carduelis*)

Estatus regional. Residente muy abundante (3.500.000 ejemplares en 2004-2006, 10% de España) con tendencia decreciente. Sexta especie de ave más numerosa. Migrador parcial con llegada numerosa de invernantes (varios

millones) con tendencia creciente. Cría la subespecie *C.c.parva* e invernán *C.c.carduelis* (Europa continental) y *C.c.britannica* (Islas Británicas).

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “declive moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de $-0,1\%$ y una reducción poblacional de -14% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de $+11\%$ y total de $+31\%$ (SEO/BirdLife, 2013b).

Jilguero lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus regional. Invernante abundante o muy abundante con grandes fluctuaciones, a veces de forma irruptiva (¿30.000-200.000? ejemplares). Tendencia incierta. Monotípica.

Criterio. Fechas extremas y observaciones de interés.

- **Tendencia.** En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de $+0,7\%$ y total de $+25\%$; es decir, aparente aumento. En la serie estudiada hubo un pico de abundancia en 2010, otro menor en 2008, cifras medias en 2011 y 2012 y bajas en 2009 (SEO/BirdLife, 2013b). En Europa, origen de las aves invernantes, la tendencia es “incierta” en el periodo 1980-2012; aunque el cambio poblacional es de $+30\%$ (PECBMS, 2015).
- **Llegadas.** Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 26/10/09 (D. Langlois). Varios en Piornal (CC) el 07/10/10 (J. Prieta). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 13/10/10 (D. Langlois). Varios en el río Jerte, Plasencia (CC), el 25/10/11 (R. Montero). Uno en Montehermoso (CC) el 14/09/12 (J. Mahillo). Una hembra en el paseo fluvial de Plasencia (CC) el 03/11/13 (J. Prieta) y una pareja el 06/11/13 (S. Mayordomo). Al menos 5 en Plasencia (CC) el 21/10/14 (S. Mayordomo). Uno en Serradilla (CC) el 22/10/14 (D. Cobos). El 23/10/14 varios en Villanueva de la Vera (CC) el 23/10/14 (D. Langlois) y 2 en Badajoz (J. C. Paniagua).
- **Últimos registros.** Presente en Villanueva de la Vera (CC) el 24/03/09 (D. Langlois). Varios en Plasencia (CC) el 28/03/10 (J. Prieta). Varios en Villanueva de la Vera (CC) el 29/03/10 (D. Langlois). El 31/03/11 al menos 4 en la Tajadilla, Monfragüe (CC) (M. Kelsey) y varios en Villanueva de la Vera (CC) (D. Langlois). 20 en el puerto de Piornal (CC) el 16/03/12 (J. Prieta). Un macho en Plasencia (CC) el 22/03/12 (S.

Mayordomo). El 13/04/13, 12 en La Tajadilla, Monfragüe (CC), (J. Muddeman) y uno en el Río Ruecas, Fernando V (BA) (M. Kelsey). En el paseo fluvial del río Jerte, Plasencia (CC), grupos de 6 y 2 el 14/04/13 (E. Palacios, J. Prieta, M. Á. Muñoz, F. Ramírez y S. Mayordomo). 2 en Piornal (CC) el 17/03/14 (J. Prieta). 8 en Villanueva de la Vera (CC) el 20/03/14 (D. Langlois).

Pardillo común (*Carduelis cannabina*)

Estatus regional. Residente abundante (700.000 ejemplares en 2004-2006, 3% de España) con tendencia estable. Migrador parcial con llegada moderada de invernantes foráneos (>1.000.000 ejemplares) con tendencia muy positiva. Cría la subespecie *C.c.mediterranea*, en invierno llega *C.c.cannabina*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de -0,1% y total de de -7%. En la Región Alta Montaña está en declive, -1,8% anual (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incremento fuerte”, con un porcentaje medio de cambio anual de +17% y total de +93% (SEO/BirdLife, 2013b).

Piquituerto común (*Loxia curvirostra*)

Estatus regional. Reprodutor muy escaso e irregular (0-50 parejas), más frecuente en invierno Realiza movimientos erráticos. Tendencia al aumento en España en todas las épocas. Subespecie *L.c.curvirostra*.

Criterio. Todas las observaciones.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en España en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +5,5% y un aumento poblacional de +152% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierto”, con un porcentaje medio de cambio anual de +9% y total de +41%; es decir, aparente aumento. Los años 2010 y 2012 se detectaron picos de abundancia (SEO/BirdLife, 2013b).
- **Reproducción.** En el pinar de la Dehesa de Abajo, Tornavacas (CC), un macho cantando a 1.520 msnm el 10/05/11 (J. Prieta) y se observa un joven el 24/05/11 (I. Solana y J. Prieta); *segunda localidad y registro de cría seguro en Extremadura*.

- Nuevos registros. En la Sierra de Ladrillar (SA-CC), varios el 12/09/12 y el 03/10/13, **15** el 02/12/13 (A. Pacheco), 7 el 08/01/14 (S. Mayordomo) y varios el 21/01/14 (A. Pacheco). Uno en vuelo en Monfragüe (CC) el 18/11/12 (C. Mills). Un macho en vuelo en el pinar de Cañaveral (CC) el 22/11/12 (S. Mayordomo). En La Garganta (CC), 2 el 05/01/13 (R. Montero), 6 el 13/01/13 (C. Clemente, E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo), **14** el 22/06/13 (J. Prieta) y 6 el 10/12/14 (S. Mayordomo). En Piornal (CC), 3 el 21/04/14 (S. Mayordomo) y el 25/04/14 (A. Redondo y L. Rivas), 2 el 28/04/14 y varios el 07/11/14 (J. Prieta), al menos **12** el 20/12/14 (A. Redondo, G. Rivas y L. Rivas), 5 el 21/12/14 (C. Clemente, J. Mahillo, S. Mayordomo, R. Montero y E. Palacios), 4 el 23/12/14 (R. Montero, J. Torfs y M. Viskens), 3 el 23/12/14 (J. Prieta) y 4 el 27/12/14 (M. Kelsey). 8 en Tornavacas (CC) el 17/11/14 (I. Solana).

Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus regional. Invernante común (¿1.000-2.000? ejemplares) con tendencia incierta, posiblemente en aumento. Subespecies *P.p.iberiae* (norte ibérico) y *P.p.pyrrhula*.

Criterio. Fenología, nuevas localidades y observaciones de interés.

- Tendencia. En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en España en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -10% y total de +19%; es decir, en posible aumento (SEO/BirdLife, 2013b).
- Llegadas. Uno en La Codosera (BA) el 25/10/09 (G. Schreur). En Villanueva de la Vera (CC) varios el 26/10/09 (D. Langlois) y 2 el 23/10/10 (D. Langlois y S. Langlois). Este día uno en San Vicente de Alcántara (BA) (J. Gordillo). Un macho en Serradilla (CC) el 15/10/11 (A. Gómez). Uno en Villanueva de la Vera el 30/10/11 (D. Langlois y S. Langlois). Varios en La Codosera (BA) el 25/10/12 (G. Schreur). El 27/10/12, uno en Santa Cruz de Paniagua (CC) (J. C. Paniagua) y otro en Monfragüe (CC) (J. Porras). Paso intenso de más de 60 por la Sierra de San Pedro (BA) el 28/10/12 (J. Gordillo). 2 en Valcorchero, Plasencia (CC), el 16/10/13 (S. Mayordomo). 2 en Valverde de la Vera (CC) el 18/10/13 (D. Langlois). 3 en Villanueva de la Vera (CC) el 31/10/13 (D. Langlois). 9 en Serradilla el 22/10/14 (D. Cobos) y 5 el 25/10/14 (D. Cobos y S. Mayordomo). Varios en La Codosera (BA) el 24/10/14 y el 26/10/14 (G. Schreur). Uno en Villanueva de la Vera (CC) el 26/10/14 (D. Langlois).
- Últimos registros. En Villanueva de la Vera (CC), uno el 24/03/09, uno el 18/02/10 y 2 el 05/03/11 (D. Langlois). Uno en Monfragüe (CC) el

19/03/12 (M. Kelsey). Una hembra en La Parra (BA) el 21/03/12 (P. Amaya). Uno en Piornal (CC) el 21/03/13 (J. Prieta). En Villanueva de la Vera, un macho el 23/03/13 y uno el 28/03/13 (D. Langlois). Uno en Salvatierra de los Barros (BA) el 03/04/13 (J. Vázquez). Una pareja en el huerto del Ojaranzo, Monfragüe (CC), el 18/03/14 (J. L. Bautista). Uno en Llera (BA) el 30/03/14 (V. de Alba y A. Núñez).

- Registros de interés. *Observación estival*: 2 en Villanueva de la Vera (CC) el 05/06/10 (D. Langlois). 7 comiendo madroños en Puebla de Obando (BA) el 01/11/12 (P. Herrador y J. L. Bautista). 2 machos y 3 hembras en Riomalo de Arriba (CC) el 08/11/12 (A. Pacheco). En el río Guadajira, La Lapa (BA), una pareja los días 28/11/12 y 29/11/12 (F. Montaña). Uno en Montehermoso (CC) el 04/01/13 (J. Mahillo). Un macho en Valcorchero, Plasencia (CC), el 31/01/13 (S. Mayordomo). El 09/02/13 un macho en el embalse de Casa Zafra, Cáceres, (C. Clemente, J. Sánchez, J. García, L. Alcántara, O. Jiménez y S. Mayordomo).

Picogordo común (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus regional. Residente común (150.000 ejemplares en 2004-2006, 44% de España) con tendencia incierta. Invernante común con tendencia creciente y llegada de aves foráneas. Subespecie *C.c.coccothraustes*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia provisional en España, al disponerse de una muestra muy pequeña para el periodo 1998-2013, es “incierta” aunque el cálculo obtenido arroja un porcentaje medio de cambio anual de +4,9% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +26% y total de +205%; es decir, aparente aumento. Los inviernos 2009, 2011 y 2012 hubo picos de abundancia, en cambio fue escaso en 2008 y 2010 (SEO/BirdLife, 2013b).

Escribano nival (*Plectrophenax nivalis*)

Estatus regional. Accidental en invierno. Cinco registros, 4 en noviembre-diciembre, años 1998, 2003, 2004 y 2007, y uno en marzo de 2001. Raza desconocida (podrían ser *P.n.nivalis* y *P.n.insulae*).

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Dos machos, dos hembras y un juvenil en el pico Calvitero (CC-SA) en 12/1998 (J. J. Ramos). Un macho en Fuenlabrada de los Montes el

29/03/01 (A. Gil y J. J. Pérez). Uno en Belén, Trujillo, el 27/12/03 y el 31/12/03 (S. Villa). Un macho el 30/11/04 en Arrocampo (J. Briz). Uno en Valcorchero, Plasencia, el 6/12/07 (S. Mayordomo).

Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus regional. Reproductor excepcional (un caso en Jerte en 1996). Invernante muy escaso, muy poco conocido y con muy pocos registros. Subespecie *E.c.citrinella*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros. 4, uno de ellos macho, en Oliva de Plasencia (CC) el 17/11/11 (C. Mills y R. Montero). Al menos uno entre un grupo de soteños en Riomalo de Abajo (CC) el 18/01/12 (A. Pacheco). Uno en La Garganta (CC) el 06/01/13 (R. Vicente).

Escribano soteño (*Emberiza circlus*)

Estatus regional. Residente abundante (65.000 ejemplares en 2004-2006, 2'2% de España). Tendencia al aumento tanto en primavera como en invierno. Monotípica.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio anual de +3,4% y un aumento poblacional de +120% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +7% y total de 19%; es decir, aparente aumento (SEO/BirdLife, 2013b).

Escribano montesino (*Emberiza cia*)

Estatus regional. Residente abundante (57.000 ejemplares en 2004-2006, 1'6% de España) con tendencia estable tanto en primavera como en invierno. Subespecie *E.c.cia*.

Criterio. Observaciones de interés.

- Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,1% y total de -10% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de +0,7% y total de -4%; es decir, aparentemente estable (SEO/BirdLife, 2013b).

Escribano hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus regional. Reproductor estival común (21.000 ejemplares en 2004-2006, 4% de España) con tendencia incierta. Migrador escaso. Monotípica.

Criterio. Fenología, nuevas localidades y observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de $-2,8\%$ y total de $+72\%$ (SEO/BirdLife, 2013a).
- **Llegadas.** Uno en el puerto de Honduras (CC) el 22/04/10 (J. Muddeman). En Piornal (CC), varios el 06/05/10 y uno el 15/04/11 (J. Prieta). Uno en Garganta la Olla (CC) el 20/04/11 (G. Schreur). Uno en el puerto de Piornal (CC) el 24/04/12 (J. Prieta). 2 en Peñas Blancas, La Zarza (BA), el 19/04/13 (J. Guerra y M. Gálvez). 6 en Gargüera (CC) el 20/04/13 (J. Gayo). El 25/04/13, un macho en el puerto de Tornavacas (CC) (J. Muddeman) y está presente en Piornal (CC) (J. Prieta). El 16/04/14, uno en el puerto de Tornavacas (CC) (B. Molina). En Peñas Blancas, Alange (BA), 2 el 16/04/14 (M. Gálvez) y uno el 19/04/14 (L. Alcántara). Uno en Piornal (CC) el 23/04/14 (J. Prieta).
- **Últimas observaciones.** 2 en Galisteo (CC) el 04/09/12 (S. Mayordomo). 30 en La Roca de la Sierra (BA) el 09/09/12 (P. Herrador). 11 en Mérida (BA) el 21/09/12 (J. Sánchez). Uno cantando en Los Canchales (BA) el 06/09/14 (M. Gálvez, J. Guerra, M. Infantes y M. Oro). 5 en Las Mestas a 500 msnm (CC) el 11/09/14 (A. Pacheco).
- **Registros de interés.** Uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 25/04/11 (M. Kelsey). Uno en Torrejón el Rubio (CC) el 05/05/11 (J. Esteban). Uno en La Aldea del Obispo (CC) el 28/04/12 (S. Villa). Uno en Palazuelo (BA) el 21/04/13, uno en Santa Marta de Magasca (CC) el 27/04/14 y otro entre Santa Marta de Magasca y Trujillo (CC) el 04/05/14 (M. Kelsey). Uno en llanos de Cáceres el 25/04/14 y otro en Torreorgaz (CC) el 28/04/14 (C. Clemente).

Escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus regional. Invernante abundante ($i > 100.000?$ ejemplares) con tendencia decreciente. Subespecie *E.s.schoeniclus*.

Criterio. Observaciones de reproducción, fechas extremas y de interés.

- **Censo 2015.** Diez años después del primer censo nacional de 2005 ha tenido lugar un segundo censo. De nuevo el resultado en Extremadura ha sido nulo, muestreando sólo el embalse de Arrocampo (J. Briz y V. Risco).

- **Tendencia.** En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -3% y total de -14%; es decir, aparente declive (SEO/BirdLife, 2013b).
- **Llegadas.** 2 en Badajoz el 14/10/09 (J. C. Paniagua). Uno en el embalse de Talaván (CC) el 29/10/10 (G. Schreur). 2 en Galisteo (CC) el 31/10/11 (S. Mayordomo). 2 en El Batán (CC) el 28/10/12 (M. Á. Muñoz y C. Martín). 3 en Viñuelas, Galisteo (CC), el 03/11/13 (S. Mayordomo). Uno entre Montehermoso y El Batán (CC) el 05/11/13 (C. Clemente). En Arrocampo (CC), 3 el 08/11/13 (S. Mayordomo) y 2 el 01/11/14 (M. Kelsey). 4 en la laguna de Galisteo (CC) el 10/11/14 (J. M. Diu).
- **Últimos registros.** Uno en Galisteo (CC) el 07/03/09 (S. Mayordomo). Uno en Talaván (CC) el 19/03/10 (E. Palacios). 2 en Galisteo (CC) el 21/03/10 (S. Mayordomo). Una hembra en Arrocampo (CC) el 03/04/11 (J. A. López y Ó. Llama). 2 en Arrocampo (CC) el 14/03/12 (S. Mayordomo, M. Gómez y J. Prieta). Uno en Talaván el 15/03/12 (G. Schreur). En Valdefuentes, Galisteo (CC), una hembra el 19/03/12 (S. Mayordomo) y otra el 13/03/13 (C. Clemente y J. Mahillo). 4 en el embalse de Talaván (CC) el 17/03/13 (E. Palacios y S. Mayordomo). 5 en de Arrocampo (CC) el 10/03/14 (J. Muddeman). 2 hembras en la gravera Valdefuentes, Galisteo (CC), el 16/03/14 (J. Prieta).


Escribano triguero (*Emberiza calandra*)

Estatus regional. Residente muy abundante (3.800.000 ejemplares en 2004-2006, 17% de España). Quinta especie de ave más numerosa. Tendencia estable tanto en primavera como en invierno. Efectúa nomadeos invernales y llegan aves foráneas. Subespecie *E.c.calandra*.

Criterio. Observaciones de interés.

- **Tendencia.** Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es “estable”, con un porcentaje medio de cambio anual de cero y total de -0,2% (SEO/BirdLife, 2013a). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia en el periodo 2008-2013 es “incierta”, con un porcentaje medio de cambio anual de -1,2% y total de -3,3%; es decir, aparentemente estable (SEO/BirdLife, 2013b).

ESPECIES EXÓTICAS



Especies exóticas sin poblaciones establecidas

Emú (*Dromaius novaehollandiae*)

Estatus regional. Procedente de cautividad. Un registro en Cerezo en enero de 2011.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro. Dos aves permanecen en libertad en los olivares de Marchagaz, Cerezo y Palomero (CC); escapadas desde el 17/01/11 (A. Pacheco).

Malvasía canela (*Oxyura jamaicensis*)

Estatus regional. Procedente de cautividad o de llegadas naturales desde poblaciones europeas naturalizadas. Un registro en Brozas, julio-agosto 2001.

Criterio. Todas las observaciones.

Cisne vulgar (*Cygnus olor*)

Estatus regional. Procedente de cautividad o de poblaciones naturalizadas. Registros en Orellana (2002-2003), Sierra Brava (2002-2003), La Serena (2005), Alcántara (2006), Serrejón (2006, 2014), Monfragüe (2009), Mérida (2013) y Badajoz (2014).

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros. Uno en Monfragüe (CC) el 15/06/09 (J. Prieta). Uno en el embalse de Montijo, Mérida (BA), el 19/03/13 (F. Crystal). 3 en el embalse de la Anguila, Serrejón (CC) el 27/05/14 (M. García del Rey) y el 28/05/14 (I. Gallardo y M. García del Rey). Uno en el río Guadiana en Badajoz entre el 16/06/14 y el 04/12/14 (J. C. Paniagua y M. Kelsey).

Cisne negro (*Cygnus atratus*)

Estatus regional. Procedente de cautividad. Catorce registros de 1-4 aves en Vegas Altas (1996, 2002-2004, 2010), una en Plasencia (2003-2004), una en Malpartida de Plasencia (2007), 5 en Alange (2009), una en Portaje (2009-2010), una en El Batán (2011) y 2 en Badajoz (2014). Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros. 5 en el embalse de Alange (BA) el 15/11/09 (L. Alcántara). Uno en el embalse de Portaje (CC) entre el 02/11/09 y el 14/02/10 (A. Rodríguez y S. Mayordomo). Uno en Casas de Hitos (BA-CC), el 01/02/10 (J. Jaén y Ó. Llama). Uno en el arrozal de El Batán el

13/06/11 (J. Prieta). Uno en el río Guadiana en Badajoz el 15/04/14 y 2 el 18/04/14 (J. C. Paniagua).

Ánsar indio (*Anser indicus*)

Estatus regional. Posible origen en poblaciones europeas naturalizadas, con seis registros, cinco de ellos invernales: Valdecañas (1987), Llerena (1996), Saucedilla (2003), Logrosán-Madrigalejo (2012). Monotípico.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros. Uno procedente de cautividad (anilla azul) en el embalse de Portaje (CC) entre el 20/07/09 y el 09/10/09 (S. Mayordomo). Uno en Vega Zorzalejos, Logrosán (CC), el 11/11/12 (S. Mayordomo y L. Salguero) y posiblemente el mismo en arrozales de La Trebolosa, Madrigalejo (CC), el 09/12/12 (S. Mayordomo)

Tarro sudafricano (*Tadorna cana*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Registros de una hembra en Plasencia en 2002 y otra en Hornachos en 2008.

Criterio. Todas las observaciones.

Pato joyuyo (*Aix sponsa*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Registros en Belvís de Monroy en 2003 y 2005 (con reproducción), Villar de Plasencia en 2007, Casas de Belvís en 2010 y 2011 y Guijo de Coria en 2010-2012.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros. En Casas de Belvís (CC), un macho en eclipse el 09/10/10 (J. Briz) y uno en canales de regadío el 02/06/12 (J. Briz y A. Briz). En la charca del Pueblo de Guijo de Coria (CC), un macho los días 17/12/10 (C. Clemente), 20/12/10 (S. Mayordomo) y 29/12/10 (J. Prieta); de nuevo un macho el 18/12/11 (SEO-Cáceres) y el 21/06/12 (C. Clemente).

Pato mandarín (*Aix galericulata*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad y de llegadas naturales de poblaciones europeas asilvestradas. Registros en Casar de Cáceres, Jerte y embalses de Plasencia, Cornalvo, Portaje, Cubilar, Arrocampo y Tentudía.

Criterio. Todas las observaciones.

- Reproducción. *Segundo caso de reproducción en Extremadura*: Una hembra con 5 pollos grandes en una charca de Valcorchero, Plasencia (CC), el 26/06/11 (C. Martín).
- Nuevos registros: En Plasencia (CC), seguramente escapes del parque de Los Pinos: una pareja en el río Jerte, entre el 08/04/10 y el 09/05/10 (E. Palacios, J. Prieta, R. Montero y S. Mayordomo); una pareja en Valcorchero el 17/03/11 (C. Martín); una hembra en el canal de La Isla el 17/07/11 (J. Prieta) y una hembra en el río Jerte el 25/02/12 (R. Montero). Uno con coloración atípica en el embalse de Tentudía (BA) el 26/12/10 (A. Pacheco).

Pato picazo (*Netta peposaca*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en el embalse de Portaje en agosto de 2012.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro. Un macho en el embalse de Portaje (CC) entre el 04/08/12 y el 23/08/12 (S. Mayordomo).

Codorniz china (*Coturnix chinensis*)

Estatus regional. Procedente de cautividad y de sueltas para la caza. Un registro en Cornalvo en julio de 2012.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro. Un ejemplar atropellado a la salida de la Autovía A-5, en el acceso a Trujillanos, a unos 100 metros del centro de interpretación del Parque Natural de Cornalvo (BA), el 12/07/12 (J. M. Crespo).

Codorniz japonesa (*Coturnix japonica*)

Estatus regional. Procedente de cautividad y de sueltas para la caza. Sin registros concretos pero de presencia segura.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Especie sin registros directos. En numerosas fuentes consta que en Extremadura se realizan sueltas abundantes de codorniz japonesa. En la actualidad todas las codornices de granja son japonesas, pues ninguna granja cría codorniz común, siendo liberadas formas puras e híbridas.

Colín de Virginia (*Colinus virginianus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad y de sueltas para la caza. Un registro en Montijo en noviembre de 2013.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro. 2 en un rastrojo de maíz en Montijo (BA) el 15/11/13 (P. Herrador).

Faisán vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad y de sueltas para la caza, con al menos un caso de reproducción en libertad. No hay poblaciones asilvestradas. Subespecie desconocida.

Criterio. Todas las observaciones.

- Una pareja en Casas del Castañar (CC) el 19/03/09, procedente de una suelta reciente; posteriormente se ven 5 aves y algunas más hasta el mes de mayo (J. Prieta). Uno en Villanueva de la Vera el 06/06/09 (D. Langlois). En el embalse de Portaje (CC) 2 parejas el 12/09/09 (S. Mayordomo) y un macho el 19/09/09 (C. Clemente y J. Mahillo) y el 02/11/09 (S. Mayordomo). Un macho en Galisteo (CC) el 19/09/10 (C. Clemente y J. Mahillo). Un macho entre Mérida y Hornachos (BA) el 27/01/13 (Á. Sánchez). Se escuchan al menos 2 en Valencia de las Torres (BA) el 19/05/13 y uno el 30/11/13 (M. Gálvez). Una hembra en rastrojo de maíz en Vegas Altas (BA) el 24/11/13 (M. Á. Muñoz). Una hembra en Madrigalejo (CC) el 07/03/14 (M. Kelsey). Uno en Oliva de Mérida (BA) el 09/03/14 (F. Bernáldez, M. Gálvez y F. Macías). 4 en Villanueva de la Vera (CC) el 22/03/14 (D. Langlois). Un macho entre Trujillo y Monroy (CC) el 29/03/14 (M. Kelsey). Un macho en el río Aljucén, Mérida (BA), el 14/05/14 (C. González).

Faisán dorado (*Chrysolophus pictus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un macho cazado en 1976. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

Pelícano rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus regional. Exótica de origen desconocido. Un registro en el embalse del Salor en mayo de 2004.

Criterio. Todas las observaciones. Rareza en España sujeta a homologación.

Tántalo africano (*Mycteria ibis*)

Estatus regional. Accidental de origen desconocido. Un registro en Los Canchales en 2001.

Criterio. Todas las observaciones.

Espátula africana (*Platalea alba*)

Estatus regional. Accidental de origen desconocido. Un registro en Los Canchales en 2005.

Criterio. Todas las observaciones.

Aura gallipavo (*Cathartes aura*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Fuente del Maestre en julio de 2013.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro. Un adulto en Fuente del Maestre (BA) el 04/07/13 (Á. Sánchez, M. Rivera y R. Tejeda) en una casa de campo a las afueras del pueblo, sin anillas ni marcas, vuela perfectamente, el dueño de la finca le aporta conejos muertos y al parecer lleva en el lugar varios días.

Zopilote negro (*Coragyps atratus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Deleitosa entre abril y agosto de 2007.

Criterio. Todas las observaciones.

Tortolita rabilarga (*Oena capensis*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Plasencia en julio 1998.

Criterio. Todas las observaciones.

Paloma de Guinea (*Columba guinea*)

Estatus regional. Procedente de cautividad. Un registro en Coria en marzo de 2013.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro. 2 acuden a un palomar en Coria (CC) el 10/03/13 (E. Reyes y J. Reyes).

Tortolita diamante (*Geopelia cuneata*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Tres registros en Malpartida de Plasencia en julio de 1998 (30 aves), Plasencia en febrero de 2007 y Villanueva de la Serena en agosto de 2014.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevo registro. Una a las afueras de Villanueva de la Serena (BA) el 03/08/14 y el 04/08/14 (J. M. García).

Cacatúa ninfa (*Nymphicus hollandicus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Cuatro registros en Plasencia (2), Jarandilla de la Vera y Mérida. Monotípica.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros. Una en Jarandilla de la Vera (CC) el 17/07/10 (M. Díaz). Una hembra en Mérida (BA) el 29/12/11 (J. Solana). Una en el polígono industrial de Plasencia (CC) el 03/08/13 (F. Ramírez).

Inseparable de Namibia (*Agapornis roseicollis*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Dos registros en Plasencia (julio 2003) y Valencia de Alcántara (mayo 2014).

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevo registro. 2 en la Aceña de la Borrega, Valencia de Alcántara (CC), el 01/05/14 y el 02/05/14 (A. Pizarro y F. Torres).

Inseparable cabecinegro (*Agapornis personatus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Valencia de Alcántara en mayo de 2014.

Criterio. Todas las observaciones recibidas.

- Primer registro. Uno en compañía de 2 inseparables de Namibia en la Aceña de la Borrega, Valencia de Alcántara (CC), el 01/05/14 y el 02/05/14 (A. Pizarro y F. Torres).

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Más de 25 registros en 10 localidades, destacando la presencia en Mérida.

Criterio. Todas las observaciones.

- Registros previos. Octubre-noviembre 1999 (Plasencia), noviembre 2000 (Navalmoral de la Mata), julio 2001 (Sierra Brava), enero 2004 (Plasencia), julio 2005 (Belvís de Monroy), octubre 2006 (Arrocampo), junio 2007 (Plasencia) y otoño 2007 (Zafra).
- Mérida (BA). Una el 24/09/12 (S. Pérez). Una en la glorieta Méridas del Mundo el 15/11/12 (Á. Sánchez). Una en la Alcazaba el 11/03/13 (J. Solana). Una en Don Álvaro (BA) con vuelo rumbo Mérida el 13/05/13 (F. Crystal). Una en una isla del río Guadiana el 27/08/13 (F. Crystal). Una en la alcazaba el 22/09/13 (J. J. Ramos). Una en la Plaza de España el 10/10/13 (J. Guerra y M. Gálvez) y en el puente Romano el 11/10/13 (F. Crystal). 2 el 20/12/13 (H. Sánchez). Una el 20/02/14 (J. Solana).
- Cáceres. Una el 03/03/10 (M. Kelsey). Una en la ronda Puente Vadillo el 13/11/12 (J. L. Bautista). Una en Fuente Fría el 04/01/13 (J. Solana).
- Badajoz. Una en la Puerta de Palmas el 12/03/13 (J. C. Paniagua). Una en la urbanización Campofrío el 22/02/14 (M. Gálvez y J. Guerra).
- Plasencia (CC). Una en el paseo fluvial el 03/11/13 (R. Montero), el 21/11/13 (M. Domínguez) y el 03/12/13 (R. Montero).

Lorito senegalés (*Poicephalus senegalus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Dos registros en Plasencia y Valencia de Alcántara (2008).

Criterio. Todas las observaciones.

Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Cuatro registros en Plasencia (1999), Trujillo (2005), Cáceres (2006) y Brozas (2013). Subespecie *C. p. patagonus*.

Criterio. Todas las observaciones.

- Nuevos registros. Uno en Brozas (CC) el 28/08/13 (C. Fernández).

Amazona alinaranja (*Amazona amazonica*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Valuengo en junio de 2000.

Criterio. Todas las observaciones.

Periquito común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Torrequemada en junio de 2011.

Criterio. Todas las observaciones.

- Primer registro. Uno albino en Torrequemada (CC) el 10/06/11 (S. Mayordomo).

Estornino metálico púrpúreo (*Lamprotornis purpureus*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Almendralejo en 2009.

Criterio. Todas las observaciones.

- Primer registro. Un ave en Almendralejo (BA) el 16/07/10; ejemplar que lleva viéndose desde 2009 (A. Matador).

Quelea común (*Quelea quelea*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Madrigalejo en 2004.

Criterio. Todas las observaciones.

Estrilda culinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Dos registros en La Serena (2005) y en Navalvillar de Pela (2008, cría posible).

Criterio. Todas las observaciones.

Diamante cebrá australiano (*Taeniopygia castanotis*)

Estatus regional. Exótica procedente de cautividad. Un registro en Acebo en 2008.

Criterio. Todas las observaciones.

BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFÍA

Alonso, J. C., Palacín, C. y Martín, C. A. 2005. *La avutarda común en la península ibérica: población actual y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

Arroyo, B. y García, J. 2007. *El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población en 2006 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid

Atienza, J. C. 2006. El escribano palustre en España. I Censo Nacional (2005). SEO/BirdLife. Madrid.

Caldera, J., Sánchez, Á., Cortázar, G. y Arredondo, M. 2014. Censo invernal de milano real en Extremadura, enero 2014. Gobierno de Extremadura.

Cardalliaguet, M., Ortega A. y Prieta, J. 2014. Actualización de formularios, propuesta de zonificación, actualización de poblaciones esteparias y cernícalo primilla en la Red Natura 2000 de Extremadura. SEO-Extremadura. Informes inéditos para la Junta de Extremadura.

Cardiel, I. E. 2006. El milano real en España. II Censo Nacional (2004). SEO/BirdLife. Madrid.

Carrascal, L. M., y Palomino, D. 2008. *Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006*. Colección Seguimiento de Aves nº 19. SEO/BirdLife. Madrid.

Castany, J. y López, G. 2006. El carricerín real en España. I Censo Nacional (2005). SEO/BirdLife. Madrid.

Catry, P., Costa, H., Elias, G. y Matias, R. 2010. *Aves de Portugal. Ornitología do territorio continental*. Assirio & Alvim. Lisboa.

De Juana, E. 2009. The dramatic decline of the little bustard *Tetrax tetrax* in Extremadura (Spain). *Ardeola*, 56:119-125.

De la Puente, J., Moreno-Opo, R. y Del Moral, J. C. 2007. *El buitre negro en España. Censo Nacional (2006)*. SEO/BirdLife. Madrid

Ekos, S. L. 2010. Caza sostenible en especies migratorias, 2005-2010. Paloma torcaz. Informe final.

Garrido, J. R., Molina, B. y del Moral, J. C. 2012. *Las garzas en España. Población reproductora e invernante en 2010-2011 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

GEA (Grupo Extremeño de Aguiluchos). 2007. Campaña de conservación de aguiluchos en Extremadura, año 2007. Informe final.

- GEA (Grupo Extremeño de Aguiluchos). 2013. Actas del XII Congreso Ibérico de Aguiluchos. Cuacos de Yuste, 11, 12 y 13 de octubre de 2013.
- Molina, B. 2009. *Gaviota reidora, sombría y patiamarilla en España. Población en 2007-2009 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.
- Molina, B. y Martínez, F. 2008. *El aguilucho lagunero en España. Población en 2006 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.
- Moreno, M. J. 2013. Campaña de conservación del aguilucho cenizo en Extremadura 2012-2013. En GEA (Grupo Extremeño de Aguiluchos). Actas del XII Congreso Ibérico de Aguiluchos. Cuacos de Yuste, 11, 12 y 13 de octubre de 2013. Páginas 37-50.
- Ortega, A. 2009. Situación de la población de collalba negra (*Oenanthe leucura*) en el Parque Natural del Tajo Internacional. Informe inédito.
- Palomino, D. 2006. *El milano negro en España. I Censo Nacional (2005)*. SEO/BirdLife. Madrid.
- Palomino, D. y Molina, B. 2009. *Aves acuáticas reproductoras en España. Población en 2007 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.
- Palomino, D., y Valls, J. 2011. *Las rapaces forestales en España. Población reproductora en 2009-2010 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.
- PECBMS. 2015. www.ebcc.info. *Population Trends of European Common Birds 1980-2012*. Versión en línea.
- Prieta, J. 2002. *Aves de Extremadura. Volumen 2. 1999-2000*. ADENEX. Mérida.
- Prieta, J. 2007. *Aves de Extremadura. Volumen 3. 2001-2003*. ADENEX. Mérida.
- Prieta, J. y del Moral, J. C. 2008. *La grulla común invernante en España. Población en 2007 y método de censo*. SEO-Cáceres. Plasencia.
- Prieta, J., Mayordomo, S. y Cardalliaguet, M. 2013. *Aves de Extremadura. Volumen 4. 2004-2008. Versión impresa revisada. SEO--Extremadura*.
- Prieta, J. y Traverso, J. M. 2007. *Censo nacional de aves acuáticas reproductoras. Año 2007. Extremadura*. Informe para SEO/BirdLife.
- Prieta, J. y Traverso, J. M. 2009. *Censo nacional de gaviotas invernantes. Enero 2009. Extremadura*. Informe para SEO/BirdLife.
- Prieta, J., Valiente, J. y Benítez, J. M. 2000. *Aves de Extremadura. Volumen 1. 1998*. ADENEX. Mérida.

Román, J. A., Gómez-Calzado, M. y Prieta, J. 2014a. *Censo de la grulla común (Grus grus) en Extremadura. Inviernos 2012-13 y 2013-14*. Grus-Extremadura.

Román, J. A., Torrijo, A., Onrubia, A. y Gómez-Calzado, M. 2014b. *La grulla común, Grus grus, invernante en España y Marruecos. Distribución y censos de la población (2013/2014)*. Grus-Extremadura.

Román, J. A. (coord.). 2015. *La grulla común en España. Invernada 2014/2015*. Grus-Extremadura.

Sánchez, Á, y García-Baquero, M. J. 2012. La avutarda en Badajoz: estabilidad, pero con matices. *Quercus* 314:16-22.

SEO/BirdLife. 2013a. Resultados del programa SACRE 1998-2013. SEO/BirdLife. Madrid

SEO/BirdLife. 2013b. Resultados del programa SACIN 2008-2013. SEO/BirdLife. Madrid

SEO/BirdLife. 2014. Resultados del programa NOTUA 2008-2014. SEO/BirdLife. Madrid

Seoane, J. 2005. El alzacola en España. I Censo nacional (2004). SEO/BirdLife. Madrid.

Traverso, J. M. 2013. Población reproductora año 2013 y evolución poblacional del aguilucho lagunero occidental en la Comunidad de Extremadura. En GEA (Grupo Extremeño de Aguiluchos). Actas del XII Congreso Ibérico de Aguiluchos. Cuacos de Yuste, 11, 12 y 13 de octubre de 2013. Páginas 63-76.

LISTADO DE COLABORADORES



LISTADO DE COLABORADORES

Á. A. Rubio
A. Dale
A. Gallés
A. Gómez
A. Howes
A. I. Moreno
A. Jiménez
A. Ruiz
A. S. Rodríguez
A. Spence
Ada Kouri
ADENEX
Adolfo García
África Yuste
Agustín Giraldo
Agustín Mogena
Agustín Rodríguez
Agustín Sanabria
Alan Davies
Albert Cama
Albert Sanmartí
Alberto Benito
Alberto Gil
Alberto Pablos
Alberto Pacheco
Alberto Puente de la Rosa
Alberto Salvador
Alberto Sánchez
Aleix Millet

Alejandro Briz
Alejandro Melero
Alex Colorado
Alfonso Pérez del Barco
Alfonso Rodrigo
Alfredo Gómez
Alfredo Mirat
Alfredo Ortega
Alfredo Vivas
Alicia Carreño
Alicia Ortega
Álvaro Díaz Pastor
AMUS
Ana C. Narciso
Ana Cordero
Ana M. Ruiz
André Boucher
Andrea García
Andrea Puerto
Andrés M. Sánchez
Andrés Maestre
Andrés Rodríguez
Andrés Rodríguez
Andrés Serrano
Andrés Vega
Andy Winter
Ángel González Mendoza
Ángel Luis Sánchez
Ángel Martínez
Ángel Nubla

Ángel Pérez Menchero
Ángel Rabanal
Ángel Rodríguez Martín
Ángel Sánchez García
Ángel Tomás Mejías
Angela Garrote
Antolín Redondo
Antón David Pérez
Antonia Cangas
Antonia Cordero
Antonio Acedo
Antonio Calvo
Antonio Castellano
Antonio Ceballos
Antonio Cebrián
Antonio Galán
Antonio Horrillo
Antonio Justiniano Julián
Antonio M. Mendoza
Antonio María Sánchez
Antonio Matador
Antonio Núñez Ossorio
Antonio Rodríguez
Antonio Ternero
Antonio Torrijo
Arturo Domínguez
Arturo López Gallego
Ashley Saunders
Atanasio Fernández
B. Arenaz
B. Fernández
B. Iglesias
B. Vigalondo
Benigno Cienfuegos
Benjamín Muñoz
Bernat Iglesias

Bert Dijks
Blas Molina Villarino
Borja Maldonado
Brian Small
C. Antolín
C. de la Fuente
C. de Mera
C. Giner-Abati
C. Ossorio
C. Parrilla
C. Proper
C. Villaverde
Cándida Díaz
Carlos Andrés
Carlos Dávila
Carlos Espadero
Carlos Fernández Díaz
Carlos González Villalba
Carlos López Albar
Carlos Luengo
Carlos Martín
Carlos Martínez
Carlos Moreno
Carlos Nazario Bocos
Carlos Pacheco
Carlos Villaverde
Carlota Gutiérrez
Carmelo López
Carmen Crisóstomo
Carmen Diu
Carmen Montaña
Carol Bradley
Carolina Climent
Casimiro Corbacho
Celestino Moreno
César Clemente Clemente

César Javier Palacios
Charo Casado
Chema Diu
Chris Cook
Chris Durdin
Chris Mills
Chris Perrins
Claudia Camacho
Colin Jewitt
Corina Torregrosa
Cristina Delgado
Cristina Giner
Cristina Sánchez
D. Cobos
D. García
D. López
D. Peña
Damián García
Dave Allen
Dave Crossley
Dave Gosney
Dave Langlois
David Álvarez
David Bradley
David Cuenca
David Gámez
David Giraldo
David Tyldesley
Debby Doodeman
Demetrio Vázquez
Denis Landenbergue
Diego Recio
Dilys Tyldesley
Dioni González
Dolores Huerta
Domingo Jorge Cordobilla

Domingo Rivera
Don Walton
E. Barnes
E. Juarros
E. Perera
Ed Owen
Eduardo Amengual
Eduardo Cabrero
Eduardo Calzas
Eduardo Mostazo
Elena Cabrera
Elena Herguido
Elvira del Viejo
Emilio Costillo
Emilio Peña
Emilio Pérez-Balsalobre
Enrique Álvarez
Enrique Balbuena
Enrique Fernández Larreta
Eric Quin
Erich Streich
Ernest F. J. García
Ernesto Villodas
Esmeralda Rodríguez
Esteban Reyes
Estela Donaire
Esther Charles
Esther Mateos
Eva Garzón
Eva Palacios
F. Castro
F. Guerrero
F. Molinos
Felipe Holgado
Fergus Crystal
Fermín Sierra

Fermina Martínez	G. Romero
Fernando Díez	G. Sánchez Peña
Fernando García Crego	Gabriel Silva
Fernando Ruedas	Gary Prescott
Fernando Salas	Gavin Russell
Fernando Salas	Gema Montaña
Fernando Yuste	Genaro González
Fernando Yuste	Genaro Sánchez
Florencio Carrero	George Carr
Francis Martín	Gerardo Pizarro
Francis Prieto	Godfried Schreur
Francisco Bernáldez	Gorka Gorospe
Francisco Borja Maldonado	Gregorio García
Francisco Buénaga	Gregorio Naharro
Francisco Camello	Guillermo Hernández
Francisco Chiclana	Guillermo Mayor
Francisco Hurtado	Guillermo Rivas
Francisco Hurtado	Gustavo Gahete
Francisco J. Meléndez	Heijo Knecht
Francisco Javier Caballero	Heirdert Hindrik
Francisco Javier Morcillo	Helios Dalmau
Francisco José Durán	Henk Zweers
Francisco José García	Hilario García
Francisco José Medina	Hugo Gómez-Tejedor
Francisco Lopo	Hugo Sánchez
Francisco Macías	I. Spence
Francisco Mendoza	Ian Parsons
Francisco Molinos	Ignacio García
Francisco Montaña	Inés García
Francisco Ramírez	Ingo Waschkies
Francisco Rodríguez	Inmaculada Jerez
Francisco Rojo	Isaac Flecha
Francisco Serrano	Isaac Outón
G. Fernández	Isabel Alcántara
G. Núñez-Lagos	Isabel Gallardo
G. Pizarro	Isabel González

Isabel Picazo	J. Willmott
Ismael Izquierdo	Jacobo Hernández
Ismael Sánchez	Jaime Cerezo
Iván Álvarez	Jaime Collado
Iván Hernández	Jaime Tolosa
Iván Mairlot	James Andrews
Iván Sánchez	Jan Hill
Iván Solana	Jane Walton
J. A. Álvarez	Jan-Michel Breider
J. A. Delgado	Javier Arias
J. A. Molina	Javier Briz Lázcoz
J. Ambelen	Javier Caldera
J. Barnet	Javier Conejero
J. Buixareu	Javier Cuesta
J. C. Albero	Javier Esteban
J. C. López Alvar	Javier G. Labrador
J. Casado	Javier Gayo
J. Ceballos	Javier Gómes Aoiz
J. Conejero	Javier Guerrero
J. Delgado	Javier Hernández
J. Flores	Javier Mahílllo
J. García	Javier Manzano
J. L. Barriga	Javier Martínez de Aramayona
J. L. Chiclana	Javier Parra
J. M. Cano	Javier Prieta Díaz
J. M. García	Javier Salcedo
J. M. Jiménez	Javier Zalba
J. M. Lorenzo	Jenny Torfs
J. M. Moreras	Jenny Viskens
J. M. Salazar	Jeremy Nolan
J. María Herranz	Jerónimo Corral
J. María Jiménez	Jerónimo Jaén
J. Morena	Jesús Calle Vaquero
J. Ó. Carret	Jesús M. Oliva
J. Smith	Jesús Montero
J. van Schaik	Jesús Mora

Jesús Porras
Jesús Prieto
Jesús Rodríguez
Jesús Ruiz
Jesús Sánchez
Jesús Serradilla
Jesús Solana
Jezabel López
Jezabel Rodríguez
Joaquín Fernández
Joaquín García
Joaquín Mazón
Joaquín Vázquez
Johannes Rydström
John Hawkins
John Hawkins
John Muddeman
Jon Andevski
Jonás Martín
Jordi Sargatal
Jorge Ángel Herrera
Jorge Gutiérrez del Sol
Jorge Leonor
Jörgen Olsson
José A. Guerrero
José A. Manzanedo
José Ángel Sánchez
José Antonio Álvarez Leal
José Antonio Delgado
José Antonio Fimia
José Antonio López Constante
José Antonio Román
José Arias
José Carlos López Fuentes
José Casado
José Delgado

José Elías Rodríguez
José Gómez Aparicio
José Gordillo
José Guerra
José Ledo
José Luis Anguita
Jose Luis Barriga
José Luis Bautista
José Luis Caballero
José Luis Ciudad
José Luis Copete
José Luis Guisado
José Luis Pérez Chiscano
José Luis Rivero
José Luis Valiña
José M. Ruiz
José Manuel Castrillo
José Manuel Rama
José María Abad
José María Álvarez Leal
José María Benítez
José María Casas
José María Castaño
José María Herranz
José María Salazar
José María Traverso
José Miguel Colorado
José Miguel Mirasierra
José Portillo
José Ramón Hidalgo
José V. Oropesa
Juan Antonio Barquero
Juan Antonio Masero
Juan Carlos Delgado
Juan Carlos Jiménez Durán
Juan Carlos López Alvar

Juan Carlos Molina	L. Montalbán
Juan Carlos Núñez	L. R. Hernández
Juan Carlos Paniagua	Laura Rollán
Juan Carlos Salgado	Leandro Rivas
Juan Cuesta	Leslie Battle
Juan Diego Acevedo	Leslie Carr
Juan Francisco Sánchez	Lidia Roncero
Juan González Valdivieso	Liz Snell
Juan José Aldehuela	Lorenzo Alcántara
Juan José Bote	Lucas Gómez
Juan José Chaparro	Luis A. Rodríguez
Juan José Díaz	Luis J. González
Juan José Espinegoita	Luis Lozano
Juan José Ramos Encalado	Luis Martínez
Juan Manuel Brías	Luis Miguel Parejo
Juan Manuel Domínguez	Luis R. Hernández
Robledo	Luis Salguero
Juan Oñate	Luis Sanabria
Juan Óscar Carretero	Luis Santiago Cano
Juan Pablo Jiménez	Luis Sitges
Juan Pablo Prieto Clemente	Luna Puente
Juan Pablo Resino	M. A. Leno
Juan R. Suárez	M. Carregal
Juani Lopo	M. González
Juani Vilches	M. J. Escalante
Julián González	M. Jiménez
Julián Martín Garde	M. Llorente
Julián Reyes	M. Martínez
Julio Gutiérrez	M. Pizarro
Julio Merayo	M. Rial
Jus Pérez	M. Sánchez
Justo García	M. Tirado
Justo Tarrío	Manuel Curiel
Kelly Renwick	Manuel de Hauwae
Keneth Sánchez	Manuel Estébanez
Kerstin Walker	Manuel Flores
L. Huerta	

Manuel García del Rey
Manuel Gómez Calzado
Manuel Gómez Guarín
Manuel Iglesias
Manuel J. Salguero
Manuel Nieto
Manuel Oro
Manuel Parejo
Manuel Pérez González
Manuela Rodríguez
Marc Gálvez
Marcelino Cardalliaguet
Marco Antonio Sánchez
María Carmen Román
María del Rocio Molina
María del Viejo
María González
María Isabel Jiménez
María Jesús García Vaquero
María José Valencia
María Llorente
María Moreno
María Vigilante
Marian Coca
Marián Pujol
Mariano Martínez
Mario Alonso
Mario Arcas
Mario Díaz Esteban
Marisa García Soria
Marisa Pizarro
Marisol Díaz
Marisol Infantes
Mark Hörstermann
Marta Gómez Moro
Marta Zamora

Martin Kelsey
Mary Perrins
Mathieu Bourgeois
Matxalen Pauli
Mercedes Rodríguez
Merylín Jewitt
Michel Viskens
Miguel Ángel Justo
Miguel Ángel Muñoz
Miguel Ángel Romo
Miguel Corvillo
Miguel de Gabriel
Miguel del Viejo
Miguel Mirasierra
Miguel Rodríguez
Miguel Rouco
Miquel Ángel López
Mo Verhoeven
Moises Herrero
Montaña Domínguez
N. Milbourne
N. P. Roberts
N. Rodríguez
Natalia Franco
Natalia Moral
Nathan Senner
Neil Renwick
Nick Moran
Noelia Baeza
Norberto Hornero
Nuria Carrasco
Núria Tarrasón
Olga Jiménez
Óscar Díaz
Óscar Llama
Óscar. J. González

P. Barnes
P. Castro
P. Gasco
P. Massey
P. Soper
Pablo de la Nava
Pablo García
Pablo Gutiérrez
Pablo Herrador
Pablo Núñez
Pablo Ramiro
Pablo Vera
Paco Cardoso
Pat Russell
Patricia Gordón
Patrick Kelsey
Paula Rodríguez
Paulino Gargantilla
Pedro Gómez Correas
Pedro Holgado
Pedro Holguera
Pedro López
Pedro Mangas
Pedro Salgado
Pedro Schreur
Pedro Tapia
Pep Tapia
Pepe Antolín
Per Wohlin
Peter Eden
Philippe Martin
Phyllis O'Grady
Pilar Alonso
Pilar Chamorro
Pilar Goñi
R. Sáez

Rafael Abuin
Rafael Parra
Rafael Romero
Rafael Serra
Rafael Vicente
Ramón Pielfort
Raúl Granados
Raúl Guzmán
Raúl Martínez
Raúl Méndez
Raúl Sancho
Raúl Urquiaga
Raymon De Smet
Ricardo Montero
Richard Coastworth
Rixte Boitenweg
Rob Smith
Roberto Cabo
Roberto Sánchez
Roque Belenguer
Rosa Cano
Roser Solé
Rubén Moreno-Opo
Rubén Serradilla
Ruth Miller
S. Fernández
S. León
S. Rodríguez
Sabas Molina Fernández
Sabas Molina Ríos
Sallaets Gaston
Samuel Langlois
Santiago Avis
Santiago Villa
Sebastián Molano
Sergio Briones

Sergio Mayordomo Ruiz
Sergio Pérez Gil
Silvia Domínguez
Sol Díaz-Infantes
Stephen Daly
Steve Fletcher
Steve West
Sussie Carlström
Teresa Laguna
Thierry Fallet
Tim Appleton
Tim Earl
Tom Gullick
Tommy Magnusson
Toribio Álvarez
Trevor Plumb
Unai Fuente
Urban Bühlmann
Uwe George
V. Pérez
Vanessa Palacios
Vanessa de Alba
Verónica López
Vicente López
Vicente Risco Arias
Víctor González
Víctor Manuel Quintana
Víctor Pizarro
Virgilio Beltrán
Wendy Strahm
William Haworth
Wim Kleefstra
Xurxo Piñeiro
Yasmina Annichiaricco
Yolanda Muñoz
Yolanda Simón



El trabajo de cientos de voluntarios hace posible
la realización de publicaciones como esta
¡Muchas gracias!



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa