



Euplectes afer macho



Euplectes afer hembra



Euplectes orix macho



Euplectes orix hembra

NOMBRE COMÚN: Tejedores.

TAXONOMÍA: Phylum: *Chordata*. Clase: *Aves*. Orden: *Passeriformes*. Familia: *Ploceidae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: África subsahariana.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Pequeños passeriformes de unos 10-12 cm de longitud. Los machos, en la época reproductora, presentan una coloración muy vistosa, amarilla, roja y negra, con un collar negro en la nuca. El pico es corto, cónico y robusto. La cola suele ser corta, pero algunas especies tienen la cola larga (por ejemplo, *E. ardens*) o larguísimas plumas caudales (*E. progne*).

En España están presentes:

- Tejedor amarillo (*E. afer*): machos de plumaje negro con la frente, el píleo, la parte inferior de la espalda y el obispillo amarillos. Las hembras son de color pardo claro con estrías marrón oscuro y negras; el vientre es blanquecino; el píleo está muy rayado de marrón oscuro; tienen una gran ceja blanco amarillento desde la base del pico hasta casi la nuca, y una lista ocular marrón oscura por detrás del ojo.
- Obispo rojo (*E. orix*): los machos tienen cabeza y parte anterior del cuello de color rojo; la cara tiene una máscara negra que cubre toda la parte anterior, la frente y la garganta. Parte dorsal de color rojo (a veces anaranjado); pecho, flancos y zona media del vientre de color negro brillante; zona lateral del vientre y zona caudal inferior de color rojo. Pico y ojos de color negro. Cola corta y ancha. Alas cortas, anchas y redondeadas. Las hembras son pardo-ocre con numerosas estrías de color marrón oscuro; pecho y vientre de color crema; píleo pardo con numerosas rayas oscuras; al igual que los machos, presentan una ceja de color crema; bordeando la parte inferior del ojo tienen una franja de color crema en forma de media luna.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Tanto por su forma, como por el pico y su llamativo colorido, pueden ser confundidos con ejemplares del género *Ploceus*, necesitando en ocasiones un experto para su correcta identificación, sobre todo en machos fuera de la época de reproducción y en hembras y juveniles.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especies poligínicas que habitan en zonas cálidas y húmedas, valles con vegetación palustre, cultivos de regadío, etc. De hábitos gregarios, forman colonias de nidificación. Su alimentación es esencialmente granívora.

Impacto ecológico: 1) Desplazan a las especies nativas de áreas palustres. 2) Pueden alterar el hábitat.

Impacto económico: 1) Provocan daños a los cultivos, principalmente en los arrozales.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Escape o liberación de ejemplares mantenidos en cautividad.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (online, <http://www.magrama.gob.es/>)
- http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Biodiversidad/EspeExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFauna/AnfibiosReptilesAves/RECOPIACION_FICHAS.pdf
- <http://quedadanatural.com/foro/guia-detalle.php?seo=626&g=aves> y <http://quedadanatural.com/foro/guia-detalle.php?seo=535&g=aves>