



GARGANTA
de los
INFIERNOS



RESERVA NATURAL

BOSQUE de LADERA

Son formaciones de árboles de hoja caduca (*Fagáceas*), principalmente de **roble melojo** o **rebollo** (*Quercus pyrenaica*)

Se hayan situados en las **laderas de montaña**, justo por encima del piso de la encina y por debajo del matorral del piorno serrano, aunque con frecuencia se superponen ambos pisos.

Los podemos encontrar desde los 300 m de altitud hasta por encima de los 1.500 m.

Son bosques que requieren **climas con lluvia moderadas** y cierta humedad al menos durante parte del año.

EL ROBLE:

Se trata de la especie característica de estos bosques que tienen hojas **marcescentes** (se mantienen secas en el árbol durante tiempo), representando un punto intermedio entre los robles de hoja caduca atlánticos y los encinares y alcornoques de hoja perenne mediterráneos. En las zonas con mejor suelo fueron substituidos por los castaños.



Su fruto, la **bellota**, ha sido utilizado tradicionalmente para **alimentar al ganado**, no siendo utilizada para el consumo humano por su sabor amargo.

En sus ramas se pueden ver a veces unas bolas que parecen frutos llamados **agallas** y que se producen por la **picadura de un insecto** el cual vive en su interior en estado larvario hasta que se desarrolla y sale de ella.

En el **Valle del Jerte** gran parte de la antigua superficie ocupada por el rebollar se ha transformado en extensas plantaciones de *cerezos en bancales*.



Dirección General de
Medio Ambiente



FEOGA

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

FLORA Y FAUNA

- 1 Roble Melojo o Rebollo (*Quercus pyrenaica*)
- 2 Lirón careto (*Elyomis quercinus*)
- 3 Ciervo volante (*Lucanus cervus*)
- 4 Cáрабо (*Strix aluco*)
- 5 Gato montés (*Felis silvestris*)
- 6 Gavilán (*Accipiter nisus*)
- 7 Tejón (*Meles meles*)
- 8 Orquídea blanca (*Cephalanthera longifolia*)
- 9 Puntanaranja (*Anthocharis belia*)
- 10 Erísimo (*Erysimum merxmulleri*)
- 11 Lagartija ibérica (*Podiceps hispanica*)
- 12 Rebozuelo (*Cantharellus cibarius*)
- 13 Arrendajo (*Garrulus glandarius*)
- 14 Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)
- 15 Pavón diurno (*Inachis io*)
- 16 Helecho común (*Pteridium aquilinum*)
- 17 Orquídea nido pájaro (*Neottia nidus-avis*)
- 18 Petirrojo (*Erithacus rubecula*)
- 19 Acebo (*Ilex aquifolium*)
- 20 Trepador azul (*Sitta europaea*)
- 21 Murciélago de Bechstein (*Myotis bechsteini*)

Los bosques de ladera, robledales y los castañares que los sustituyen en algunos enclaves, representan el medio con mayor diversidad biológica de la Reserva Natural. En ellos podemos encontrar especies de flora nemoral como la **orquídea nido de pájaro** (*Neottia nidus-avis*), la **orquídea roja** (*Cephalanthera rubra*) o la **monótropa** (*Monotropa hypopitys*). También se refugian en ellos algunos endemismos del Sistema Central como la **violeta amarilla** (*Viola langeana*), el **erísimo** (*Erysimum merxmulleri*) o la **aristoloquia** (*Aristolochia pallida* subsp. *castellana*) exclusiva del norte de Cáceres.

La fauna más conspicua la constituyen las numerosas especies de passeriformes y pícidos que podemos encontrar en estos bosques, junto a la mayoría de las rapaces forestales de la Península Ibérica. Entre los mamíferos destaca la presencia del rarísimo **murciélago ratonero forestal** (*Myotis bechsteini*). Es de destacar la relativa abundancia de uno de los más bellos insectos de Europa como es el **ciervo volante** (*Lucanus cervus*).